


10769/B

H.x

9/0





Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Wellcome Library



TRATADO COMPLETO
DE
MEDICINA OPERATORIA,
OFFERECIDO
A SUA ALTEZA REAL
O
PRINCIPE REGENTE
NOSSO SENHOR

POR
ANTONIO D' ALMEIDA,

Lente de Operações no Hospital Real de S. José.

T O M. IV.



L I S B O A,
NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA.

ANNO M. DCCC.

Com licença de Sua Alteza Real.





MEDICINA OPERATORIA.

C A P I T U L O I.

Da inflammação. (a)

§. I.

A Inflammação he huma fluxão de sangue maior, ou menor, acompanhada de inchação, vermelhidão, calor, e dor. (b)

A ii

Cau-

(a) Como a inflammação he huma molestia, que precede, ou sobrevem como symptoma a muitas enfermidades chirurgicas, nada importa tanto como saber-se prevenir, e remediar. E bem que a sua pathologia esteja ainda muito escura, e em differentes opiniões, com tudo na therapeutica todos vão de acordo.

(b) Para se caracterizar huma fluxão por inflammação, basta haver alguma vermelhidão, e calor; porque ha certas inflammações, nas quaes a inchação he imperceptivel, e n'outras falta inteiramente a dor. Esta definição de inflammação, que se conserva desde o principio da arte de curar, e em todas as lin-

Causas.

§. II.

As causas da inflamação são remotas, e proxima. As causas remotas ainda são predisponentes, e excitantes. As predisponentes são 1.º a conformação originaria do corpo animal, que o faz mais, ou menos susceptivel das inflamações em todas as suas partes; porém em humas mais do que em outras, conforme a abundancia da cellular, que entra nas suas estruturas (*a*): 2.º as alterações, que sofrem

guas, dá bem a conhecer a cousa definida, quando a inflamação he externa, e se pôde observar; mas quando tem o seu assento em algum órgão interno, he preciso recorrer a outros symptomas, que são particulares a esta molestia, levada a hum certo grão, como dor aguda, e calor local, febre, sede, anciedades, lesão das funções da parte atacada, e d'outras, que sympathizão com ella, &c.

(*a*) Como todas as partes do corpo animal tem cellular, daqui nasce, que podem haver inflamações em todas: mas o progresso, e suas consequencias serão maiores, ou menores segundo a abundancia da mesma cellular.

frem as partes do corpo na sua estrutura, durante a vida, as quaes dispõem as mesmas partes para serem atacadas, ainda com a menor causa excitante, alterações que dependem do clima, do modo de vida, dos alimentos, das bebidas, da alteração do ar no mesmo clima em diferentes estações, da perturbação das funções em geral, ou de alguma em particular, das paixões, &c.: 3.º finalmente a lesão, ou offensa de alguma parte em particular, na qual ficando falha, por effeito de alguma molestia antecedente, está mui disposta a inflammar-se.

As causas excitantes são tudo o que póde fazer algum estímulo, directa, ou indirectamente, como frio, calor, venenos, substancias irritantes, corpos picantes, cortantes, ou contundentes, e substancias estranhas á constituição, introduzidas, ou geradas nos humores. (a)

Da

(a) Posto que nas primeiras vias se prepare o chylo debaixo das leis da assemelhação, particulares a cada individuo, e que das substancias animaes, e

Da causa proxima.

§. III.

Quando , supposta a susceptibilidade , e disposição , concorre alguma das causas excitantes , isto he , algum estimulo , segue-se immediatamente huma contracção ,
ou

vegetaes , de que nos nutrimos , se extraião os mesmos principios , sendo tudo o mais rejeitado ; com tudo ha muitas substancias , que sem offenderem primeiras vias , e sem entrarem na composição do chylo , vão , involtas com elle , produzir o seu effeito em differentes partes da economia. O mesmo chylo convertido em sangue , e este dando tantos , e tão differentes humores , por effeito de decomposições , e novas combinações , dá muitas vezes substancias estranhas , que , voltando-se em estimulos , porque offendem os solidos , são causa de muitas molestias , e particularmente da inflammação. He verdade que sendo estes os resultados constantes da marcha dos nossos humores desde chylo até ás ultimas excreções , as ditas substancias estranhas não produzem sempre molestias ; porque ou não achão disposições , ou são depositas por alguma excreção : mas se encontrarão disposições , ou se pela sua qualidade , ou quantidade não

ou aperto dos vasos minimos , por effeito do poder dos nervos augmentado , ou irregularmente distribuido , ao que se chama espasmo , cujo aperto pondo hum obstaculo á passagem dos liquidos , segue-se o augmento da acção dos vasos immediatos para vencerem o dito aperto , e este augmento da acção he a causa proxima da

podem ser excretadas , devem precisamente causar estímulos , e estes differentes molestias , segundo a disposição , e a sua natureza. Além destes dous modos , pelos quaes se podem declarar substancias nocivas na constituição , ha outro , que he o da absorvencia de miasmas , ou outras substancias , que entrão pelos absorventes da pelle , e pela respiração , e vão produzir estímulos em differentes partes. He só deste modo , que nós entendemos as acrimonias , palavra de que se tem abusado infinito , estabelecendo para cada molestia huma acrimonia particular , como cancroza , scrobutica , escrofulosa , &c. , confundindo disposições com causas excitantes , e resultando disto a pathologia humoral , e a prática de purificar os humores com sangrias , purgantes , e beberagens , que , bem longe de serem uteis , debilitão consideravelmente os enfermos , e , se os não concluem , ao menos perlongão muito as suas molestias.

da inflammação (*a*). Se o espasmo he passageiro , ou o estimulo pouco activo, ou de pouca duração , o sangue demorado escapa para os collateraes , ou recua , e entra no círculo , ficando a parte restituída ao seu estado natural , sem a constituição sentir algum effeito. Porém se o estimulo

con-

(*a*) Boerhaave conheceo , que o aperto dos vasos minimos , por qualquer causa , punha hum obstaculo á passagem do sangue , e suppoz que o sangue por grosso se encalhava nos vasos proprios , ou por delgado nos improprios , fazendo consistir a causa proxima , ou necessaria da inflammação na obstrucção dos vasos , no augmento da força do coração , e na velocidade do sangue. Mas o aperto dos vasos não basta para haver inflammação , se a acção dos immediatos se não augmenta. A espessura , ou a delgadeza do sangue , alterações que este liquido soffre a cada momento , não só não são causa proxima da inflammação , mas nem remota ; porque se os vasos se achão no estado de saude , ainda que o sangue entre nos minimos , ou improprios , como succede nos actos de pejo , vergonha , e outras paixões , ou se demore nos grossos , não se segue inflammação ; porque , cessando o influxo dos nervos , o sangue , que enchêra os vasos , sahe delles pela acção , que lhes he propria , para os collateraes , e até recuando , desvanecendo-se in-

continúa , ou obra com huma grande acção , segue-se o frio , que precede a todas as inflammações , ainda que se não perceba , o qual consiste em huma especie de adormecimento dos nervos , em que a potencia nervosa se acha como abafada

Tom. IV.

B

pe-

teiramente a fluxão , para cujo fim parece serem destinadas tantas anastomoses. Quanto mais que nas inflammações , bem longe de se achar o sangue espesso , acha-se mais delgado , como mostra a côr mais vermelha da pelle , particularmente da face , o incandimento dos olhos , e a codea pleuritica do sangue , a qual nos rheumatismos , e inflammações mostra o pouco nexo , que ha entre as tres partes , que fórmão o sangue , a saber , foro , lymphá coagulavel , e crassidão ; por quanto a crassidão precipita-se mais facilmente , e fica a lymphá com menor entremeio para se unir mais intimamente , resultando a dita codea.

Sauvages recorre á alma , como potencia motriz , que , independente do coração , e das arterias , manda o sangue á parte inflammada , e diz que o augmento do calor , e febre são effeitos desta potencia.

Hunter considera a inflammação como a acção augmentada do poder , que huma parte goza no estado natural , combinado com hum modo particular , cujo resultado he a inflammação.

Bordeu compara a inflammação á acção particu-

pelo estímulo , causando huma debilidade geral ; e dura em quanto os esforços da natureza se não levantão , para vencerem a oppressão , que lhe causa o dito estímulo. Estes esforços são o que se chama poder de restauração , reacção , força medicatriz , &c. ,

lar de hum orgão , que faz as suas funções independentes em alguns sentidos da circulação , accrescentando , que pôde ser que o encalhe do sangue seja hum effeito da inflammação , e não a causa.

Fabre concebeo , que huma irritação viva , e permanente devia determinar o sangue a correr pelos vasos capillares da circumterencia para o centro , ou ponto irritado , e que o tumor resultado desta attracção deve ter mais , ou menos extensão , segundo a força da irritação.

Os Quimicos tem recorrido ás fermentações :

Gaubio á massa dos humores , que entupe os vasos :

Cullen ao espasmo , que ataca os vasos minimos : e finalmente cada escola de Medicina tem seguido sua theoria differente : e eu acho , que jámais se poderá estabelecer huma theoria provavel , sem se admittir hum estímulo como causa excitante , hum espasmo , ou aperto dos vasos pelo influxo dos nervos estimulados , e huma acção de vasos augmentada para vencer o espasmo , a qual produz a inflammação , e a leva a differentes processos.

&c., isto he, propriedade dos corpos organizados, pela qual buscão restituir-se ao estado natural, que qualquer causa lhes faz perder, cuja propriedade he maior nas carnes, na cellular, na pelle, e proximo ás forças vitaes, do que nos tendões, nos ossos, ligamentos, e partes remotas, guardando sempre proporções com a robustez, e mais circumstancias da constituição.

§. IV.

O frio, que precede ás inflammções, chamado frio febril, produz os seguintes effeitos, segundo a força, ou poder do estimulo, e estado constitucional, 1.º hum langor acompanhado de espirguiçamentos, e bocejos: 2.º pallidez da face, e de toda a pelle, que se faz secca, e aspera, olhos encovados, nariz afilado, e beiços descorados: 3.º tremores em todo o corpo, particularmente no queixo, nascidos de frios, que principião nos lombos, e se espalhão por todo o corpo, interrompidos algumas vezes por calores,

que repetem mais, ou menos, em quanto os esforços se não levantão : 4.º pulso abatido, ligeiro, e irregular: 5.º respiração difficultosa, apressada, e algumas vezes acompanhada de tosse: 6.º diminuição de excreções, e por consequencia sede, fastio, náuseas, ou vomitos, diminuição de sentidos, e algumas vezes delirios.

§. V.

Assim que os esforços da natureza se vão levantando, cessa o frio, e todas as funções da economia se aproximão mais, ou menos ao estado natural : mas se os ditos esforços encontrão grande resistencia da parte do espasmo, augmentão cada vez mais, e segue-se a febre, isto he, o augmento de duas, ou mais pulsações no mesmo tempo, em que deveria haver huma só, como se vê na frequencia, e dureza do pulso (a). Muitas vezes limi-

ta--

(a), A grande mobilidade, e sensibilidade dos nervos, o temperamento sanguineo, a robustez, a idade, o sexo, a estrutura da parte enferma, e muitas

ta-se a febre ao lugar inflammado , e se chama febre local ; porque a acção dos vasos augmentada se não propaga a todo o systema arterial , em razão da pouca actividade do estimulo , ou da falta de disposição constitucional , como se prova por muitas inflammções , que se passam sem a constituição sentir os seus effeitos. Mas se a acção augmentada dos vasos se estende do lugar inflammado a todas as arterias , e coração , então todo o corpo se acha como inflammado , e a este estado chamão diathesis phlogistica , no qual o sangue mais delgado , mais volumoso , e gyrando mais velozmente , não só excita o systema vascular a dobradas pulsações , mas não serve para as excreções (a), que

to-

outras circumstancias, fazem que pequenas causas excitarem grande febre em huns sujeitos , ao mesmo tempo que maiores causas em outros a não excitão , ou ao menos, se a excitão , he em pequeno grão.

(a) Hunter, que admite hum poder de vida no sangue , opinião muito antiga , pensa que logo que a constituição soffre , tambem o sangue soffre , e que este liquido he hum demonstrador assim das acções

todas diminuem , seguindo-se a sede , o fastio , os vomitos , ou náuseas , a tosse , a difficuldade de respirar , as dores de cabeça , a diminuição dos sentidos , o quebramento do corpo , e algumas vezes o delirio.

A

fortes , como das fracas ; mas como não conduz sensações á mente , não se podem conhecer as molestias que soffre. Eu com tudo , que considero o sangue como huma massa passiva , que no estado natural deixa de ser o que he a cada momento pelas decomposições , e novas combinações , que soffre ao través dos vasos , sem que as suas alterações sejam molestias , ou causas dellas , e que seria preciso dar-lhe hum poder de vida a cada passo , só descubro nelle propriedades para certas funções , e não vida , ao menos comparada com a dos seres organizados : pelo que penso , que todas as alterações , que o sangue soffre por effeito das substancias , que perde , ou se lhe ajuntão , ou da acção dos solidos , que o trabalhão , não são molestias ; porque estas só se manifestão quando os solidos padecem : e por tanto não me parece que o sangue possa obrar sobre os solidos de maneira alguma , excepto servindo de vehiculo ás substancias estimulantes , ou estímulos occultos , que os ferem ; pois que ha muitas molestias , em que o sangue se conserva inalteravel , ou o corpo em perfeita saude , a pezar deste liquido ter mais espessura , ou delgadeza , e mesmo qualidades particulares.

§. VI.

A inflammação huma vez principiada segue diferentes processos , segundo a vehemencia das causas , o estado constitucio-
nal , e a estrutura da parte , cujos proces-
sos são resolução , suppuração , e gangre-
na , a que os antigos tem dado os nomes
de terminações , e com bastante proprie-
dade , pois que a resolução , a suppura-
ção , e a gangrena , bem que continuação
de hum mesmo processo em diferentes
grãos , com tudo são cousas diferentes ,
e que põem termo á inflammação. Elles
ajuntavão huma quarta terminação , cha-
mada induração , mas sem fundamento ;
porque os feirros , que se seguem a huma
inflammação , vem a ser effeito de dispo-
sições occultas , que a inflammação desen-
volvêra , servindo como de causa occasio-
nal , mas que nada tem com o effeito ;
porque os processos são muito diferentes.

§. VII.

Se o espasmo não cede á acção dos vasos augmentada, esta mesma acção chama maior copia de sangue; o qual, não tendo passagem livre, e accumulando-se cada vez mais, dilata os vasos proprios, passa para os improprios (*a*), e causa a inchação, vermelhidão, calor, e dor.

§. VIII.

A inchação, hum dos característicos da inflammação, que muitas vezes he quasi imperceptivel, e outras muito consideravel, segundo a natureza, ou força do estímulo, e estrutura da parte, he hum effeito do sangue accumulado dentro dos vasos, e do sero, e lymphá coagulavel depositados na cellular (*b*), a qual igualmente se distende, ou dilata.

A

(*a*) Esta demora do sangue nos vasos proprios, e a passagem d'elle para os improprios, isto he, para os serosos, e lymphaticos, he hum effeito, e não hum causa da inflammação, como pretendêrão os Boerhaavianos.

(*b*) Ao passo que os vasos proprios, ou impro-

§. IX.

A vermelhidão he hum effeito da demora do sangue nos vasos proprios, e da passagem deste liquido para os improprios, muito dilatados (*a*), cuja verme-

Tom. IV.

C

lhi-

prios se dilatão, deixão escapar pelos collateraes, exhalantes, foro, lymphá coagulavel, e algumas vezes globos vermelhos, que se diffundem pela cellular, e a dilatão mais, ou menos, segundo a continuação, ou vehemencia das causas. Esta lymphá coagulavel he o meio de união, que péga as partes inflammadas humas ás outras, e produz o que se chama inflammacão adhesiva, a qual tem lugar nas membranas mucosas, e na cellular, onde ha pouco oleo, e principalmente nas superficies das entranhas, e membranas, que forráo as cavidades. Quando a inflammacão ataca estas partes, que se podem unir, e a união se estabelece, termina communmente pela resolução; porque a experiencia mostra, que a adherencia das partes inflammadas se oppõe á suppuração, talvez porque a lymphá vascularizando-se, offerece passagem aos liquidos de humas partes para outras, como vemos nas adherencias estabelecidas entre a pleura, e o bese.

(*a*) Hunter pertende, que huma parte da vermelhidão seja devida á vascularização da lymphá coagulavel diffundida na cellular, ou em algumas cavidades: porém nós observamos a vermelhidão muito no

lhidão varia desde o gráo mais claro até o mais escuro em differentes inflammções , segundo a natureza das causas , e estado constitucional , e desde o centro da congestão até á sua circumferencia.

§. X.

O calor he hum effeito da decomposição , que soffre o sangue no lugar inflammado , pela acção dos vasos , que se achão em maior , e mais frequente movimento ; porque o sangue , segundo as melhores observações , he o conductor do calorico desde o bofe , onde o recebe até todas as partes do corpo : e como o sangue corre em maior abundancia ao lugar inflammado , parece que alli se deve desenvolver em maior quantidade o dito calorico , e produzir o effeito do calor augmentado. (a)

A

principio , e em muitas inflammções , sem haver tempo para a lympha se accumular , e vascularizar : pelo que não he preciso recorrer-se a tal causa , que só pôde existir nas inflammções , que se conservão muito tempo estacionarias , como as adhesivas.

(a) Eu estou persuadido , que a unica fonte do

§. XI.

A dor na inflammação ou he hum effeito da causa , que produz o estímulo; ou da dilatação dos vasos: a primeira precede á inflammação: a segunda , que se faz mais sensível a cada pulsação, se chama dor pulsante, e huma e outra podem existir confundidas debaixo do caracter da pulsante. Tambem póde haver dor por

C ii

cau-

calor animal está na respiração , e consiste no calorico , que o sangue recebe passando ao través do boste , cujo calorico , sendo conduzido pelo sangue a todas as partes do corpo , produz os seus effeitos , segundo a sua quantidade. Daqui nasce , que o calor diminua á proporção das distancias do centro das funções vitaes , e que o corpo agitado está mais quente ; porque as inspirações se amiudão , e o sangue , que anda mais veloz , recebe , e desenvolve maior quantidade de calorico , e que em todas as partes , onde o sangue acode em maior copia , como aos lugares inflamados , e rosto , em consequencia do pejo , &c. , ao estomago na força da digestão , ou a outras partes em acção , ha mais calor , e finalmente que o corpo animal no estado phlogistico , ou febril está todo mais quente ; porque a acção dos vasos augmenta , e as inspirações se amiudão.

causa da exposição do solido vivo aos toques do ar , ou outros corpos estimulantes , havendo ferida , ou chaga , e mesmo pela contracção de partes meio-cortadas , como tendões , nervos , ligamentos , &c.

§. XII.

A inflammação produz diferentes molestias inflammatorias , segundo a natureza da causa estimulante , e a estrutura da parte inflammada. Quando o foco da inflammação se faz na membrana adiposa (*a*) , resulta hum tumor circumscripto , acompanhado de vermelhidão , tensão , calor , e dor pulsante , chamado fleimão ; o qual he maior , ou menor segundo a vehemencia das causas , e quasi sempre segue o
pro-

(*a*) A membrana adiposa he huma camada de cellular , contida entre duas membranas delgadas , que se acha debaixo da pelle por todo o corpo , mais espessa em huns lugares , do que em outros , a qual differe da cellular , que liga todas as partes , em conter mais oleo , ou gordura , excepto a que acompanha os vasos , a que cerca os rins , e a de muitos outros lugares , que tambem contém muito oleo.

processo da suppuração , algumas vezes o da gangrena , e poucas o da resolução. As diferentes modificações do fleimão, como frunculo , carbunculo , &c. , são hum effeito do assento da molestia , e da causa , o frunculo existindo na parte mais exterior da membrana adiposa sem profundar muito , e o carbunculo dependendo de miasmas , que dão á inflammação hum caracter particular, nascido do modo, com que modificão os solidos (a). Porém fazendo-se o foco da inflammação na cellular, que liga as membranas entre si, ou a outras partes, na qual não ha tanta gordura, em lugar de se seguir o tumor circumscripto , lavra mais , ou menos ao comprimento das mesmas membranas , e fór-

(a) O carbunculo parece depender de veneno diffundido no ar , pois que estes tumores são mais frequentes em certas estações do anno , e em lugares pantanosos : parece-me que o azoto he a causa desta molestia , assim como de muitas outras ; porque vemos , que as pessoas , que recebem o azoto exhalado das substancias animaes , e vegetaes em fermentação putrida , são commummente atacadas dos carbunculos.

fórma as erisipélas, as quaes ou são superficiaes, ou profundas. A erisipéla superficial, chamada erithema, rosa, ou fogo de Santo Antonio, têm o seu assento no corpo mucoso, e poucas vezes entende com a constituição, lavra mais, ou menos, a vermelhidão he clara, e desaparece, quando se comprime com o dedo, apresenta pouca, ou nenhuma inchação, algumas vezes bolhas, como as dos causticos, e quando se resolve, que he quasi sempre, cahe a epiderme em escamas. O frio, o calor, ou qualquer outro estímulo, mas particularmente miasmas, são as causas do erithema, o qual poucas vezes he seguido de gangrena. A erisipéla profunda, que vem pelas mesmas causas obrando em differente structura, tem o seu assento ou na cellular, que liga o corpo adiposo ao couro, ou no mesmo corpo adiposo. No primeiro caso, a pesar da inchação, e vermelhidão serem maiores do que no erithema, tambem se resolve communmente; poucas vezes he

se-

seguida de gangrena, e menos de suppuração. No segundo tem todas as qualidades do fleimão, isto he, causa bastante inchação, tensão, vermelhidão, calor, e dor, poucas vezes se resolve, mui frequentemente faz cahir o corpo adiposo, e pelle em gangrena, e quando suppura he em muitos pontos, os quaes, affastados huns dos outros, fórmão muitos abscessos.

Todas as inflammções participão mais, ou menos de certas qualidades derivadas dos temperamentos; por cujo motivo vemos, que nos temperamentos sanguineos as inflammções são ordinariamente fleimonosas, e mais rapidas em todos os seus processos, o que as fez chamar verdadeiras; nos melancolicos as inflammções são communmente erisipelatosas, mais lentas nos seus processos, e mais perigosas; nos lymphaticos são sempre mais brandas, brancas, e pouco dolorosas, mas mui tendentes ao processo da gangrena. Estas forão chamadas falsas, ou lymphatico-sanguineas. (a) *Da*

(a) Os antigos attribuirão estes caracteres parti-

Da resolução da inflamação.

§. XIII.

A resolução he hum processo , talvez o unico que se póde com propriedade chamar terminação da inflamação ; porque por este processo se desfvanee a inflamação , sem ficar , ou se seguir alteração alguma na structure da parte , ao menos sensível. A resolução por tanto faz-se , quando , removidas , ou moderadas as causas remotas , o poder da restauração vence o espasmo , e então o sangue , que está dentro dos vasos , achando livre passagem , continúa a sua carreira pela
pro-

culares das inflamações aos differentes humores , que suppunhão dominar nas constituições , e assentaráo que o sangue tinha toda a parte nas fleimonosas , a colera nas erisipelatosas , e a lymphá nas lymphaticas. Nós porém que conhecemos , que os temperamentos são hum effeito da modificação dos solidos , que preparam os liquidos a seu modo , conhecemos igualmente que os ditos caracteres são hum effeito da força , ou debilidade constitucional.

propria acção dos mesmos vasos , e o suor , e lymphá coagulavel , que se achão diffundidos na cellular , são promptamente absorvidos ; e deste modo se desvanece a congestão. A resolução he seguida communmente de huma transpiração abundante , que humedece a parte , effeito do despejo dos vasos exhalantes da pelle , até alli embaraçados pelo espasmo. Na ordem , em que a resolução se vai fazendo , vão amainando todos os symptomas da inflammação , e apparece ás vezes alguma excreção augmentada , como suor , urina , salivação , diarrhea , &c. , cuja excreção se chama crize , a qual nem sempre he sensível , mas existe sempre , e he hum effeito da restauração do equilibrio , que adquire a constituição , até alli perdido pelo embaraço das excreções , e não a deposição de materia morbosa , como tem pertendido os fluidistas. (a)

Tom. IV.

D

Co-

(a) A crize , quando cessão os symptomas , he na verdade hum final de melhora , não porque dê fahida a materia morbosa , mas porque mostra a restau-

§. XIV.

Como a resolução he a terminação mais favoravel da inflammacão , fica claro , que nós devemos buscar todos os meios para ajudar a natureza nesta grande obra. Todavia ha muitos casos , em que nos devemos desviar desta regra , e promover quanto for possivel a suppuração , como 1.º nas inflammacões , que vem como crize de alguma doença , ou estado morbofo da constituição , as quaes nós devemos reputar como huma excreção precisa para a restauração das funções , ainda que por lugar improprio (*a*) , havendo com tudo a cautela de chamar a crize a outra parte por meio de estímulos , se o lu-

ração das funções , particularmente quando a inflammacão tem entendido com toda a economia animal.

(*a*) Quando alguma parte do corpo , por alguma causa topica dependente da estrutura , ou de molestia , se acha mais disposta a receber a fluxão dos liquidos , isto he , quando algum estímulo chama a dita fluxão , e a constituição busca restaurar-se , então o faz pelo lugar estimulado ; porque cede mais aos seus esforços , e esta crize se chama impropria.

lugar atacado for de grande importancia, como os olhos, &c. : 2.^o nas inflamações fleimonosas, e particularmente sendo a causa miasmas: 3.^o nas que precisamente hão de suppurar, como nas que vem por causa de corpos estranhos, que a constituição ha de expulsar, ou alguma porção de partes tiver perdido a vida em consequencia de grandes pizaduras.

§. XV.

Ha muitas inflamações, que se resolvem espontaneamente pelos esforços da natureza. Aquellas porém, que os ditos esforços não resolvem sem o soccorro da arte, devem contemplar-se pelo lado da constituição, pela parte atacada, e pelo estado das mesmas inflamações, para se lhes apropriarem, e proporcionarem os meios curativos. Quando as causas remotas são conhecidas, e cabe nas nossas forças removellas, ou moderallas, he sem dúvida alguma por onde devemos principiar, como tirar corpos estranhos, remo-

ver apertos , suspender , se he possivel , pela quietação os movimentos da parte , aproximar as partes separadas , e mitigar com topicos os effeitos dos estímulos , segundo a sua natureza. Removidas , ou mitigadas as causas remotas , a natureza faz algumas vezes o resto. Porém se a causa proxima tem crecido muito , ou os estímulos continuão , volta-se em causa secundaria , e leva a inflamação ao processo da suppuração , ou da gangrena: pelo que o objecto principal na cura das inflamações he diminuir a acção dos vasos augmentada (a) , 1.º com dieta mais , ou menos severa , segundo as forças : 2.º com quietação , tanto do corpo , como da parte atacada : 3.º com soltura de ventre por meio de ajudas , ou brandos purgan-

(a) Como a acção dos vasos augmentada se volta em causa secundaria , que cresce segundo a permanencia , ou força dos estímulos , e estado constitucional , fica claro , que esta acção , que até hum certo ponto he hum instrumento da melhora , passa a ser o maior mal , logo que excede o dito ponto , e que na moderação do seu excesso está a maior parte da cura.

gantes , particularmente mostrando a lingua algum vicio de primeiras vias ; e se a inflammção he falsa , ou erisipelatosa , nada he tão efficaç como os emeticos (a) em pequenas doses , mas amiudadas , talvez porque removem o espasmo , e promovem a transpiração , e suor , excreções as mais proveitosas na cura das inflammções : 4.^o com sangrias proporcionadas ás forças , idade , e gráo da inflammção , advertindo , que poucas , e grandes produzem melhor effeito , do que muitas , e pequenas : com tudo não se deve tirar tanto sangue , que a constituição debilitada , e por tanto mais irritavel , caia n'outras molestias , ou faltem as forças para os outros processos da inflammção , no caso de se não conseguir a resolução , o
que

(a) Não só nestas especies de inflammção são uteis os emeticos , mas naquellas , em que obráo miásmas sedativos , como no carbunculo ; e eu tenho observado , que do uso dos emeticos se tirão mui boas consequencias em toda a casta de inflammções , que reinão neste Paiz , onde poucas , ou nenhuma vez apparece a inflammção verdadeira.

que muitas vezes acontece , quando se attende só á inflammação , sem se medirem as forças: 5.º com abundantes bebidas diluentes , nas quaes faremos entrar as preparações antimoniacas , e opiadas , particularmente havendo vigílias , ou grandes dores. (a)

As inflammações internas , ou invisíveis exigem estes soccorros com mais promptidão ; porque todos os processos , que não seja o da resolução , são perigosíssimos , ainda que a resolução he mais trivial , em razão das estruturas , e proximidade ás forças vitales produzirem o mais das vezes as inflammações adhesivas.

§. XVI.

Posto que estes meios , variados , augmen-

(a) Estes meios , todos debilitantes , não só diminuem a acção dos vasos augmentada , ou a causa proxima da inflammação , mas tambem as forças: pelo que se devem regular de maneira , que não venha a fraqueza constitucional a produzir males maiores , como dispôr para mais irritabilidade , e por consequencia para a gangrena.

gmentados, ou diminuidos, que convem a todas as especies de inflammação (a), sejam empregados muitas vezes com feliz successo ; com tudo he preciso ajudallos com os topicos convenientes , segundo o gráo, e especie das mesmas inflammações. Nas erisipelatosas , que vem acompanhadas de symptomas moderados, he prática quasi constante agazalhar a parte sem applicação alguma topica. Com tudo esta prática, que algumas vezes aproveita, he arriscada ; porque muitas vezes principião as erisipélas mui brandamente, e quasi de repente se aggravão os seus symptomas ao ponto de passarem á suppuração , ou gangrena: pelo que convem lavar a parte erisipelada duas , ou tres vezes por dia com huma branda solução de sal de chumbo , e depois de secca , polvilhalla com al-

(a) Ainda aquellas , que tem huma causa especifica, como a venerea, escrofulosa, &c., se moderão , e muitas vezes se extinguem por estes meios. Porém não devemos deixar de lhes ajuntar aquelles remedios , que são proprios a cada causa especifica , como mercurio, quina, &c.

alguma farinha, ou polvilhos. Se a pesar destes remedios a erisipéla augmenta, então cumpre fazer uso dos mesmos topicos, que empregamos nas fleimonosas, sem attendermos á prevenção, que ha contra os topicos nas erisipélas. (a)

Entre todos os remedios topicos nenhum he mais proveitoso pela brevidade, com que québra a acção dos vasos, do que a sangria local, por meio de bichas, ou esscarificações, cuja sangria deve ser proporcionada, ou repetida segundo o gráo de inflammação, e forças do enfermo.

Depois da sangria local, ou não sendo precisa, empregaremos os emollientes, sedativos, ou tonicos em vapores, banhos, ou cataplasmas. Os vapores con-

vem

(a) Esta prevenção vem da supposição errada dos antigos, que pelas erisipélas depunha a constituição alguma materia morbosa, ou veneno, que convinha tirar-se pela parte, por suppuração, ou por transpiração: mas nós, que sabemos que esta inflammação, quando não he crize, está na ordem de todas as outras, devemos resolvella, se for possível, para prevenir a suppuração, ou gangrena.

vem muito no principio das inflammações , e quando ha muita sensibilidade. Os melhores são os de agua quente com algum vinagre , as infusões de flores de fabugo , de verbasco , de malvas , &c. , ás quaes se póde ajuntar agua ardente , ou espirito de vinho , particularmente se a inflammação for falsa. Os banhos , principalmente de regadio , são talvez das melhores applicações topicas ; porque , além de removerem o espasmo , e diminuir a tensão dos solidos , são pelo choque huns brandos excitantes , que promovem a absorvencia dos liquidos diffundidos na cellular. Estes banhos fazem-se com as mesmas infusões , ajuntando-se-lhes o sal de chumbo , e algum sal amoniaco ; e se a sensibilidade da parte tolera appósitos molhados nestas preparações , he hum banho permanente , que faz muito bem , com tanto que se não deixem esfriar , e secçar os ditos appósitos. As cataplasmas são a peor applicação em razão do pezo , e só convem quando as inflammações

se fazem estacionarias , ou por muito adiantadas podem ter tendencia a resolver-se , ou suppurar-se. As cataplasmas compõem-se dos cozimentos , e farinhas emollientes , ou das aguas saturninas com miolo de pão.

Se a inflammação , quebrada a acção dos vasos , e diminuida a tensão da parte , e symptomas , se não resolve , porque os mesmos vasos perdem o poder de contracção , então he preciso recorrer aos topicos ligeiramente tonicos , para que excitem a absorvencia , e a acção perdida , cujos tonicos se applicão separadamente , ou se combinão com os emollientes naquella gráo , que convier ao estado da inflammação. Todos os topicos se devem applicar mornos ; porque o frio augmenta a irritabilidade , e por consequencia a inflammação , ou extingue o poder vital da fibra , e chama a gangrena.

§. XVII.

Além dos remedios constitucionaes ,

e topicos , que empregamos para resolver as inflammções , fazemos certas derivações , que muitas vezes aproveitão , e com tanta promptidão , que não deixão a menor dúvida do seu effeito. Estas derivações ou se fazem por meio da descarga dos liquidos , como quando sangramos nas jugulares , ou farjamos os tegumentos da cabeça nas inflammções internas desta parte , ou por estímulos , como quando applicamos o vesicatorio na garganta , havendo esquinencia , na parte externa do peito , havendo pleuriz , atrás das orelhas nas ophtalmias , &c. (a) , cujos estímulos

E ii obrão

(a) Os fluidistas suppõem que as derivações se fazem , porque os humores alterados vem ao lugar estimulado , e mesmo as causas , que os alterão : porém nós conhecemos a impossibilidade disto ; porque os humores absorvidos seguem as vias da circulação , e são depositos por alguma excreção , quando não podem prestar na constituição ; e por tanto as derivações por meio de descargas de sangue , ou outros humores , são evacuações , que diminuem a massa geral , e a acção dos vasos ; e os estímulos produzem huma nova acção , ou semelhante á que existe na molestia , ou differente , na qual acção , divertidos os esforços

obração na constituição em geral , e por consequencia na parte affecta , ou entendem privativamente com esta , por continuidade , e contiguidade de partes , ou por intimas relações estabelecidas por nervos , por semelhança de estrutura , por situação , &c.

Da suppuração.

§. XVIII.

A suppuração he hum effeito da inflammation , quando esta não termina pela resolução , ou não causa a gangrena. Em quanto a inflammation se conserva no estado-

da natureza , deixão de obrar com a mesma energia no lugar affecto , e dão lugar á dissipação da molestia.

Algumas vezes succedem as derivações por excreções augmentadas , que algum estimulo desconhecido promove ; outras vezes causas topicas , tambem desconhecidas , excitão o estimulo , que faz apparecer a mesma molestia no lugar estimulado , como a gota , ou que faz apparecer outra molestia differente , que dissipa a primeira , como a inflammation do testiculo , que faz desapparecer a gonorrhœa , &c.

tado adhesivo , acha-se pendente para a resolução , suppuração , ou gangrena.

Se as causas remotas excitão , mediante o espasmo , huma grande , ou aturada acção , o foro , e lymphá coagulavel continúa a diffundir-se pela cellular , e não podendo os absorventes tirar tanta quantidade , ou perdendo a sua acção , resulta o augmento da congestão , augmento em que crescem os symptomas constitucionaes , a dor , vermelhidão , e calor , e sente-se latejar a parte de modo , que se podem contar as pulsações (a). Quando a inflammacão chega a este estado , e apresenta estes symptomas , não entra em dúvida , que se encaminha á suppuração , em cujo estado parece não haver differença alguma , excepto a do augmento da congestão , e maior dilatacão dos vasos (b).

E

(a) Efeito dos muitos vasos cheios de sangue , que fazendo como huma massa continuada , deixa perceber junto o impulso do sangue , que recebe por muitas vias.

(b) Como eu não penso , que a inflammacão adhesiva , a suppurativa , e ulcerativa sejam especies dif-

E como a suppuração póde ser excessiva, ou fraca, resultando no primeiro caso a destruição de órgãos, ou partes muito interessantes á vida, e no segundo más suppurações, e chagas de difficullosa cura, segundo os lugares atacados, cumpre regular de maneira a constituição, que se evitem estes dous excessos, humas vezes sangrando, purgando, adietando, e dilu-
in-

ferentes, tambem penso, que a suppuração, e a gangrena são, ou podem ser effeitos da inflammiação, que segundo os seus differentes grãos dá estes differentes resultados, dependentes da intensidade, e natureza das causas, da disposição local, e constitucional, e da estrutura da parte, ou, para melhor me explicar, que quando a intensidade das causas, a disposição, e a estrutura limitáo a inflammiação a hum certo gráo, segue-se a resolução, que quando o sangue acode com maior impeto, suffocando os vasos, e extinguindo-lhes o poder vital, segue-se a gangrena, e que quando a inflammiação segue o estado médio entre a resolução e gangrena, seu resultado he a suppuração: pelo que penso igualmente, que por effeito de hum a mesma acção maior, ou menor, e debaixo do mesmo processo, se seguem os tres resultados differentes, isto he, a resolução, a suppuração, ou a gangrena.

indo o doente como fica dito (XV), havendo muitas forças, outras vezes dando os tonicos, e restaurantes de forças, como quina, &c., havendo debilidade. Localmente convem os suppurantes, isto he, applicações, que conservem hum certo gráo de calor, e humidade na parte, que, relaxando-a, se moderem os symptomas, e offereça menos resistencia aos esforços da natureza. Os suppurantes applicão-se em banhos, fomentações, emplastros, e cataplasmas. Os banhos, que se fazem com os cozimentos das plantas emollientes, e anodinas, tem lugar nas inflammções erisipelatosas, e quando ha muita sensibilidade. Tambem se podem molhar appositos nestes cozimentos, e applicallos na parte com as cautelas de os não deixar esfriar, ou seccar. As cataplasmas, que se fórmão ajuntando-se aos cozimentos emollientes alguma farinha, como a de linhaça, de centeio, de trigo, &c., tem lugar nas inflammções fleimonosas, e naquellas, em que se pertende decidi-

da-

damente a suppuração , porque as cataplasmas são entre todas as fórmãs de suppurantes as que satisfazem melhor os fins de conservar o calor , e humidade na parte.

Quando ha muitas dores , podem formar-se as cataplasmas com os anodinos , como leite , miolo de pão , gemmas d'ovos , &c. , ou com os sedativos , como o mesmo miolo de pão em alguma agua saturina. As fomentações , que se fazem com gordura de porco , ou outros oleos , tem lugar nas inflammções , que levão muito tempo a suppurar ; porque os oleos relaxão a pelle , e fixão por mais tempo o calor na parte. Podem tambem ajuntar-se os oleos ás cataplasmas ; porém não são tão efficazes , como quando se unta a parte com elles , e se cobre com as cataplasmas. Os emplastros , ou unguentos são mais proprios para os pequenos focos inflammatorios , como frunculos , fleimões , &c. , e nos tumores chronicos , que principião a inflammarse , ou se pertendem inflammarse.

Algumas vezes convem ajuntar aos suppurantes os estimulantes , para se conseguir a suppuração , particularmente quando a constituição he debil , ou a causa , que produz o estímullo , obra como sedativo , o que se vê nas inflammções carbunculosas , nas esquinencias malignas , &c.

Da formação da materia , ou pús.

§. XIX.

Os esforços da natureza per si sóz , ou ajudados destas applicações , fazem passar a inflammção do estado suppurante para o suppurado , ou de suppuração , isto he , fazem ajuntar a lymphá coagulavel , e foro diffundidos na cellular em huma cavidade commun , chamada abscesso (a) , o que succede rompendo-se os

Tom. IV.

F

se-

(a) A mistura do foro , e lymphá coagulavel com muito pouca alteração , nascida da demora , e augmento do calor da parte inflammada , que lhe dissipa as partes mais fluidas , he o que constitue a materia , ou pús , que achamos nos abscessos simples. A materia jámais se fórma sem inflammção ; mas for-

septos, que ha entre cellula e cellula, ou morrendo pela suffocação alguma porção da mesma cellular.

§. XX.

A ruptura dos septos das cellulas, ou a morte de algumas substancias animaes pela suffocação, como corpo adiposo,

ma-se muitas vezes sem ulceração, como se vê em grandes collecções de pús achadas nas cavidades do peito, e do ventre, sem as partes continentes, e contidas se acharem ulceradas: do que colligimos, que para haver materia basta só a exhalação da lympha, e foro nas cavidades, canaes, e cellulas em maior abundancia, e existindo hum certo gráo de calor, que lhes dissipe as partes mais fluidas; por quanto sabemos, segundo as experiencias de Hunter, que quanto mais numerosos são os globos brancos, que nadão em hum liquido aquoso, mais espessa he a materia, e mais se aproxima aos caracteres de verdadeiro pús. Os antigos suppunhão, que os solidos entravão, dissolvendo-se, na formação da materia, á qual davão qualidades acres, e corrosivas: mas nós vemos que a materia não corroe as substancias animaes vivas; porque, se isto succedesse, nunca se curarião as chagas. Além disto vemos que as mesmas substancias mortas, como bocados de cellular, de carnes, de tendões, de ossos,

fo, carnes, tendões, &c., he demonstrada por sinaes constitucionaes, e locaes, que fazem conhecer, que a inflammiação passa do estado suppurante para o suppurado, o que os antigos chamavão impropriamente cozimento da materia. Os sinaes constitucionaes são calefrios causados pelo

F ii

no-

&c., sahem inteiras dos abcessos, e apenas pelo aturado tempo, maceradas no pús, soffrem alguma dissolução. He verdade que a materia pôde adquirir muitas alterações nascidas do ar, do sangue, e mesmo das substancias animaes, que dissolvidas se misturão com ella; mas isto são alterações secundarias, que nada tem com a sua formação, e que só a carregão de qualidades, que ella não possui, como espessura, delgadeza, côr verde, amarellada, ou negra, e diferentes cheiros, &c. Além disto, como vemos materia formada nas cavidades, e canaes, sem ulceração, ou destruição dos solidos, conhecemos que não he preciso, que os ditos solidos se dissolvão para haver materia, e que se estes se dissolvem, ha mais alguma cousa, do que materia, como se prova pela consistencia, sabor, cheiro, e côr deste liquido emanado de chagas complicadas com carias, offensas de tendões, ligamentos, glandulas, ou lesão de alguns órgãos internos das cavidades, como intestinos, &c.

novo estímulo (*a*) excitado pela materia nos solidos , que se rompêrão , os quaes se fazem mais , ou menos sensiveis segundo a grandeza da congestão , e sensibilidade do lugar (*b*) , cujos calefrios são
fe-

(*a*.) A materia , isto he , a mistura do foro , e lymphá coagulavel , em quanto está contida nas células , canaes , ou cavidades , onde se ajunta , e se fórma , não he substancia estranha , e por tanto não causa estímulo ; mas assim que os septos se rompem , ou morre alguma substancia animal , e que a dita materia toca o solido vivo , que não estava affeito a ella , causa hum novo estímulo , que pelas mesmas razões apontadas (III) produz os calefrios , e mais symptomas , os quaes continuão mais ou menos até a materia sair para fóra. He deste modo que as excreções , como urina , bilis , e outras , não produzem certos estímulos , em quanto se achão contidas nos canaes , que as preparão , e contém , e os causão passando a tocar outras partes. He deste modo que a materia dos cáncros , e de outras chagas não produz dores , escoriações , inflammações , e ulcerações , em quanto não sahe das superficies , que a preparão , e produz todas estas cousas logo que passa a tocar superficies diferentes. E isto porque a disposição , ou modificação dos solidos , de que a materia recebe as suas qualidades , são diferentes das que vai tocar.

(*b*) Nós observamos que a materia formada nas:

seguidos de pulso brando, e cheio de diminuição, ou total extinção de febre, e abatimento de todos os mais symptomas, que existião durante a febre. Os locaes são diminuição de dor, e a que fica deixa de ser pulsante, abatimento de calor, e elevação maior do centro da congestão, ou de muitos pontos, os quaes se mudão de vermelhos em esbranquiçados, e pouco a pouco vão manifestando alguma flutuação.

§. XXI.

Este estado de suppuração, que se tem entendido até aqui pela mudança do humor da inflammação, ou de hum
apo-

cavidades, ou canaes sem ruptura, ou damno dos solidos, não produz calefrios, nem outros symptomas, que dem a conhecer a sua existencia, e o mesmo observamos com pouca differença nos abscessos formados em partes, onde ha poucos nervos, como o abscesso lombar, que existe desconhecido por muito tempo, e só quando a materia rompe as partes externas, he que se faz conhecer: pelo contrario entendem muito com a constituição aquelles abscessos, que se fórmão em partes muito nervosas, como debaixo da pelle, e particularmente nas mãos, dedos, &c.

âpostema em materia , e que nós entendemos pelo derramamento do foro , e lymphâ coagulavel em huma cavidade , ou espaço , chama-se abscesso , o qual pôde ter o seu assento desde a superficie da pelle até ás partes mais profundas. Quanto mais superficial , e pequeno he o abscesso , mais vencivel he a sua cura pelos esforços da natureza , excepto ajuntando-se-lhe alguma qualidade especifica. A materia dos abscessos profundos vem sempre buscando a superficie externa por effeito do mesmo poder de restauração , que nestes casos obra debaixo de huma propriedade geral , que ha nos corpos organizados , pela qual tendem sempre a expulsar para fóra o que lhes he nocivo (a) , o que succede em direcção recta , excepto
quan-

(a) Esta propriedade he tão intallivel , que nós vemos , que a materia formada , por exemplo , entre o peritoneo , e musculos do ventre , rompe estes ultimos , e suas aponevroses , e sahe para fóra , deixando livre o peritoneo. A materia formada nas entranhas do peito , e ventre , abre caminho ao través das paredes destas cavidades , e vem apparecer debaixo da pelle.

quando alguma membrana rija, ou osso se oppõe, ou a materia pelo pezo, não achando resistencia, vai buscar a parte mais baixa; porque então apparece em differentes direcções, e fórma o que se chama feios.

§. XXII.

A materia abre caminho para fahir por meio da inflammação, que se vem propagando de dentro para fóra até atacar a pelle, e a romper (a). Esta inflammação secundaria he produzida pelo estímulo da materia, que toca nos solidos. E posto que o dito estímulo possa ter lugar em todo o abscesso, todavia só naquelle ponto, ou pontos, em que recahe

a

(a) Tem sido huma opinião geralmente recebida, que a materia corroe os solidos, que toca, e que deste modo abre caminho para fahir: mas se se dêsse esta qualidade na materia, deveria corroer para fóra, para os lados, e para dentro, e quanta mais fosse, tanto mais havia de corroer; porém nós vemos o contrario: logo isto deve succeder de outra maneira, e he por meio da ulceração, que tem lugar em hum só ponto do abscesso; pois que vemos grandes collecções de materia fazerem sómente huma pequena ruptura.

a maior imprefião , e comprefião da materia obrigada pela força centrífuga , he que os solidos morrem , e fe segue a ulceração. (a)

Mui-

(a) Polto que Hunter attribua a ulceração á abforvencia da fubftancia animal por effeito desta inflamação secundaria , que elle chama ulcerativa ; com tudo eu , não duvidando da abforvencia em certo gráo , não a posso contemplar como causa da ulceração ; porque obfervo , que não ha ulceração fem perda de fubftancia , excepto nas feridas , que não unem por primeira intenção : e affim a ulceração he hum effeito da morte dos solidos naquelle ponto , em que a materia faz maior comprefião , macerando-os , e extinguindo-lhes o poder vital ; e então eftes , não podendo resistir á materia , lhe cedem paffagem , ficando hum espaço , que principia a granular , meio pelo qual fe estabelece a união , que obfervamos nas curas por segunda intenção. He deste modo que nós obfervamos abrirem-fe chagas pela comprefião da cama , isto he , morrendo hum bocado de pelle , que fórma humma codea maior , ou menor , cahida a qual , fica humma chaga. He deste modo que fe abrem grandes chagas , quando algum veneno , ou disposição particular dos solidos extinguem o poder vital da fibra ; porque vemos separarem-se porções de solidos , ou dissolverem-se na materia , dando-lhe caracteres particulares : e por tanto a ulceração só differe da gangrena , em

§. XXIII.

Muitas vezes em lugar de se ulcerar o abscesso, com a formação do qual cessa pouco a pouco a inflamação pela perda da tensão, he absorvida a materia, e deposita por alguma excreção, ficando o lugar do abscesso reduzido em pouco tempo ao estado natural, cujo successo se chama delitescencia: porém se a materia muda de lugar, como algumas vezes acontece, pertence a esta mudança o nome de metaptosis, distinguida em diadexis, quando a mudança se faz para lugar menos nobre, e metastasis, quando se faz para lugar mais nobre. (*a*)

Tom. IV.

G

Do

que naquella as porções mortas são imperceptiveis, e nesta muito consideraveis.

(*a*) Os caminhos, pelos quaes se fazem estas mudanças, são sem dúvida os absorventes, humas vezes mettendo a materia nas vias da circulação, outras vezes conduzindo-a por hum movimento retrogrado nos vasos lymphaticos a outra parte, e particularmente a cavidades, como peito, ventre, intestinos, &c.

*Do que convem fazer na inflammação
suppurada, ou abscesso.*

§. XXIV.

Em quanto o abscesso está muito profundo, ou as cellulas cheias de soro, e lymphá coagulável, se não tem despejado bem na cavidade commum, he preciso continuar os suppurantes (XVIII) até se conhecer huma fluctuação decidida, em cujo estado se diz que o apostema está maduro, ou a materia cozida. E bem que os esforços da natureza bastem algumas vezes para fazer abrir o abscesso, e mesmo para o curar, e restituir a parte ao seu estado natural: com tudo nem sempre se segue esta consequencia; porque mil causas a embaraçam, e outras tantas fazem o resto da cura difficiloso, e mesmo impossivel: pelo que nos abscessos pequenos, e em lugares, onde a demora da materia não seja perigosa, deixaremos obrar os esforços da natureza, ajudando-os com os
sup-

suppurantes até a materia sahir, e depois conservaremos a abertura dilatada por meio de huma mécha, em quanto o abcesso se despeja, granula, e se fecha, e isto para poupar aos enfermos as dores de huma picada com ferro, á qual elles tem sempre muita repugnancia, particularmente sendo muito debeis, e sensiveis.

Porém nos abscessos grandes, ou em que supponmos qualidades especificas, nos criticos, e naquelles, que estão junto a órgãos interessantes, de cuja materia podem ser atacados, e mesmo naquelles, que se fórmão em partes muito gordurosas, como nadegas, margem do anus, &c., devemos abrillos, assim que se conhece a fluctuação, não só para evitar grandes estragos, que a materia demorada póde causar, mas porque he raro que nos abscessos de huma certa grandeza, e no corpo adiposo deixe de haver bocados de cellular morta, que não póde sahir pelas aberturas feitas espontaneamente.

Da abertura dos abscessos.

§. XXV.

Para se abrirem os abscessos , situa-se a parte , e o doente de modo , que a materia tenha declive , e comprimindo-se o abscesso entre o pollegar , e indicador da mão esquerda , se penetra perpendicularmente com hum bisturi , lanceta , ou postemeiro (a) no lugar mais eminente , mais baixo , e de maior fluctuação , com tanto que seja livre de arterias , vêas , nervos , ou tendões. Se a primeira abertura , que se faz ao comprimento da parte , não basta para dar sahida á materia , ou ficar bolsa , onde esta se demore , cumpre cortar-se a pelle até á parte mais baixa , mettendo-

(a) He da ultima indifferença , que o abscesso se abra com lanceta , bisturi , ou postemeiro ; com tudo os pequenos , nos quacs basta huma simples penetração , abrem-se mais commodamente , e com menos dores com a lanceta , ou postemeiro : os grandes porém , que além da penetração , carecem de dilatações , só com o bisturi se podem abrir bem.

do-se o bisturi na cavidade do abscesso, abrigado do dedo indicador da mão esquerda, ou de huma tenta canula, para não offender alguma couza, e com elle cortar quanto for preciso, para que a materia se não demore. Se a materia se achar debaixo de algum musculo, membrana, ou aponevrose, se farão as dilatações ao correr das fibras destas partes, para maior facilidade da cura. Em muitos abscessos achamos além da cavidade principal muitos seios, ou cavernas communicadas, as quaes devemos dilatar, se a materia se demorar nellas, segundo a situação, em que a parte deve jazer; mas se a materia tiver sahida livre pela primeira abertura, pouparemos as segundas, porque são absolutamente desnecessarias. Em quanto á grandeza das aberturas dos abscessos, deve regular-se pela extensão, e qualidade do mesmo abscesso; porque nos pequenos, e resultados de huma suppuração saudavel, bastão pequenas aberturas: porém nos grandes, e nos que resultão de pan-

ca-

cadaveres, tumores chronicos, ou qualidades especificas, he preciso fazer maiores aberturas.

§. XXVI.

Evacuada a materia, faremos a primeira cura, que será relativa á grandeza do abscesso, e qualidade da materia (a).
Nos

(a) A materia, que resulta das inflamações, he sempre a mesma, mais delgada, ou mais espessa segundo a abundancia do foro; mas pôde adquirir modificações particulares, se os solidos, que a preparação, tem tambem adquirido alguma modificação particular, como se vê no cancro, nas escrofulas, &c.; além disto pôde carregar-se de qualidades especificas, ou dos venenos, que forão a causa excitante da inflamação, que a produzira, como se vê no bubão, nas bexigas, &c., e tambem se pôde carregar dos globos vermelhos do sangue, quando algum vaso mais consideravel se rompe, ou os exhalantes da lympha, e foro se dilatão muito na força da inflamação, e finalmente de substancias animaes, como carnes, membranas, tendões, ossos, &c., dissolvidas pela putrefacção, ou dos humores, que certas partes filtrão, como saliva, bilis, urina, &c., de cujas misturas resultão differentes caracteres á materia, os quaes nos mostrão as complicações dos abscessos, e das chagas, e nos indicão a necessidade dos meios curativos, que devemos empregar. Os fluidistas pretendem emendar

Nos abscessos pequenos , que se abrirem per si mesmos , ou lhes fizermos pequenas aberturas , basta applicar nestas alguns fios molhados em gemma d'ovo , e por cima

as

as qualidades da materia nos humores , suppondo que ellas emanão da massa geral : mas nós , que sabemos o contrario , fundamos a nossa therapeutica com mais segurança nos meios topicos , e constitucionalmente nos limitamos a augmentar , ou diminuir forças , e a corrigir venenos , ou disposições , que podem irritar , ou debilitar a constituição , para que nos abscessos , e chagas se forme boa materia , e boa granulação , mediante o estado saudavel dos solidos. A granulação , ou formação de novas substancias semelhantes ás perdidas , ou ás que lhes servem de base , he o que os antigos chamarão regeneração de carnes. Garengcot * explica a regeneração das carnes , dizendo que o succo nutriticio , que sahe dos vasos , se pèga a elles , e fórma hum anel , e sobre este outro , e outros até encher o vazio da solução de continuidade. Quesnay ** diz , que o succo nutriticio fórma huma massa informe em lugar de substancia organica , cuja massa suppre as faltas. Eis-aqui as duas opiniões , que vogarão até que Fabre *** tratou da regeneração , ou encarnação

* Tratado das Operações.

** Tratado da Suppuração.

*** Memor. da Acad. Tom. IV. pag. 74.

as mesmas papas, ou cataplasma, de que antes se usára : porém nos grandes, em que praticamos maiores aberturas, cumpre encher o vazio com fios molhados na
mes-

das chagas como de hum fantasma vão, que desaparece assim que se faz mais alguma reflexão. A diminuição, que soffre hum membro amputado, a cova, que fica em huma ferida com perda de substancia, a aproximação da pelle ao centro de huma chaga cicatrizada muito além dos limites, a que deveria estender-se, se não houvesse perda de substancia, e finalmente a formação da cicatriz em cima da duramater nas operações do trepano, são os motivos, que obrigáráo este pratico, e Luiz * a não admittirem a regeneração das carnes, estabelecendo como principios certos, que a granulação boa, ou má depende da dilatação dos vasos, que entrão na composição das partes, que tem passado pela inflammação, do mesmo modo que se elevão excrescencias na conjunctiva, e por tanto gozando da organização natural; que a cicatriz he hum effeito da sequidão dos mesmos vasos, consolidada pelo succo nutriticio, ou gluten, o qual adquire com o tempo a firmeza precisa para resistir aos esforços, que podem tender a separar as partes, que elle une; e finalmente que as faltas dos solidos animaes só podem ser suppridas ou pela dilatação

* Memor. da Acad. Tom. V. pag. 128.

mesma gemma d'ovo , e applicallos tão brandamente , que não fação a menor compressão , nem excitem grandes estímulos. Do segundo , ou terceiro dia por diante curaremos a chaga com os reme-

Tom. IV.

H

dios,

das partes organicas , no que os vasos intumecidos tem toda a parte , ou por huma massa informe , resultada da effusão dos succos congelados , na qual se não descobre a mesma organização da parte perdida , como nos callos , ou poros , que supprem a falta dos ossos , aos quaes falta a medulla , membrana medullar , os vasos , &c. , e só tem a dureza precisa para encherem o fim , a que são destinados. Porém a pesar das razões , que encontramos nas memorias destes AA. para refutarem a regeneração das carnes ; com tudo não podemos duvidar , que se fórmão novas substancias pela lympha coagulavel nas partes , onde tem havido falta , as quaes continuão as funções do lugar , do mesmo modo que se não tivesse havido a dita falta. João Hunter tem mostrado com bastante clareza a medrança da materia animal sobre as superficies feridas , ou expostas , ainda que pouco differe da maneira , pela qual se explicou Garengeot. A lympha coagulavel , que sahe dos vasos , não só faz a sua continuação , pegando-se a elles , mas fórma outros novos ; porque a granulação he mais vascular do que todas as outras partes. Estes novos vasos são ramos , que nascem da continuação dos originarios , á

dios, que pedirem as suas complicações, e estado, até a granular, e cicatrizar, o que he facil no abscesso simples com os brandos digestivos no principio, e depois com fios seccos.

Os

maneira da vegetação ; porém a granulação laudavel nunca excede a huma certa distancia , e he talvez aquella , a que a pôde levar o poder da restauração , sendo esta a razão , por que não vemos crescer as partes animaes muito além dos limites , que a natureza lhes tem prescripto ; e isto parece tanto verdade , que a granulação nos fugeiros debeis , ou idosos , e em partes , onde ha poucos poderes de restauração , ou morbosas , he pouca , e de má qualidade. As partes mais vasculares produzem os grãos da granulação mais formosos ; porque alli se encontra mais poder de restauração , e he pela razão da maior , ou menor abundancia de vasos , que a granulação he desigual. Se a superficie , que serve de alento á granulação , se acha morbosa , a granulação he igualmente morbosa , e faz huma excreção semelhante á que faria a mesma superficie , como se vê no cancro : além disto excede os limites prescriptos , e fórma o que se chama granulação babosa , a qual he branda , spongiosa , branca , ou denegrida , morre com muita facilidade , e he incapaz de produzir pelle , ao contrario da boa granulação , que he vermelha , firme , igual , e por tanto com disposição para formar pelle. A lymph

§. XXVII.

Os abscessos chronicos, isto he , os que resultão de outra qualquer causa , que não seja a inflammação , como inchações

H ii

bran-

coagulavel entornada nas superficies de huma ferida recente faz a união por primeira intenção , colando as partes , sem granular em , humas ás outras , e entornada sobre a granulação das chagas suppuradas faz a união do mesmo modo , logo que a dita granulação de hum lado se toca com a do outro ; e então seus vasos unidos boca a boca , estabelecem a passagem dos liquidos , mudando em circulação o que até alli fora excreção , e até o influxo dos nervos , talvez porque estes órgãos se regenerão como os vasos. Daqui vem , que os abscessos granulados se fechão quasi de repente assim que se aproximão as suas superficies , e as chagas oblongas correm á cicatrização com mais promptidão. As partes suppridas , e unidas pela granulação são muito vermelhas no principio , e depois vão descorando até ficarem mais brancas , e isto porque a absorvencia intersticial tira dalli as partes mais liquidas , seguindo-se huma união mais firme , e por consequencia a diminuição de certas grossuras , que ficão nos lugares cicatrizados.

A granulação saudavel , ou morbosa nos faz conhecer a natureza das chagas , e estado constitucional , e nos indica os remedios , com que mais promptamen-

brancas , &c. , são mui difficultosos de curar , não só porque a estrutura , onde se fórmao , tem pouco poder de restauração , mas pôrque constantemente são effeito de huma debilidade constitucional , ou local ,

que

te podemos levar huma chaga á cicatrização , humas vezes promovendo-a com os suppurantes , outras reprimindo-a com os dessecantes , e compressões brandas para se formar a pelle.

A pelle , ou cicatriz , que se fórma nas chagas , e mesmo nas feridas , que unem por primeira intenção , ainda que pouco sensível , forma-se sempre do mesmo modo , e he seccando-se as superficies da granulação , que se não tocão humas com as outras ; porque os poderes da restauração limitados não podem levar mais longe o crescimento da dita granulação ; e como a lymphá coagulavel faia ainda pelos poros desta granulação secca , fórma huma capa , ou verniz , a que chamamos epiderme , ou cuticula , a qual nas cicatrizes he mais intimamente ligada á granulação , que faz as vezes de couro ; por cujo motivo falta o corpo mucoso , e he supprido por huma delicada camada de cellular , que não tem a mesma estrutura do corpo mucoso , como se vê nas cicatrizes dos pretos , que ficão brancas toda a vida , quando o couro tem sido destruido. He nesta camada de cellular que se ajunta o foro , e lymphá , que levanta o epiderme , quando se applicão causticos nas cicatrizes. A sequidão da gra-

que poucas vezes se emenda. A rebeldia da cura destes abscessos , e o pouco fructo , que se tem tirado dos differentes methodos empregados até o dia de hoje , nos põe na dúvida de qual devemos seguir. Os antigos , que não conhecião as differenças , que ha entre abscessos agudos , e chronicos , nem mesmo as causas ,
por

nulação , ou disposição para a cicatriz , principia junto á margem da pelle antiga , e se vai ordinariamente estendendo por círculos para o centro , até de todo se fechar a chaga. Eu digo ordinariamente , porque algumas vezes nas chagas antigas principia no centro , ou em muitos pontos á maneira de ilhas.

Se a granulação , por effeito do excessão de poder de restauração , como succede nas escaldaduras , bexigas , e em outras chagas , excede ao nivel da pelle , forma-se a cicatriz em cima de altos , ou grossuras , que custão muito a desfazer-se , ou ficão toda a vida. Quando porém ha grandes perdas de substancia , ou o poder de restauração he fraco , fião covas , como acontece na operação do trepano. Ao passo que a granulação se contrahe por effeito da sua acção muscular , ou da absorvencia intersticial , a cicatriz formada sobre ella repuxa a pelle para o centro , e faz diminuir a extensão da cicatriz , como se vê nas amputações.

por que as curas erão tão difficultosas , praticavão grandes aberturas , com as quaes expunhão toda a cavidade do abcesso ao toque do ar , e remedios topicos , o que parece concorrer muito para os funestos fins , que tem ordinariamente estas molestias : por cujo motivo os modernos lhes tem prevenido quanto he possivel a entrada do ar , huns picando-os com o trocarre , e evacuando a materia por vezes , outros passando-lhes sedenhos para o mesmo fim , tendo huns e outros em vista a diminuição da cavidade , para que o ar toque menos superficies , quando he preciso augmentar-lhes as aberturas. Porém todos estes methodos aproveitão pouco , como a experiencia me tem mostrado ; e o unico modo por que se salvão mais vidas , he abrindo-os em cruz , em quanto são muito pequenos , e isto por dous motivos : 1.º porque a debilidade constitucional , e local não tem chegado a tão grande auge : 2.º porque sendo a cavidade do abcesso ainda pequena , ha menos per-

perdas, e o ar tem menos superficie que tocar. A abertura em cruz, ou huma grande abertura, dá lugar a podermos curar com os tonicos espirituosos toda a superficie ulcerada, o que se não póde fazer pelos outros methodos, e o que eu julgo como cousa mais interessante para se conseguir a cura.

§. XXVIII.

Posto que a inflammação suppurante, e a mesma suppuração sejam ordinariamente hum processo saudavel, acabado o qual, os doentes ficam bons: com tudo algumas vezes não succede assim, ou porque a constituição mal disposta influe no dito processo, ou porque este, desordenado por muitos accidentes, entende com a constituição produzindo movimentos convulsivos, febres irregulares, ou a febre hectica, o fastio, os vomitos, diarrehas, a magreza, e finalmente a morte. As causas destas desordens ou são constitucionaes, ou locaes. As constitucionaes são de-

debilidade, venenos, ou disposições, que nós emendaremos, podendo ser, com a dieta restaurante; amargos, tonicos, ferro, ar campestre, e com os remedios proprios a cada veneno, ou disposição, que se descobrir. As locaes são a situação da suppuração em órgãos interessantes á vida, ou perto delles, como bofe, figado, &c., em juntas, ou grandes cavidades do corpo, particularmente sendo penetradas, em partes, onde ha pouco poder de restauração, como partes tendinosas, membranosas, ossos, &c., e finalmente em partes, onde podem ficar vasos, e a granulação se não póde tocar, como ao redor do intestino recto, entre o peritoneo, e lombos, &c.; cujas causas produzem os seus effectos, 1.º impedindo as funções dos órgãos atacados, ou dos que tem relações com estes: 2.º dissipando á constituição grande quantidade de liquidos pelas abundantes descargas de materias: 3.º diminuindo o poder vital á força de aturados, ou repetidos estímulos, como

suc-

succede quando os mesmos abcessos , ou chagas , ficando em fistulas , são accommettidas de frequentes inflammções , e suppurações secundarias. As applicações topicas tiradas da classe dos adstringentes , e espirituosos , as dilatações , particularmente havendo seios , ou fistulas , são os meios mais efficazes , que temos , para conseguir as curas : e quando estes fallão , e a parte morbosa está em alguma das extremidades em lugar , que possa ser amputado , teremos recurso a este triste , mas necessario meio para poupar huma vida , sem nos embarçarmos com a febre hectica , ou outros symptomas dependentes do estimulo ; porque , removido este com a amputação , césão os seus effeitos , como a experiencia tem mostrando a todos os praticos no maior numero de amputações bem succedidas , quando são praticadas em sujeitos affectos a estimulos por muito tempo.

Da gangrena.

§. XXIX.

A gangrena , ou mortificação he a perda , ou extinção do poder vital das partes ; e ha duas differenças de gangrena , que são humida , e secca.

Da gangrena humida.

§. XXX.

A gangrena humida he o ultimo resultado da inflammation , e se chama tambem gangrena por suffocação , a qual tem lugar todas as vezes que o sangue , acudindo com grande impeto á parte inflammada , enche os vasos , e os dilata ao ponto de lhes privar os seus movimentos.

Quanto mais robusta for a constituição , mais disposição ha para a gangrena (a) ; porque a acção dos vasos augmenta-

(a) A disposição constitucional , a estrutura do lugar inflammado , e a vehemencia das causas fazem

toda conduz o sangue com maior impeto ao lugar inflammado , e mais depréssa se effectua a suffocação , e se extinguem os movimentos dos mesmos vasos. O mesmo acontece nas constituições debeis ; porque ainda que o impeto do sangue não seja grande , ha pouco poder vital , que se extingue facilmente , e as partes morrem. A estas disposições constitucionaes accresce a debilidade da parte , ou por effeito da sua structura , como se mostra nas inflammções crisipelatosas , que tem mais tendencia para a gangrena , ou por effeito de alguma molestia antecedente.

A natureza do estímulo tem igualmente grande parte na gangrena , como vemos no carbunculo , na mordedura da vibora , e outros animaes venenosos , assim como tambem nas applicações de cer-

I ii

tas

que algumas vezes se declare a gangrena em menos de vinte e quatro horas ; outras vezes que passem muitos dias , e semanas sem este mal se declarar : porém o mais commum he apparecer depois do quinto , ou sexto dias por diante.

tas substancias ao corpo, as quaes, tendo a propriedade de extinguir o poder vital, causão a gangrena sem se formarem grandes congestões.

§. XXXI.

A causa proxima da gangrena (*a*) humida he a inflammation levada ao ponto da suffocação dos vasos, o que succede quando a inflammation pelas disposições constitucionaes, ou locaes, e pela violencia, ou natureza das causas excitantes, não póde terminar pela resolução, ou seguir

(*a*) João Hunter estabelece a causa da gangrena na diminuição do poder, junta com a acção augmentada, destruindo o equilibrio, que deve haver entre o poder, e acção de cada parte: porém eu acho que a diminuição do poder no estado da suffocação he já o principio da gangrena, e não a causa, e que ao passo que o poder se extingue, vão as partes morrendo. Em quanto á acção augmentada, parece-me impossivel; porque onde falta o poder da vida, não póde haver acção, particularmente dizendo o mesmo Author em outra parte, que nós podemos avaliar pouco mais ou menos a quantidade de vida de cada parte pelos poderes da acção.

guir o processo da suppuração. As causas remotas são tudo o que causar as inflamações, das quaes a gangrena he a ultima parte do processo inflammatorio.

§. XXXII.

Quando a inflammação tende a gangrenar-se, crescem consideravelmente os symptomas constitucionaes, e a parte faz-se mais tensa, mais dorida, e mais vermelha, cuja vermelhidão se muda de clara em escura, roxa, ou achumbada, levantando-se algumas bexigas, ou bolhas cheias de soro denegrido, effeito da exhalação forçada do soro no corpo mucoso, e não effeito de acrimonias, como se tem pretendido.

§. XXXIII.

Neste estado ainda as partes conservão alguma vida; mas se de todo a perdem, apparecem os seguintes symptomas, a saber, pulso pequeno, frequente, concentrado, molle, e irregular, anciedades, sede, suorres frios, e algumas vezes delirios, sobre-

bresaltos dos tendões, ou movimentos convulsivos, a parte faz-se negra, perde o sentimento, a tensão, e os movimentos, sendo os musculos tambem atacados, e finalmente principia a exhalar hum fedor insupportavel, effeito da fermentação putrida, em que entrão as substancias animaes, quando perdem a vida. Este estado de podridão chama-se sphacelo, o qual consiste na dissolução das partes depois da vida perdida. (a)

A

(a) O sphacelo he o resultado da gangrena, porque esta precede áquelle: e por tanto não se deve entender por sphacelo senão a total corrupção das partes, e não a morte de todas as que fórmão hum membro, como querem alguns, entendendo por gangrena sómente a mortificação da pelle, e-cellular, e por sphacelo a das carnes, nervos, ossos, &c., cujas partes podem estar mortas sem haver a dissolução, que caracteriza o sphacelo, como acontece nas gangrenas seccas. E como este exige os mesmos soccorros, que exige a gangrena, fica claro que a extensão, e profundidade desta, ou daquelle, e as partes atacadas, nos determinão os meios curativos, e não o seu grão.

§. XXXIV.

A gangrena he sempre hum mal , que merece todo o cuidado pelas suas consequencias. Com tudo quando he pequena , superficial , em humna constituição sadia , robusta , em idade pouco avançada , e procede de causas excitantes , passageiras , ou pouco energicas , termina o mais das vezes favoravelmente : porém em circumstancias oppostas he quasi sempre hum mal mortal , particularmente se ataca partes interessantes á vida , se a constituição não póde ganhar forças , e se em torno das partes gangrenadas se não fórma humna inflammação suppurativa , que põe termo á gangrena , isto he , que separa as partes mortas das partes vivas.

§. XXXV.

Sendo os melhores meios de prevenir a gangrena promover , quanto for possível , a resolução , ou a suppuração : todavia muitas vezes he difficiloso , e mesmo impossivel conseguirem-se pela rapidez ,

dez, com que a inflammação corre ao ultimo processo : pelo que quando virmos pelos symptomas (XXXII), que a inflammação tende a gangrenar-se, cumpre observarmos se ha excesso de forças, ou de debilidade, para emendarmos qualquer destes defeitos. No primeiro caso, isto he, havendo muitas forças, he preciso repetir as sangrias geraes, apertar a dieta, e empregar os mais antiphlogisticos (XV) : localmente nada he tão util como as sarjas ; porque não só despejão o sangue dos vasos, os quaes pela dilatação se não podem mover, e estão proximos a morrer, mas expõe os solidos vivos a estímulos de differente natureza, com os quaes se augmenta a absorvencia, e se divertem os esforços da natureza, que deixão algumas vezes de continuar o processo da inflammação, para seguirem o da suppuração das sarjas (a). Quando
pe-

(a) A experiencia tem mostrado a todos os praticos, que a suppuração das sarjas previne constantemente a gangrena.

pelas sangrias locais se tem quebrado a tensão das partes, em lugar dos emollientes topicos applicaremos os tonicos, como os cozimentos, ou infusões das plantas aromaticas com o espirito de vinho camphorado, e algum sal amoniaco, cujas applicações sós, ou combinadas com alguns emollientes, e sedativos, se ainda ha muita tensão, augmentão o poder dos solidos, e a acção dos vasos, excitão a absorvencia, e deste modo se consegue muitas vezes a resolução, o que de outra maneira seria impossivel. No segundo caso, isto he, havendo debilidade constitucio-
nal, cumpre seguir o contrario do que fica dito, buscando augmentar forças por meio de quina dada em doses pequenas, e amiudadas, conforme for recebida pelo estomago (a). O opio he igualmente util,
Tom. IV. K só,

(a) Eu não fallei das aguas cardíacas, e outros antisepticos, os quaes, em lugar de fazerem bem, fazem mal, em razão de diminuirem o poder, augmentando a acção. O opio está nas mesmas circumstancias; mas como diminue a sensibilidade, e por

lô , ou combinado com alguma preparação antimonial. E he do uſo deſtes remedios que ſe pôde confiar alguma couſa , particularmente da quina. Topicamente fugiremos das ſarjas , como debilitantes , e continuaremos as preparações ſaturninas em cozimentos amargos , cujos remedios , diminuindo a ſenſibilidade , e augmentando o poder dos ſolidos , concorrem para a reſolução.

§. XXXVI.

Porém ſe eſtes remedios ſe empregão ſem effeito , ou tarde , como muitas vezes acontece , e a inflammacão vai ao proceſſo da gangrena deciddidamente conhecida pelos ſymptomas (XXXII) , então não a podemos atalhar , e lô nos reſta embarçar-lhe o progresso. Logo que a gangrena ſe declara , devemos conſiderar a conſtituição no eſtado de debilidade , e por tanto exigindo os meios , pelos quaes ſe augmentão as forças , ou o poder vital :

e

conſequeſcia a acção , vem a ſer util nas gangrenas , que atacão conſtituições deſbeis.

e estes são a quina, o vinho generoso (a), o opio, a camphora, &c., e a dieta restaurante proporcionada ás forças do estomago. Localmente faremos toda a diligencia por fazer parar a gangrena, a qual lavra mais, ou menos segundo a disposição constitucional, a structure local, e a actividade das causas, por effeito do que se vai extinguindo o poder vital, e as partes morrendo. (b)

K ii

Mas

(a) Não acho razão a João Hunter dizer, que o vinho augmenta a acção sem dar hum força real, quando vemos, que os homens de trabalho são assás robustos, comendo mui pouco, e bebendo muito vinho. Além disto a experiencia de muitos annos me tem feito ver os bons effeitos do vinho nos casos de gangrena, particularmente nos doentes, que são acostumados a este licor.

(b) Tem-se pensado, que as partes mortificadas mortificação as immediatas. Se isto assim fosse, não teria fim a gangrena. As partes immediatas morrem pela mesma causa, pela qual morrêra o centro. Tambem se tem dito, que as particulas podres, sendo absorvidas, infectão a constituição, induzindo nos liquidos a diathesis putrida, com a qual se entretêm, e fomenta a gangrena, e se levantão os symptomas consecutivos, como abatimentos de forças, e de pul-

Mas com que remedios se póde fazer parar a gangrena, ninguém com certeza o poderá dizer, prova da pouca efficacia delles ; porque huns praticos aconselhão os emollientes, outros os tonicos: eu supponho que nem huns, nem outros, e attribuo a suspensão da gangrena aos esforços da natureza, mediante huma inflammation secundaria suppurativa, que se declara em torno das partes gangrenadas. A' vista do que fica claro, que devemos contar mais com os remedios constitucionaes, do que com os topicos. Com tudo as embrocações com os cozimentos, ou
in-

fo, fastio, suores frios, delirios, falta de sensações, olhos encovados, e envidraçados, e finalmente a morte. Porém eu, não duvidando da dita absorvencia, a qual póde dar algum trabalho mais á constituição, para depôr por alguma excreção as particulas putridas, ou, para melhor dizer, o gaz azoto, acho que todo o effeito deste gaz he produzido nos solidos, debilitando-os, e não nos liquidos ; pois que os remedios, com que atalhamos os effeitos da podridão, são aquelles, que dão vigor aos solidos, e que, se ha algumas alterações nos liquidos, he em consequencia do estado morboso dos solidos.

infusões das plantas amargas , e aromaticas , os appositos , particularmente as baetas molhadas nestes remedios , o vinho com o sal amoniaco , as cataplasmas de farinha de pão nestes liquidos , e tudo applicado com hum calor moderado , são os remedios mais geralmente adoptados , e com razão ; porque no estado de debilidade , que já existe , devem ser muito nocivos os emollientes , que nós consideramos como debilitantes , assim como tambem as applicações frias. Se a gangrena não cessa de lavar , morre o paciente ; porque faltão os esforços da natureza para o processo da inflammção suppurativa , que deve pôr termo á morte das partes (a). Porém se esta inflammção se decla-

(a) Os antigos pertendião atathar a gangrena com as amputações pela parte sã , sem esperar pela inflammção suppurativa : porém o pouco fructo tirado desta prática tem convencido os modernos , que se deve esperar pela dita inflammção , a qual mostra , que a constituição tem forças , e que a disposição para a gangrena se não estende mais longe , e se não declarará acima da amputação , como tem acontecido to-

clara , e principia a separar-se a codea gangrenosa , cumpre ajudar a natureza nesta separação , applicando nas partes supuradas os brandos digestivos , sobre a codea camadas de farinhas , ou pós absorventes , e sobre as partes inflammadas os tonicos , que ficão ditos , até que pela cahida da codea fique humna chaga simples , que se cura do modo ordinario.

§. XXXVII.

Quando a codea , ou codeas gangrenosas são muito extensas , não podem os esforços da natureza separallas , e , á força de se esgotarem para este fim , põe a vida em grande risco ; e esta he a causa da morte , que algumas vezes vem depois de vencida a gangrena , e tambem de novos insultos gangrenosos nas partes , que nos parecem livres : pelo que convem derubar as ditas codeas , o mais breve que for possivel , humas vezes cortando com
as

das as vezes que esta se tem praticado antes de parar a gangrena.

as pontas da tifoira a cellular , que as liga , outras vezes fazendo-lhes golpes , que as penetrem , para fahir a materia , e azoto , sem com tudo se ferirem as partes sãs , que estão por baixo , para não haver perdas de fangue , cujos golpes se devem encher de fios com digestivos , e não com espiritos , e balsamos , como foi costume , os quaes irritão as partes vivas , e seccão mais as codeas , oppondo-se deste modo á sua cahida.

§. XXXVIII.

Quando porém a gangrena , ou sphacelo atacão a pelle , cellular , e carnes de hum membro , de modo que este , perdido o movimento , e sentimento , se não póde conservar , he indispensavel a amputação , restando alguma parte livre , por onde esta se possa praticar. Para que esta aproveite , he preciso , 1.º que se faça pela parte sã ; e como algumas vezes lavra a gangrena pela cellular ao comprimento dos vasos , e pelos intersticios dos musculos

los muito além dos limites exteriores , devemos observar se a pelle se acha intacta em toda a circumferencia do membro , ou se se acha vermelha , e inchada , e se , comprimindo-se , se sente rugido , ou corre materia em alguma parte ; porque então não podemos deixar de praticar a amputação acima dos seios , que resultão deste estado morbozo : 2.º que se espere o termo da gangrena , o qual nos mostra , que a constituição tem forças para supportar a operação , e não a deposição de toda a podridão , como tem pretendido alguns : 3.º finalmente que se faça no tempo opportuno , isto he , quando a gangrena , deixando de lavrar por tres , ou quatro dias , os symptomas abatem , e o doente sente algum alivio , ou melhora. (a)

Da

(a) Alguns praticos querem , que se espere mais tempo ; e outros , que se não fação as amputações , commettendo á natureza a separação das partes molles , e deixando só á Cirurgia o córte dos ossos : porém as desigualdades , com que a gangrena separa as partes , as hemorragias , que se seguem no progresso da cura , e mais que tudo a debilidade constitucional ,

Da gangrena secca.

§. XXXIX.

A gangrena secca he a morte das partes pela extinção do poder vital, sem haver fluxão, ou congestão de sangue no lugar gangrenado.

§. XL.

As causas desta gangrena são 1.º compressões feitas sobre os vasos de huma parte ao ponto de embaraçarem o círculo, as quaes podem ser effeito de ligaduras, tumores, &c. : 2.º os choques violentos de balas, ou cousas semelhantes, os quaes, induzindo huma especie de estupor nas partes, perdem estas totalmente o poder vital : 3.º o frio, ou venenos sedativos, que tambem extinguem o poder vital. O frio nos Paizes do Norte he

Tom. IV.

L

cau-

e a morte, consequencias inseparaveis desta prática, nos obrigão a lançar mão das amputações debaixo dos preceitos, que ficão apontados.

causa mui frequente da gangrena secca, particularmente em partes, que tem pouco poder vital, como orelhas, nariz, &c., ou estão mais longe das forças vitaes, como as extremidades inferiores: 4.º a velhice, na qual pela falta de poder vital morrem as partes remotas, particularmente concorrendo alguma das outras causas, como frio, &c.: 5.º finalmente a debilidade geral causada por outras molestias, particularmente scorbutto, &c.

§. XLI.

Esta gangrena, que se conhece pelos symptomas constitucionaes (XXXIII), e pela alteração local, mudando-se a pelle de branca, ou ligeiramente vermelha em negra, com mui pouca, ou nenhuma dor, e total perda de sentimento, quasi sempre acaba funestamente, quando não vem por compressões, que se podem remover, e quando não podemos restaurar as forças perdidas.

§. XLII.

Todavia a dieta restaurante , a quina , o vinho , o opio , e os acidos nas disposições scorbuticas , tem algumas vezes produzido bons effeitos. Localmente cumpre embaraçar-lhe o progresso , quanto for possivel , 1.º conservando a parte em hum moderado calor , embrulhando-a em bactas quentes depois de a polvilhar com pós aromaticos , ou farinhas : 2.º animando as partes immediatas com brandas fricções , com bacta secca , ou molhada na tintura de cantharidas , ou oleos essenciaes : 3.º applicando hum círculo de caustico de papel a huma , ou duas pollegadas acima da parte gangrenada. (a)

L ii

Se

(a) Estes remedios , particularmente o caustico , he verdade que não augmentão o poder , mas sim a acção ; porém mudão a disposição das partes , cortão a communicação entre ellas , e excitão a inflammacção suppurativa , que põe termo á gangrena , principalmente havendo ainda algumas forças , mas que estavão como abafadas pela acção sedativa das causas.

Se por estes meios se consegue pôr termo á gangrena , e esta for pouco extensa , he necessario derrubar a codea gangrenosa pelos meios apontados (XXXVII), e curar a chaga , que resulta , como fica dito. Porém se a gangrena for muito extensa , ou porque ataca todas as partes, que compõe o membro, não admittir este methodo de cura, só fica o recurso das amputações , as quaes se devem praticar 1.º quando a gangrena for muito extensa, ainda que pouco profunda ; porque as chagas, que resultão pela cahida de taes codeas, são incuraveis, e mesmo mortaes, em razão de se perderem todas as forças pela suppuração : 2.º quando profunda muito ; porque se não podem conservar as partes. O tempo mais proprio para se praticarem as amputações com segurança nesta casta de gangrena , he muito depois de estabelecida a inflammiação suppurativa, e quando o enfermo se sente com humma melhora decidida pelo lado constitucional ; porque repetidas vezes fica a gangre-

grena estacionaria por muito tempo, e de repente apparece de novo até depois de se ter feito a amputação. Na gangrena secca podem diffirir-se as amputações para mais tarde; porque as codeas, ou partes gangrenadas vão-se myrrando sem produzirem grandes males á constituição.

C A P I T U L O I I .

Das amputações.

§. XLIII.

Chamão-se amputações aquellas operações de Cirurgia, por meio das quaes se separa do corpo algum membro, como dedos, braços, ou pernas. (*a*)

As

(*a*) As amputações devem ser o ultimo recurso da Cirurgia contra as molestias incuraveis por outros meios mais suaves; porque nada custa tanto a hum enfermo, como perder hum membro, e a hum Cirurgião, que tem humanidade, ver-se na precisão de desmembrar o seu semelhante: com tudo como ellas salvão muitas vidas, não podemos deixar de as recommendar nos casos, em que são indispensaveis, e

§. XLIV.

As causas , que nos obrigão a praticar as amputações , são 1.º a gangrena , ou sphacelo de hum membro : 2.º a falta de nutrição pela perda do tronco da arteria principal , seja por ferida , ou por aneurisina : 3.º as grandes lacerações dos membros causadas por corpos movidos pela explosão da polvora , ou outra qualquer causa : 4.º as inchações brancas das jun-

então o Cirurgião deve comprehendellas com toda a intrepidez , pois só assim pôde salvar huma vida , unico objecto , que lhe deve fazer esquecer toda a crueldade da operação. As amputações tem sido objecto de muitos escritos , não só a respeito do modo de se praticarem , mas da sua utilidade , inutilidade , e abuso , querendo huns proscrevellas quasi inteiramente , outros abusando demasiadamente dellas , huns recommendando hum methodo , outros outro ; mas felizmente podemos dizer , que esta materia se acha hoje tão esclarecida , que nenhuma dúvida pôde haver a respeito dos casos , que as pedem , e do methodo , que se deve adoptar ; pois que os successos felizes confirmados pela experiencia de tantos praticos não dão lugar a hesitar-se sobre verdades tão conhecidas , as quaes exporei do melhor modo possível.

juntas : 5.º as chagas acompanhadas de carias , ou destruição dos ossos ao ponto de se não poderem remediar por outros meios : 6.º os tumores , ou chagas cancro-sas , que se não podem remover sem se amputar o membro : 7.º finalmente os ex-ostoses. Quando por qualquer destas causas se achar indicada alguma amputação , convem observar se o enfermo pelo lado constitucional a póde sopportar , e se a molestia he inteiramente remediavel por este meio , que afóra estas condições não se deve praticar.

§. XLV.

O sphacelo (XXXIII) , ultimo resultado da gangrena , he sem dúvida hum mal , que pede a separação de hum membro , quando todas as partes , que o fór-mão , ou as mais interessantes , são ataca-das ; porque a não haver este recurso , ou o enfermo morre , ou , se a natureza faz a separação , he irregularmente com muitos riscos da vida por causa da debilidade

constitucional , hemorragias , e muitos outros symptomas , e nunca ficamos isentos de ferrar os ossos , ao que se segue huma cura tediosa , e mil incommodos para o futuro : pelo que em taes casos não se podem dispensar as amputações logo que a gangrena deixa de lavrar , e conhecemos os seus limites.

§. XLVI.

A falta de nutrição de hum membro , porque se tenha laqueado , ou destruido a arteria principal , será seguida de gangrena , de sphacelo , e da morte , se se não recorrer á amputação.

§. XLVII.

As grandes lacerações dos membros exigem as amputações em dous estados differentes , 1.º quando o corpo , que faz o damno , separa o membro totalmente , e deixa huma superficie desigual não só nas carnes , e pelle , mas tambem nos ossos : 2.º quando o membro se communica

ain-

ainda por algumas porções de pelle , de carnes , e por alguns nervos , ou vasos , mas os ossos se achão esmigalhados ; a maior parte das carnes , e dos tendões lacerados , e alguns vasos consideraveis rotos. No primeiro estado não se entra em dúvida , que o enfermo tem perdido hum membro ; e alguns praticos , aproveitando-se do córte accidental , aparão , se he preciso , algumas carnes , pelle , ou tendões , ferrão algumas pontas de ossos , se os ha , e curão formando , ou unindo , havendo subegidão de pelle , e carnes. Esta prática , que tem lugar algumas vezes , poupa huma nova amputação : porém se as carnes , e a pelle se achão laceradas , e pizadas , e os ossos quebrados desigualmente , temos toda a certeza de que a moção vai muito mais longe do lugar ferido , como he commum nas feridas de armas de fogo , ou grandes choques d'outros corpos , cuja moção , alterando a estrutura das partes pelo estupor , que lhes induz , as indis põe para a sua con-

fervação, seguingo-se inflammções, suppurações, gangrena, convulsões, e outros symptomas, que concluem a vida dos feridos: pelo que, amputando-se hum pouco mais acima, reduz-se todo o estrago a huma ferida simples, que se une por primeira intenção, cuja união atalha os symptomas locaes, que ficão ditos, e huma grande parte dos constitucionaes, que nascem dos estímulos causados pelo ar, appósitos, e remedios, que precisamente se hão de usar no côto, que não he amputado methodicamente. No segundo estado não ha huma separação total, porém ha communicações tão pouco seguras, que quasi sempre se perde o membro, e com elle a vida, se se não pratica a amputação, humas vezes faltando a nutrição, e seguingo-se a gangrena, outras vezes vindo convulsões, ou suppurações tão abundantes, que o ferido morre pelo excesso de estímulos, ou por falta de forças (a);

e

(a) Não sei que se possa deixar de praticar a amputação nestes dous estados das lacerções dos mem-

e quando escapa a tudo isto , o que he raro , sempre fica aleijado , e sopportando por toda a vida os incommodos de hum membro doente. Tambem tem havido diferentes opiniões a respeito do tempo , em que se hão de praticar em taes casos as amputações , querendo huns que se fação logo depois do ferimento , outros que se fação passados os primeiros symptomas. Estes ultimos allegão , que a operação augmenta a desordem geral da economia , dobrando o soffrimento do paciente , e

M ii

que

bros , sem haver falta de conhecimentos cirurgicos , ou sem se commetterem faltas de omissão , seguindo-se o que aconselha Bilguer na sua Obra intitulada : *Dissertatio inauguralis Medico-Chirurgica de membrorum amputatione rarissime administranda , aut quasi abroganda* : quando vemos que são frequentissimos estes estragos , particularmente nas campanhas , e que se não podem remediar sem o triste , mas necessario soccorro das amputações ; pois que nem remedios , nem todos os cuidados cirurgicos podem prevenir os symptomas , de que elles são capazes , como a experiencia mostra a todos os praticos imparciaes , guiados pelos conhecimentos de huma prática segura , e desejos de valerem á humanidade.

que se não póde calcular até onde se estende a moção , para se separar toda a structure alterada ; mas a dúvida , que ha em se vencerem os primeiros symptomas , e a quasi certeza de se atalharem , reduzindo-se o estrago a huma ferida simples , nos obrigão a praticar logo a amputação ; ao que accresce o estado menos irritavel da constituição , e por consequencia menos dores , a maior sujeição do ferido neste momento do que depois , e finalmente a maior commodidade de transporte de hum lugar para outro , sendo o ferimento na campanha.

§. XLVIII.

As inchações brancas das juntas (a) ,
quan-

(a) Formão-se nas juntas tumores maiores , ou menores sem inflammção externa , nem mudança na cor da pelle , que em geral se chamão tumores , ou inchações brancas das juntas. Ha duas differenças destes tumores , sem fallarmos das hydropeſias das juntas , e da dilatação das bolsas mucosas , que são reumaticos , e escrofulosos. Nos reumaticos toda a articulação soffre huma dor maior , ou menor , a qual se

quando chegão a debilitar o enfermo por effeito de suppurações , e carias , que á força de dores gastão o poder vital , e per-

estende aos musculos ligados ás peças articuladas ; e a inchação , que ataca as partes molles , particularmente os ligamentos , primeiro assento desta enfermidade , he muito extensa , e produz huma especie de congestão inflammatoria na cellular vizinha. Os movimentos da junta ficão desde o principio embaraçados , e o enfermo sente mais allivio na flexão , da qual se não pôde tirar o membro sem muitas dores. Pela continuação da molestia crescem estes symptomas , e a junta fica como em anchilose , a pelle semeada de varizes , e o resto do membro abaixo do tumor mais magro , ou edematoso. Quando os esforços da natureza , ou remedios não impedem o progresso destas inchações , seguem-se suppurações em differentes pontos , que , rompendo a pelle , dão lugar a chagas , e carias dos ossos ; e ainda que se fechem humas , abrem-se outras , que fazem a molestia incuravel , particularmente vindo as vigílias , o fastio , a febre , os suores nocturnos , a diarrhea , e a magreza. As causas destes tumores são , além da disposição reumatica constitucional adquirida , ou herdada , offensas tóxicas , como pancadas , distensões , deslocções , golpes de frio , e particularmente esfriamento dos pés em agua fria , neve , lama , ou lugares humidos , &c.

perturbão mais , ou menos as funções da economia , são irremediaveis , e só podemos remover os seus effeitos sobre a constituição , e livrar o paciente da morte ,
pra-

A cura desta casta de tumores he sempre difficullosa de conseguir ; todavia , acudindo-se-lhes no principio , algumas vezes se remedeão. O tratamento antiphlogistico constitucional , as sangrias topicas por meio de bichas , repetidas segundo as forças , e gravidade dos symptomas , os vesicatorios aturados , ora de hum lado , ora do outro , os appositos molhados nos cozimentos , ou infusões das plantas amargas , e aromaticas com sal de chumbo , e sal amoniaco , são os remedios mais efficazes , que se tem conhecido , os quaes se devem continuar até diminuir a inchação , e mais symptomas. Eu não fallarei das sarjas , do mercurio , e das emborcações de agua quente , ou cozimentos ; porque tenho conhecido por propria experiencia serem remedios nocivos. Succede communmente , que , ainda moderando-se a molestia , ficão as juntas inchadas , ou grossas , e os seus movimentos muito limitados : então convem as fricções mercuriaes , e as applicações emollientes não só na articulação , mas em todos os musculos , que lhe pertencem , dos quaes depende ordinariamente a aleijão , de cujos emollientes se deve usar em fomentações , banhos , ou cataplasmas , até se perder a rijeza da junta. Porém se estes tumores suppurarem , he preciso abrillos com

praticando a amputação, a qual com tudo só se deve fazer depois de esgotados todos os outros meios, ainda que conheçamos que não podem aproveitar; porque

a

a lanceta na parte mais baixa, e fazer-lhes pequenas aberturas, e não grandes, nem passar-lhes sedenhos, como aconselhão alguns, para evitar estímulos, limitando o seu curativo a enxugar-lhes a materia, e applicar na abertura os fios molhados nos brandos suppurantes. Se os esforços da natureza, que devemos augmentar com o uso da quina, ferro, e bons alimentos, não vencem o mal local, e o enfermo se vai debilitando muito, cumpre recorrermos á amputação, como unico recurso para se conservar a vida.

Nos escrofulosos a dor he limitada a hum ponto, e muito aguda, a inchação, que tem o seu assento na substancia esponjiosa das extremidades dos ossos, deixa a pelle livre, e vacillante por algum tempo; porém na ordem do seu augmento vão-se separando as laminas da substancia compacta, a qual, elevando-se com o nome de exostose escrofulosa, ou espinha ventosa, estimula a pelle, e dá origem a tumores mais, ou menos circumscriptos, que, vindo á suppuração, rebentão, e dão huma materia tenue, e fetida em razão da caria dos ossos, que se acha facilmente mettendo-se a sonda na ulcera. As causas destes tumores são a disposição escrofulosa desenvolvida por algum estímulo occulto, ou por injúrias exte-

a experiencia tem mostrado , que as amputações em taes casos são mais bem succedidas , quando se praticão depois de huma longa duração da molestia , do que
no

res , como pancadas , distensões , &c. A sua cura he muito mais difficultosa , do que a dos reumaticos , particularmente vindo a febre , suores nocturnos , diarrheas , fastio , e magreza ; e ainda , se alguma vez se chegão a curar , depois de frequentes exfoliações , ficão as juntas grossas , e sem movimentos ; porque , além de se alterar a structura dos ossos , e dos ligamentos , pegão-se as cartilagens , resultando as anchiloses : com tudo como as amputações devem ser o ultimo recurso , e esta molestia parece ser hum effeito da debilidade constitucional , convem emendalla , se for possivel , com a dieta restaurante , ar campestre , banhos de mar , quina , ferro , &c. Localmente são uteis algumas vezes as bichas , os vesicatorios , e as cataplasmas de miolo de pão em agua do mar , ou em cozimento bem saturado de digitalis. Este ultimo remedio he a applicação mais efficaz , de que tenho usado , e com a qual tenho curado muitos destes tumores , ainda depois de suppurados. Quando os ossos se achão cariados , pouco aproveitão os remedios : com tudo a tintura de euforbio em espirito de vinho vence algumas vezes as carias , e a cataplasma do cozimento da digitalis a congestão : porém se o enfermo se debilitar muito , cumpre recorrer á amputação. He

no seu principio ; e a razão he , porque com as amputações se allivia a constituição dos estímulos , e não dos effeitos da materia absorvida , como se tem pensado.

§. XLIX.

As chagas , ainda as mais simples , são muitas vezes pelo desprezo , máo me-

Tom. IV.

N

tho-

preciso não confundirmos as dilatações das bolsas muco-
sas (sacos membranosos , que se achão situados em
torno das articulações destinadas a conter synovia , que
lanção nas cavidades articulares , e bainhas dos ten-
dões , para facilitar os movimentos destas partes) com
os tumores brancos , de que tenho fallado ; porque as
ditas bolsas dilatadas pela synovia em consequencia de
pançadas , torceduras , &c. , causão pouca , ou nenhuma
dor , conservão-se estacionarias muito tempo , ra-
ras vezes se inflammão , apresentão muita fluctuação
desde o seu principio , e ganhão communmente o
estado natural com applicações tónicas , e espiritu-
sas , como agua de cal com espirito de vinho , aguas
saturinas , &c. , ajudadas com alguma compressão.
E quando não cedem , porque a synovia se espessa , e
às vezes se petrifica , curão-se facilmente , abrindo-se ,
ou passando-se-lhes sedenhos. O cotovelo , e a parte
anterior do joelho , por cima , e por baixo da rodela ,
são os sitios mais sujeitos a estes tumores.

thodo de cura , e mil outras circumstancias , capazes de produzirem as carias , e destruição dos ossos , ao ponto de serem incuraveis , e exigirem as amputações , como unico recurso capaz de poupar a vida ao paciente , livrando a constituição de estímulos , e grandes perdas dos humores. E se isto póde acontecer nas chagas simples na sua origem , muito mais naquellas , que resultão de feridas complicadas com offensa dos ossos , das juntas , dos tendões , &c. , e naquellas , em que se declara algum veneno , ou disposição particular , que , não obstante combaterem-se constitucionalmente , fazem nas chagastaes estragos , que só as amputações podem atalhar.

§. L.

Quando os tumores , ou chagas cancerosas se conhecem com toda a evidencia , e atacaõ hum membro de modo , que toda a disposição morbosa se não póde extirpar sem se destruir a existencia do mesmo membro , então só fica o recurso da

am-

amputação , como mostrei quando se tratou desta molestia.

§. LI.

Quando os exostoses (a) chegam a

N ii

de-

(a) Dá-se o nome de exostose a hum tumor duro, mais, ou menos doloroso, formado na substancia dos ossos. Suas causas ou são topicas, como pancadas, fracturas, feridas nos ossos, e chagas, que os descobrem, ou venenos, e disposições constitucionaes, como veneno venereo, e disposição escrofulosa, gotosa, scorbutica, &c. Quando o exostose he hum symptoma do mal venereo, chama-se tambem nó; quando depende da disposição escrofulosa, chama-se espinha ventosa; e quando he effeito da gota, chama-se topho. Todo o exostose, que procede de causas topicas, produz ordinariamente pouco incommodo, e fica estacionario toda a vida: eu digo ordinariamente; porque algumas vezes crescem de tal modo, que inflammão, e ulcerão as partes molles ao ponto de se seguirem chagas consideraveis, complicadas com carias, que resistem a todos os remedios, seguindo-se a febre, o fæstio, os suores nocturnos, as diarrheas, e a morte, se alguma operação cirurgica não atalha tantos damnos. Quando o exostose ataca ossos pequenos, como os das mãos, e pés, o mais seguro methodo de cura consiste em tirar pelas suas articulações o osso, ou ossos doentes, curando-se de-

destruir os ossos , e a ulcerar as partes molles , resistindo a todo o tratamento methodico apropriado á sua natureza , e reduzindo o enfermo ao estado de marasmo

pois as chagas do modo ordinario : porém se ataca ossos compridos , cumpre descobrir todo o tumor , e com a applicação de huma , duas , ou mais coroas de trepano extrahir toda a parte morbosa , e posto o osso no são , cubri-lo com as carnes , ou tegumentos , que houver , para se evitarem grandes suppurações.

O exostose venereo , ou o nó , ataca communmente a parte mais sólida dos ossos , como o centro dos compridos , os do craneo , e particularmente a substancia compacta , humas vezes crescendo consideravelmente sem causar ulceração , outras vezes inflammando o periostio logo no principio , e dando origem a huma especie de abscessos , chamados gommas , e na cabeça talparias. Astruc , e outros muitos tem pensado , que o assento primario desta molestia era no periostio : porém a inchação do osso , que precede sempre ao abscesso , nos convence do contrario. Nesta casta de exostose devemos principiar a cura pelo tratamento mercurial , o mais methodico , accommodado ás circumstancias do enfermo ; porque sendo os nós , ou gommas huns symptomas consecutivos do estimulo venereo communicado á constituição , cedem ordinariamente ao especifico , ou ficão estacionarios toda a vida , sem causarem incommodo. Todavia algumas

mo por causa da febre, fastio, fuores nocturnos, diarrheas, &c., só nos resta salvar a vida do paciente por meio das amputações.

De-

vezes não succede assim ; porque, ou tratados methodicamente, ou desprezados, produzem carias, e chagas tão extensas, que se tem visto sahirem porções consideraveis dos ossos, e até os ossos inteiros, supprindo a natureza estas faltas com a lymphá coagulavel, que se ossifica. Nestes casos ajudaremos a natureza, 1.^o destruindo a causa com o especifico: 2.^o diminuindo estimulos com os opiados: 3.^o dando forças com os tonicos: 4.^o tratando topicamente a molestia segundo o estado, em que se achar. Se o exostose for hum nó, convem as sangrias locaes, as cataplasmas de miolo de pão em leite, ou aguas saturninas, e de quando em quando algumas fomentações mercuriaes. Se for humá gomme, e fizer grande progresso, convem abrilla, dar sahida á materia, que humas vezes he delgada, fetida, e denegrida, outras vczes humá especie de mucó viscoso, e transparente, segundo o estado do osso, e curar com os digestivos, aos quaes se ajuntão preparações mercuriaes, particularmente o precipitado rubro. Havendo carias, e tão extensas, que os esforços da natureza ajudados com os remedios constitucionaes, e topicos os não possão expulsar, lhe faremos o mesmo, que fica dito no exostose de causas topicas: e se estes meios não basta-

§. LII.

Decidida a necessidade da amputação debaixo dos preceitos mencionados nos §§. antecedentes , cumpre eleger o lugar , onde se deve fazer a operação ,
cu-

rem para atalhar os estragos locaes, ou a constituição se for debilitando ao ponto de correr perigo a vida do enfermo , recorreremos á amputação , se esta for praticavel. Succede algumas vezes ficarem os exostoses estacionarios , e continuarem mesmo a incommodar o paciente depois de extinto o estímulo venereo por meio do tratamento mercurial : em taes casos tenho visto muito bons effeitos de hum cozimento de salsa parrilha , e casca de raiz de mezereão tomado por muito tempo de manhã , e de tarde na quantidade , que o enfermo puder sopportar sem lhe entender sensivelmente com a constituição. O exostose escrofuloso , ou espinha ventosa , de que tratei (XLVIII. Not.) , póde , ainda que poucas vezes , atacar o meio dos ossos compridos , particularmente nas crianças ; e então he mais remediavel , do que quando ataca os seus extremos , ou os ossos pequenos , e esponjiosos : eu os tenho curado muitas vezes , ainda penetrando o canal cylindrico , e com suppuração na medulla , sem mais remedios do que a tinctura de euforbio localmente , e os tonicos constitucionalmente.

cuja eleição se faz debaixo de tres condições muito effenciaes : 1.^a salvar do membro, que se ha de amputar, o mais que for possível; porque quanto mais proxima do tronco se fizer a amputação, tanto mais arriscado he o successo, em razão de se cortarem nervos mais grossos, e se desequilibrar muito o círculo, motivos pelos quaes vemos diariheas, e muitos outros symptomas nas amputações das côxas : 2.^a cortar sempre pelo são, para não ficarem restos da molestia, que a possão continuar, e entreter no coto, ficando a operação inutil : 3.^a escolher as partes mais carnosas para o córte, sem com tudo se faltar muito ás condições antecedentes. Cumpre mais preparar o apposito, que consiste no torniquete, e suas pertenças, tiras de emplastro pegajoso, pontos falsos largos, e compridos segundo a grossura da parte, que se ha de amputar, alguns fios, huma, ou duas maltas de panno fino, linhas, ou fios enfiados em agulhas curvas, e desenhados, hu-

hum a tira de affastar carnes (*a*), e hum a circular, que dê algumas voltas ao redor do membro. Disposto tudo isto, e os instrumentos, que são duas facas, hum a grande, outra pequena, dous ferrote, grande, e pequeno, e o tenaculo (*b*),
fi-

(*a*) He hum a tira da largura de hum palmo, e comprimento de meia vara, rachada em duas metades até o meio, cujas metades, applicadas por hum e outro lado do osso, cruzão alguma coufa, e os tres extremos, puxados por hum ajudante, arregação as carnes, e as defendem do ferrote.

(*b*) A faca maior pôde ser curva, ou recta; porque para hum bom operador he indifferente a figura da faca: com tudo a recta he preferivel; porque se maneja com mais facilidade, e poupa muitas vezes a pequena. A faca pequena, chamada interossea, ou de entre-canais, deve ser cortante de ambos os lados, ao menos do meio por diante, e só serve nas amputações da perna, e ante-braco. O ferrote grande serve para ferrar o osso; e aquelle, que eu fiz gravar na Estampa IV, he melhor pela facilidade, com que se trabalha com elle. O ferrote pequeno serve para aparar alguma ponta, ou aspereza, que deixa o grande, e para ferrar os ossos do metacarpo, do metatarso, e dos dedos.

situão-se o enfermo, e os ajudantes segundo o membro, que se ha de amputar.

Da amputação da coxa.

§. LIII.

Para se amputar a coxa, situa-se o paciente sentado á borda de huma cadeira alta (*a*), seguro por ajudantes, com as pernas affastadas huma da outra, a livre descansando com o pé em cima de hum banco, e a doente segura por hum ajudante, que de joelhos péga na perna, e pé depois de mettidas as articulações das cadeiras, e joelho em meia flexão, e meia extensão. Então o operador situado ao lado esquerdo do enfermo, seja qual for a coxa, que se ha de amputar (*b*),

Tom. IV.

O

ap-

(*a*) Tambem se pôde situar o enfermo atravessado em cima da cama, ou ao comprimento em cima de huma meza: porém qualquer destas situações he menos vantajosa, do que a da cadeira.

(*b*) Nesta situação pôde o operador segurar com toda a firmeza o osso com a mão esquerda na acção de o ferrar; porque o segura pela parte, que vai fó-

applica o torniquete junto á virilha , e apertado o entrega a hum ajudante (a). Outro ajudante formando com os pollegares , e indicadores de ambas as mãos hum círculo ao redor do membro , puxa os tegumentos para cima , o mais que for possível , em quanto o operador com o braço direito por baixo da coxa , e com a faca na mão , applica o cóрте desta na parte mais alta , e corta a pelle , e cellular circularmente , acabando onde principiára (b). Feito este primeiro cóрте dos

te-

ra , o que não pôde fazer sem pizar as carnes , e tomar algum espaço á ferra , segurando-o pela parte de cima.

(a) Quando a amputação por causa da molestia for mui alta de modo , que se não possa applicar o torniquete , então deitado o enfermo na cama , hum ajudante comprime a arteria com hum chumaço forte contra a sinuosidade iliaca. Tem-se inventado para este lugar hum torniquete á maneira de funda , do qual não fallarei , porque o julgo inutil.

(b) Alguns praticos ainda usão de huma circular apertada , que firma , dizem elles , as carnes , e serve de guia para a igualdade do cóрте dos tegumentos : porém esta guia he desnecessaria , e mesmo opposta á

tegumentos , chamado o primeiro tempo das amputações (*a*) , solta com a ponta da mesma faca algumas prizões de cellular , que não deixão ir os tegumentos bem acima continuados a puxar pelo ajudante , e proximo á borda destes principia outro córte do mesmo modo , que o primeiro , com o qual corta perpendicularmente as carnes até ao osso , descrevendo hum círculo completo , e acabando onde principiou. Cortadas as carnes , o que constitue

O ii

o

brevidade , com que se deve operar , fazendo-se a operação a dous tempos.

(*a*) Os antigos cortavão os tegumentos , e carnes até ao osso com hum só círculo , que fazião com a faca , e isto se chamava amputação a hum tempo : os modernos porém cortão os tegumentos por huma vez , e as carnes por outra , o que se chama amputação a dous tempos , cuja invenção attribuem os Inglezes a Cheselden , e os Francezes a Petit. E posto que fosse impugnada por alguns , allegando a demora , e mais dores , que os dous golpes causão ; com tudo he hoje o methodo geralmente recebido , e com razão ; porque , não obstante a demora , e mais dores , ficão os tegumentos com bastante comprimento para cubrirem o coto.

o segundo tempo das amputações , raspa para cima com a ponta da faca o periostio , e prizões de carnes na extensão de huma pollegada (a) ao redor do osso. Isto feito , situa a tira de affastar carnes * ,

cu-

(a) Deste modo vem a ficar o osso mais curto do que as carnes , e estas , abatido o seu encolhimento , com subegidão bastante , para não ficar o osso fahido , ou o coto agudo , ou , como dizem , em fórma de pão de assucar , defeitos que os praticos conhecêrão em todos os tempos , e que pertendêrão evitar por muitos modos ; a saber , Ambrosio Parco recommendo , que se puxem os tegumentos , e carnes para cima , e se aperte fortemente o membro acima do lugar , onde se ha de amputar ; Cheselden , e Petit recommendando a amputação a dous tempos ; Luiz que no primeiro tempo da operação se cortem juntamente com os tegumentos os musculos , que se não ligão aos ossos , e que por onde der o maior encolhimento destes se pratique o segundo tempo. Valentin nos seus Exames Criticos sobre a Cirurgia moderna , mostrando os defeitos de todos os methodos , conclue , fallando da amputação da coxa , que para sobejarem carnes , que cubrão o topo do osso , se cortem as ante-

* Bell. usa de duas especies de pás de ferro , a que chama retractoros para levantar as carnes : porém a tira poupa estes instrumentos , que de nada servem.

cujos extremos entrega ao ajudante, que puxava os tegumentos, e ferra o osso o mais proximo que for possivel da superficie das carnes. Ao ferrar do osso terá as seguintes cautelas: 1.^a firmallo bem com a mão esquerda, da qual o dedo polle-gar serve de encoisto ao ferrote, em quan-to este não faz rego: 2.^a acabar branda-
men-

riores, e internas na maior extensão, e abducção pos-sivel, e as das faces posterior, e externa na flexão, e adducção: porém as dores, que o enfermo deve sentir, a impossibilidade de se fazerem algumas vezes os movimentos, que o Author recommenda, a de-pendencia, que ha de ajudantes muito habeis, que, durante o córte, fação os taes movimentos, e mais que tudo o pouco fructo, que se tira deste methodo, que não previne a sahida do osso, o tem feito rejei-tar por todos os praticos. Alançon no segundo tempo da operação corta as carnes obliquamente da circumferencia para o centro: mas o córte perpendicular pro-posto por Bell, e a separação das carnes ligadas ao osso na extensão de huma pollegada, tem preferen-cia ao córte obliquo de Alançon, o qual se não pôde fazer igual em toda a circumferencia; porque a obli-quidade, que se dá á faca em hum ponto do círcu-lo, a faz cortar os tegumentos, e carnes desigualmen-te no ponto immediato.

mente , para se não lascar o osso : 3.^a recommendar ao ajudante , que segura a perna , que a conserve firme , para que mais levantada não aperte o ferrote , e mais abaixada não lasque o osso : com tudo se lascar , e ficar alguma ponta , a cortará com o ferrote pequeno , ou com a tenaz incisiva.

Serrado o osso , busca o operador a arteria principal , e a laquea , mettendo hum agulha curva com fio forte , e dobrado em alguma porção carnosa , que se achar proxima á arteria , puxada hum pouco fóra com o tenaculo , que hum ajudante segura em quanto o mesmo operador ata o fio ao redor della com o nó de cirurgiaão (*a*) . Laqueada a arteria principal ,

(*a*) A laqueação , que se fazia apanhando carnes , nervos , aponevroses , e membranas ao redor da arteria , era a causa de muitos symptomas , que sobrevinhão ás amputações , como dores grandes , inflammções , suppurações , e convulsões : pelo que os Cirurgiões modernos se tem servido do tenaculo em lugar do perrete dos antigos para puxarem as arterias fóra , e as laquearem livres de todas as outras partes ,

pal, manda affrozar o torniquete, para descobrir as arterias menores, e as atar como se ata a boca de hum sacco, puxando-as o ajudante para fóra com o tenaculo (a). Froxo de todo o torniquete, e não

methodo certamente muito util, porque atalha os symptomas referidos: porém na arteria crural he pouco seguro em razão do impulso do sangue expellir algumas vezes a laqueação, quando esta não fica preza a alguma porção de carnes, como eu recommendo.

(a) A invenção do torniquete fundada nos conhecimentos da circulação, deo huma grande segurança na prática das amputações; porque até esta época morrião muitos enfermos esvaidos no acto da operação, como lemos em Celso. Outro risco, que tinham as amputações, era o das hemorragias, que se seguião á operação: porque a pezar de Hippocrates, Celso, Galeno, Avicena, João de Vigo, e outros fallarem da ligadura das arterias; com tudo o fogo era o meio, de que usavão para tomar o sangue até o tempo de Pareo, ao qual custou muito introduzir o uso da laqueação nas amputações; porque ainda depois deste Author se continuou o fogo, e muitos adstringentes, como o vitriolo, a pedra hume, o agarico, &c.: porém a fallencia destes tem posto a laqueação no ponto de perfeição, em que hoje a possuímos, e lhe tem grangeado a confiança de todos os praticos, sendo até de huma absoluta necessidade

não correndo sangue de parte alguma ; alimpa os coalhos , lavando o coto com agua morna , ou fria , e faz a primeira cura.

§. LIV.

Para fazer a primeira cura , tira o operador o torniquete , e suas pertenças , puxa as carnes , e pelle para baixo , e applica ao redor do coto huma tira de emplastro pegajoso da largura de dous dedos , e do comprimento sufficiente , para dar duas , ou mais voltas espiralmente de cima para baixo , a qual se chama compositoria , e deve ficar moderadamente apertada. Depois disto ajunta as carnes , e pelle adiante do topo do osso de modo , que a linha da união fique de cima para baixo (a) , e as conserva assim com

os

no methodo de união por primeira intenção ; porque não ficão corpos estranhos , nem escaras , que a impidão.

(a) A união das carnes , e pelle de cima abaixo he preferivel á união transversal ; porque fica declive pelo angulo inferior ás humidades , que excretão as partes cortadas , as quaes de outra maneira ficão demoradas , e impedem a união por primeira intenção.

os pontos falsos , ficando os fios da laqueação no angulo inferior da união , ou entre os pontos alguma cousa atezados , para não tomarem muito espaço. Sobre os pontos applica huma camada de fios seccos , huma , ou duas maltas fustidas com algumas voltas de atadura circular , que descreva espiraes de cima para baixo (a) , sem com tudo passar sobre o topo do coto , como he costume.

Tom. IV.

P

Fei-

(a) Todos os praticos depois da introducção da laqueação tem conhecido a necessidade de se cubrir o osso com as carnes , e pelle , e para isto empregavão a costura verdadeira , os pontos falsos , e differentes castas de ligaduras unitivas : mas como não amputavão a dous tempos , e as carnes se retiravão muito , não só ficavão baldadas as suas pertenções , mas os meios crão nocivos , particularmente os pontos verdadeiros ; porque atezavão a pelle , e excitavão dores , e inflammações , que os obrigavão a desmanchar tudo , e ás vezes com perigo da vida do enfermo : pelo que foi prática quasi geral formar com fios seccos sobre o coto , não laquear as arterias pequenas , e usar de ligaduras compressivas com muitas voltas ao redor , e por cima do coto , prática que custou muitas vidas ; porque , além da aspereza da primeira cura , ficava a ferida com muita extensão , a qual , ex

§. LV.

Feita a primeira cura , situa-se o enfermo na cama , e o coto em cima de algumas dobras de lençol , ou toalha , prezo á cama com hum faxa , que deitada por cima d'elle se préga com alfinetes (a).
Fei-

posta ao ar , e topicos , dava occasião a symptomas ; e suppurações , que concluíão a vida da maior parte daquelles , que soffrião as amputações , e esta foi a razão , por que alguns declamarão tanto contra ellas. Alañon foi o que primeiro deo os melhores preceitos para se conseguir a união por primeira intenção , por cujo methodo não só se poupão muitas vidas , mas as curas conseguem-se desde tres semanas até dous , ou tres mezes , com muita suavidade , a pezar do osso exfoliar algumas vezes. Todavia Alañon usava de hum atadura de baeta muito comprida , com a qual fazia circulares ao redor do tronco , e pelo membro abaixo , a qual eu julgo de nenhuma utilidade , e mesmo incommoda ; porque aquece muito as partes , e não aproxima as carnes ao extremo do coto , como se tem pertendido.

(a) Nada he tão prejudicial , como ficarem as partes amputadas levantadas em cima de almofadas , como he costume ; porque as humidades filtradas pelas partes cortadas , não tendo declive , demorão-se ,

Feito isto , ordena-se a dieta ao paciente , largas doses de opio , bebidas apropriadas ao seu estado , isto he , debilitantes , se ha excesso de forças , e restaurantes , se ha debilidade , e não se bolle na primeira cura até o oitavo , ou nono dias , excepto havendo alguma cousa , que obrigue , como hemorrhagia , ou muita suppuração , &c. Do oitavo , ou nono dias por diante se principia a curar todos os dias , ou hum dia sim , outro não , conforme a quantidade da materia , havendo sempre a cautela de se conservarem as carnes , e tegumentos aproximados com os pontos falsos ; porque , ainda que estas partes não unão por primeira intenção , vem a unir por meio da granulação , que se segue á suppuração. O mesmo se observará havendo

P ii

re-

e não só impedem a união , mas formão seios , ou cavernas , que muitas vezes he preciso abrir para se poderem curar : pelo que as situaremos horizontalmente , prezas á cama , como fica dito , para se prevenir o desmancho da cura , que algumas vezes acontece em consequencia dos saltos convulsivos , que soffre o côro.

repetição de sangue , que obrigue a desmanchar a primeira cura. Os brandos digestivos no principio , e os fios seccos , ou aguas deseccantes , depois da suppuração , são os remedios , de que ordinariamente se precisa para se conseguir a cura. Se o osso , a pczar de todas as prevenções , de que tenho fallado , sobrefahir consideravelmente ao nivel das carnes granuladas , de modo que não caia pela exfoliação , o ferraremos de novo pelo lugar , que convier , cortando primeiro as carnes ao redor delle com hum bisturi , e seguiremos o resto da cura como fica dito.

Da amputação da perna.

§. LVI.

Para se amputar huma perna , situa-se o enfermo deitado na cama atravessadamente , ou sentado em huma cadeira alta com a perna na extensão , segura por ajudantes ; e applicado o torniquete junto á

virilha (*a*), hum ajudante puxa os tegumentos para cima, como se disse na côxa. Então o operador, situado ao lado esquerdo do enfermo, corta com a faca os tegumentos a quatro, ou cinco dedos abaixo da tuberosidade anterior da tibia (*b*), e com a ponta da mesma faca os solta de algumas prizões com as carnes, e particularmente com a face anterior da tibia, para que, puxados pelo ajudante, subão

O

(*a*) Alguns praticos aconselhão, que se applique o torniquete na curva, outros no meio da côxa, e outros na parte inferior: porém na virilha he melhor, porque a arteria está mais descoberta, e o torniquete não causa embaraço algum.

(*b*) Este he o lugar mais commodo, em que se pôde amputar a perna, ainda que a molestia dêsse lugar a cortar-se mais abaixo, não só porque ha mais massas carnosas para cubrirem os ossos, mas porque, salvos os ataques dos musculos flexores da perna, goza o coto de todos os movimentos, e porque se pôde usar de hum perna artificial, sem que a cicatriz soffra tanto, em razão das carnes offerecerem hum apoio mais macio. E se o amputado, não podendo soffrir a perna artificial, usar da escapula com o joelho dobrado, fica-lhe o coto mais curto, e por tanto menos incommodo.

o mais que puder ser. Isto feito, corta as carnes junto aos tegumentos até aos ossos, e pela parte posterior com alguma obliquidade debaixo para cima: mas como na perna ha dous ossos, he preciso cortar as carnes, e ligamento interosseo com a faca de entre-canais, e com a mesma raspar para cima o perioosio, e carnes ligadas aos ossos, na extensão de huma pollegada (*a*). Depois disto affasta as carnes com a tira fendida, e ferra os ossos, que segura firmemente com os dedos da mão esquerda (*b*), principiando na tibia: e logo que o ferrote faz rego, apanha tambem o peroneo, o qual deve acabar

(*a*) Como na perna ha mais musculos ligados aos ossos, não he preciso descarnar tanto acima, como na côxa; porque o encolhimento não he tão grande.

(*b*) Esta he a razão, pela qual o operador se deve situar sempre ao lado esquerdo; porque assim segura os ossos com a mão esquerda, applicando os dedos sobre as partes, que vão fóra, para evitar as pizaduras, que se fazem, seguindo o preceito, que dão todos, de se situar da parte de dentro para serrar os dous ossos de cima para baixo, como se não fosse o mesmo ferrallos de baixo para cima.

bar de ferrar primeiro do que a mesma tibia , para o que abaixará hum pouco a mão do ferrote na perna esquerda , e o levantará quando operar na direita. Serrados os ossos , laquea as arterias por meio do tenaculo , proseguindo em tudo o mais como fica dito (LIV. e seg.)

Da amputação do braço.

§. LVII.

Como a estrutura do braço tem muita analogia com a da côxa , todos os preceitos da amputação da côxa convem igualmente á do braço , a qual para se praticar , se situa o enfermo sentado em huma cadeira ordinaria com o braço em situação horizontal , e seguro por ajudantes. Então o operador applica o torniquete junto á axilla ; e em quanto hum ajudante puxa para cima os tegumentos , os corta tanto abaixo , quanto a molestia der lugar ; e por onde estes ficão retirados , corta as carnes , que faz levantar
com

com a tira fendida, ferra o osso, e laquea as arterias do mesmo modo, que fica dito na côxa, havendo-se na primeira cura, e em tudo o mais como disse (LVI. e seg.)

Da amputação do ante-braço.

§. LVIII.

Para se praticar a amputação do ante-braço, que he em tudo semelhante á da perna, situa-se o enfermo sentado em huma cadeira ordinaria com o braço, e ante-braço seguros horizontalmente por ajudantes, e o ante-braço em pronação, podendo fer. Então o operador, applicado o torniquete junto á axilla, corta circularmente os tegumentos, o mais abaixo que a molestia der lugar (*a*), e por
on-

(*a*) Alguns praticos aconselhão, que se córte pela parte mais carnosa do ante-braço, para evitar o córte dos tendões, e aponevroses, que ha em grande numero do meio para baixo: porém a experiencia tem mostrado, que nenhum perigo se segue sendo a amputação muito baixa, e que o coto he tanto mais util, quanto mais comprido.

onde ficarem estes puxados para cima, corta as carnes até aos ossos, servindo-se da faca de entre-canais para cortar as carnes, ligamento interosseo, e raspar as mesmas carnes, e perioosio, como fica dito. Feito isto, applica a tira fendida, ferra os ossos (*a*), suspende o sangue, e faz a primeira cura do mesmo modo, que se disse na amputação da perna.

Da amputação a retalho. (b)

§. LIX.

O pouco fructo, que se tirava das
Tom. IV. Q am-

(*a*) He de notar, que os ossos do ante-braço devem ser ferrados ambos ao mesmo tempo, em razão de serem hum mais grosso em baixo do que em cima, e o outro *vice versa*, e não se poder assignar outro preceito, senão que do meio do ante-braço para cima se principie, e acabe no cubito, e do meio para baixo no radio: mas este preceito he tão insignificante, que não merece observar-se.

(*b*) Operação, que os Francezes chamão amputação *à lambeau*, e os Inglezes *With a flap*, a qual foi proposta por Laudham, Cirurgião Inglez: mas a

amputações pelo antigo methodo , isto he , cortando a hum só tempo , e seguindo a segunda intenção , deo lugar a inventar-se outro methodo chamado amputa-

ta-

pezar de Yonge fallar della em 1679 ; com tudo não mereceo muita attenção até 1696 , em cujo tempo foi descripta por Verduin , e praticada na perna do modo seguinte : situado o enfermo , e applicado o torniquete , tomava o operador huma faca curva , e atravessava com ella a barriga da perna de hum ao outro lado , encoftada aos ossos , e dirigindo-lhe o córte para baixo , cortava até o principio do tendão d'Achilles , em cujo lugar voltava o córte para fóra , e ficava o retalho levantado : então fazia a secção do resto das carnes na direcção da base do mesmo retalho , e ferrava os ossos do modo ordinario. Separado o membro , alimpava o sangue , e deitava o retalho sobre o coto sem laquear as arterias , e o conservava aproximado por meio de huma bexiga , fios , chumaços , e huma placa concava preza por correas seguras a huma fxa , que andava ao redor da côxa. Garengéot , corrigindo este methodo , preferio huma faca direita com dous córtes ; fazia primeiro a incisão semi-circular , laqueava os vasos , e segurava o retalho com pontos falsos. O Halloran aconselha , que , em lugar de se seguir a primeira intenção , se esperem quatorze , ou mais dias , para que o retalho , e coto granulem , e então se tente a união. Wite , Cirurgião no

tação a retalho, o qual consiste em levantar huma, ou duas porções de pelle, e carnes, com as quaes se cobre o coto. Para se fazer esta operação, por exemplo,

Q ii

na

Hospital de Manchester, seguiu este methodo, e fazia a incisão circular a dous tempos. Ravaton propoz á Academia de Cirurgia em 1739 o methodo de amputar a dous retalhos. Vermolle propoz igualmente, que se fizessem as duas incisões perpendiculares com hum bisturi do comprimento de sete pollegadas, atravessando-se as carnes da parte anterior á posterior, e de cima para baixo até chegar á incisão circular. La Faye propõe em lugar do bisturi huma faca curva sobre o seu chato, para se accommodar á convexidade do osso. Porém o methodo de Verduin com todas as correções, que se lhe tem feito para o levarem ao ultimo ponto de perfeição, he sempre barbaro, e não se pôde encontrar hum só caso, em que seja preciso amputar deste modo, a pezar das imaginarias utilidades, que o seu inventor, e alguns sectarios lhe tem querido attribuir, como 1.^o suspender-se o sangue com o retalho voltado sobre o coto, o que he impossivel: 2.^o haver menos probabilidade de gangrena: não sei porque: 3.^o haver mais facilidade no andar com perna artificial, em razão do apoio macio, que o coto achá nas carnes, que o cobrem: porém se estas forem comprimidas, causarão os mesmos incommodos, ou talvez maiores: 4.^o finalmente ser a

na côxa , situa-se o enfermo do modo ordinario , applica-se o torniquete junto á virilha , e o operador , segura a perna , faz huma incisão circular na pelle , e carnes até ao osso , quatro dedos transversos abaixo do lugar , onde ha de ferrar o osso. Depois desta incisão faz mais duas longitudinaes , huma anterior , outra posteriormente do comprimento de quatro dedos , as quaes acabão na circular , e profundão até ao osso. Com estas duas incisões ficão marcados os dous retalhos , que o operador descarna , ou separa do osso para o ferrar depois de levantar os ditos retalhos com a tira fendida. Serrado o osso , laquea os vasos , e aproxima os retalhos hum ao outro em cima do coto , os quaes conserva com pontos falsos , seguindo em tudo o mais o que fica dito (LVI).

Posto que a amputação a retalho , praticada com dous na côxa e braço , e com hum

operação menos dolorosa : o maior de todos os impossiveis ; porque se fazem mais golpes , e se gasta muito mais tempo.

hum na perna , e ante-braço , pareceſſe levar algumas vantajens ao antigo methodo de amputar ; com tudo era muito mais cruel em razão do maior numero de golpes , da grande demora , e particularmente das inflammções , e ſuppurações trabalhosas , que ſe ſeguião , quando ſe não conſeguiu a união por primeira intenção. E ſe , em parallelo com o antigo methodo , eſta operação teve pouca voga , com toda a razão a devemos deſterrar da prática cirurgica , depois das utilidades tão conhecidas , que tiramos do novo methodo , excepto com tudo quando em algum caſo muito particular nos for preciso ſeparar o braço pela junta da eſpadoa , ou a perna pela junta das cadeiras , e nas amputações dos dedos , e punho.

Da amputação a retalho pela junta da espádua. (a)

§. LX.

Esta operação póde ser precisa ,
1.º quando os exostoses , ou carias do osso
hu-

(a) O primeiro , que praticou esta operação , foi Ledran , o pai ; e Dionysio nas Notas a Le Faye diz , que fora Morand , o pai : fosse quem fosse. Ledran a praticou , 1.º suspendendo o sangue com hum laqueação feita com hum agulha recta , e hum fio forte , passada da parte anterior á posterior do braço , o mais perto do osso , e axilla , que lhe foi possível , e sobre hum chumaço atou a arteria , nervos , carnes , e pelle : 2.º cortando transversalmente a pelle , musculo deltoides , e parte do ligamento capsular , e fazendo por hum ajudante sahir a cabeça do humero da sua cavidade , cortou entre a parte posterior deste osso e carnes de cima para baixo , e depois para fóra de modo , que ficou hum grande retalho , que aparou por cima da primeira laqueação , o que o obrigou a praticar outra com agulha curva , apanhando bastantes carnes : 3.º applicando o retalho em cima da cavidade glenoidea , e segurando-o com os appositos competentes. O enfermo foi curado em dous mezes e meio. Garengot propoz em lugar de hum retalho dous , superior , e inferior , principiando dous

humero se estendem até o seu pescoço, e cabeça, e se não podem remediar, ou curar pelos outros meios mais suaves, correndo perigo a vida do enfermo: 2.º quando

dedos abaixo do acromio, e em lugar da agulha recta huma curva, e cortante pelos lados. La Faye, adoptando o methodo dos dous retalhos, praticava a operação, 1.º sentando o enfermo em huma cadeira com o braço em angulo recto, se era possível: 2.º fazendo com hum bisturi ordinario huma incisão transversal sobre o deltoides, até ao osso, quatro dedos abaixo do acromio: 3.º fazendo duas incisões longitudinaes, huma anterior, outra posterior, as quaes, encontradas com a transversal, descrevião a figura de hum trapezio: 4.º levantando este retalho para cortar o ligamento capsular, e tendões dos musculos vizinhos: 5.º fazendo deslocar o osso, para o separar de cima para baixo das carnes, que o cobrem internamente, até sentir a arteria, a qual laqueava, e depois cortava o segundo retalho huma pollegada abaixo da laqueação: 6.º cubrindo a cavidade glenoidea com o retalho superior, e conservando-o com o apparelho conveniente. A este methodo, que tem sido o mais recebido, accrescentou Sharp, que se fizesse huma incisão na axilla, para descobrir a arteria axillar, e se laquear antes de se principiar a operação. Bromfield, adoptando o mesmo methodo, recommenda que se corte o ligamento capsular com tisoira, instru-

do ha grandes lacerações do braço junto á articulação , em consequencia das feridas das armas de fogo , ou outras violencias , não ficando parte , por onde se
pos-

mento , que elle julga mais proprio. Dahl recommenda hum torniquete , cuja almofada se applica sobre a primeira costela verdadeira. Camper prova a inutilidade deste torniquete pela facilidade , com que se suspende a corrente do sangue , comprimindo-se a arteria com hum chumaço sobre a primeira costela verdadeira. Finalmente todas as correcções , que a amputação a retalho pela junta da espadoa tem soffrido , a que me pareceo melhor , he a que descrevo. Com tudo acho-a muito cruel , em razão dos muitos golpes , de que precisa , e do muito tempo , que se gasta : pelo que assento , que a amputação a dous tempos , praticada como fica dito (LVII) , será muito melhor , só com esta differença , que em lugar de se rasparem o periostio , e as carnes , se desliguem estas da circumferencia da cabeça do osso , até se descobrir á articulação ; e cortado o ligamento capsular , o que tudo se faz bem com hum escalpello , se unão as carnes , e pelle do modo ordinario , não diversificando esta operação se não em que osso , em lugar de se ferrar , se desloca pelo córte do ligamento capsular ; e as arterias , em lugar de se laquearem depois de ferrado o osso , se laqueão assim que se acaba a incisão circular.

possa amputar do modo ordinario: 3.º quando a gangrena sóbe tanto acima, que não deixa outra parte do braço livre para se fazer a amputação; e por tanto, sendo necessaria, situa-se o enfermo deitado de costas com a espada o mais fóra da borda da cama que for possível, e o braço, ou resto d'elle em angulo recto, podendo ser, seguro, assim como o paciente, por ajudantes. Então o operador manda fazer por hum ajudante huma compressão com hum chumaço sobre a arteria axillar na passagem, que faz sobre a primeira costella verdadeira, até se não perceber pulso, e corta circularmente a pelle, e cellular junto ao ataque inferior do musculo deltoides; e por onde estas ficão retiradas, corta as carnes até ao osso. Feito isto, laquea a arteria principal, e alguns ramos, que derem sangue, e principia os retalhos com hum escalpello, fazendo duas incisões longitudinaes, que penetrão até ao osso, huma no deltoides junto á sua borda interna, que principia proximo

do acromio, e acaba na incisão circular, e outra da mesma extensão no ponto diametralmente opposto. Feitas estas incisões, separa do osso o retalho superior, que voltado para cima, deixa o ligamento capsular descoberto, o qual cortará, assim como também os tendões dos musculos, que se achão junto a elle. Feito isto, hum ajudante desloca a cabeça do osso para cima, e para trás, e o operador separa do mesmo osso o outro retalho posterior, e inferior, até á incisão circular, cortando de cima para baixo. Se com estes golpes ferir alguns vasos, que dem sangue, os laqueará por meio do tenaculo. Separado o membro, e limpo o sangue, aproxima os retalhos hum ao outro, e os conserva com costura secca, chumaços, e algumas voltas de circular, que andão ao redor do corpo. Não se conseguindo a união por primeira intenção, se tentará depois das partes granularem.

Da amputação pela junta do cotovelo.

§. LXI.

A junta do cotovelo, chea de altos, e baixos, e muito descarnada, he de todas as juntas a mais impropria para as amputações, e julgo não haver hum só caso, que exija esta operação, a pezar de Pareo nos dizer, que a fizera, e com bom exito; porque podendo fazer-se pela junta, melhor se póde fazer pelo terço inferior do humero, e esta he a bem fundada razão, pela qual tem sido rejeitada por todos os praticos. Todavia póde praticar-se, 1.º suspendendo-se a corrente do sangue com o torniquete applicado junto á axilla: 2.º situando-se o enfermo do modo ordinario, isto he, sentado em huma cadeira, e a extremidade segura por ajudantes: 3.º fazendo o operador com hum escalpello huma incisão circular na pelle, e cellular, dous dedos abaixo da junta, e descarnando estas partes até aos condylos

do humero: 4.º cortando na extensão do ante-braço o tendão do triceps brachial, e na flexão todas as outras partes, que cercão a junta, e o ligamento capsular: 5.º laqueando as arterias por meio do tenaculo, e puxando os tegumentos a cubrir as cartilagens do osso, e conservando-os com a costura secca, e mais appositos do modo ordinario.

Da amputação pela junta do punho.

§. LXII.

A junta do punho he muito propria para as amputações, e deve praticar-se alli todas as vezes que a destruição da mão, por qualquer causa, deixar livre esta junta; porque quanto mais comprido fica o ante-braço, melhor se servem delle os enfermos. Para se praticar, applica-se o torniquete no lugar do costume, e, seguro o ante-braço, faz o operador com hum escalpello huma incisão circular nos tegumentos, pollegada e meia abaixo da
jun-

junta, puxando-os hum ajudante para cima quanto for possível. Feito isto, mette a mão em abducção, e corta transversalmente os tendões, e ligamentos, que cercão a junta, principiando por baixo da eminencia estiloidea do radio, e acabando por baixo da do cubito. Separada a mão, laquea as arterias, puxa os tegumentos para cubrirem as cartilagens, applica a costura secca, e mais appósitos do modo ordinario.

Das amputações dos dedos pelas suas articulações com os ossos do metacarpo, ou das suas phalanges humas com as outras.

§. LXIII.

Quando os dedos se achão destruidos nas suas extremidades, por qualquer causa que seja, e nos vemos obrigados a praticar a amputação para separar alguma porção morta, prevenir a communicação do mal, como disposição escrofulosa, cancroza, &c., ou para commodidade do enfer-

fermo, como em certas aleijões, escolheremos a junta mais proxima ao mal, e que se achar no estado natural. E então, segura a mão por hum ajudante, faz o operador com o escalpello dous retalhos de figura oval aos lados da junta na pelle, que cobre a phalange, que ha de ir fóra, os quaes levantados descobrem os ligamentos, e tendões, que cortará transversalmente no intervallo dos dous ossos articulados, dirigindo sempre o cóрте do instrumento para a cartilagem do osso, que se extrahe. Feito isto, une os dous retalhos com a costura secca, e applica huma, ou duas maltas suftidas com algumas voltas de circular, laqueando primeiro algum vaso, que der sangue, o que poucas vezes acontece, em razão da pequenhez das arterias, as quaes se contrahem facilmente com o toque do ar. (a)

Da

(a) Os antigos amputavão os dedos de diferentes maneiras: 1.^a cortando o osso com a tenaz incisiva, depois de feito o cóрте da pelle, e mais partes molles com o canivete: 2.^a com hum escopro, e mar-

*Da amputação da côxa a retalho pela
junta das cadeiras.*

§. LXIV.

A operação de separar huma extremidade inferior pela junta das cadeiras he a operação mais arriscada de todas quantas amputações se praticão , não só pela grande ferida , que he preciso fazer-se , mas por ser muito perto do tronco , e em lugar , onde com muita difficul-

da-

téllo , ou maço , pondo o dedo em cima de alguma cousa dura , depois de cortadas as partes molles : 3.^a finalmente amputando-os do mesmo modo , que as outras partes , isto he , cortando as partes molles , e serrando o osso com o ferrote pequeno. Este ultimo methodo foi o que vogou mais ; porém não he tão bom como o de amputar pelas articulações , e só tem lugar quando alguma phalange descuberta pela gangrena , ou ulceração até ao meio , impede a cicatrização. Em quanto aos dous primeiros methodos , devemos desterrallos da prática ; porque , além de barbaros , ficam os ossos amolgados , rachados , ou lascados , e portanto em estado de excitarem inflammações , e supurações , que atrazão muito a cura.

dade podemos suspender a corrente do sangue ; e estas são as razões , por que os praticos , tomando o trabalho de a deſcrever , mui poucas vezes a tem praticado : com tudo taes podem ſer as lace- rações das partes molles pelas feridas das armas de fogo , ou outras cauſas , o eſtrago do oſſo por fracturas compoſtas , e complicadas , as carias , e eſpinhas ventofas da cabeça , e peſcoço do femur , e finalmente o ſitio da gangrena , que para ſe ſalvar a vida ao enfermo , ſe preſcinda de todos os obſtaculos , que ſe nos offerecem. E então , para ſe praticar , ſitua-ſe o enfermo deitado de coſtas com o lado , que ſe ha de amputar , o mais fóra da borda da cama que for poſſivel , em cuja ſituação ſeguro por ajudantes , e alguma couſa inclinado ſobre o lado oppoſto , hum ajudante robusto comprime com hum chumaço a arteria crural contra a ſinuofidade iliaca , e o operador corta circularmente os tegumentos , e aponevroſe da côxa , quatro pollegadas abaixo do grande trochan-

chanter , e pelo lugar , onde estes ficão retirados para cima , corta circularmente as carnes até ao osso , e laquea não só a arteria principal , mas todos os ramos , que derem sangue. Feito isto , toma hum escalpello , e com elle faz duas incisões , que profundão até ao osso , huma anterior , outra posterior , as quaes principião no córte circular , e se dirigem para cima na extensão de tres pollegadas. Com estas duas incisões ficão dous retalhos , hum externo , outro interno , dos quaes levanta este ultimo , deseccando-o do osso até descobrir o ligamento capsular , o qual aberto dá lugar para se cortar o ligamento redondo , e se deslocar a cabeça do osso , acabando a operação por se deseccar o retalho interno , e unir a ferida por primeira intenção com a costura secca , e mais appositos , como fica dito. (a)

Tom. IV.

S

Da

(a) Tambem se tem aconselhado a amputação pelas articulações do joelho , e do pé : mas não pôde haver caso algum , em que taes operações sejam uteis :
1.º porque são juntas muito descarnadas , e falta or

Da extracção das extremidades articulares dos ossos.

§. LXV.

Alguns modernos , governados pela observação de serem expulsadas pelos esforços da natureza , ou tiradas pela arte porções grandes de ossos , e mesmo as suas extremidades articulares , e de serem suppridas por substancias osseas regeneradas , ficando os membros em estado de encherem huma grande parte das suas funções , tem estabelecido como regra geral supprir as amputações pelas juntas com a extracção das extremidades articu-
la-

dinariamente pelle , e carnes para se cubrirem os ossos :
2.º porque a operação he menos dolorosa , e a cura mais prompta , praticando-se do modo ordinario por cima do joelho , ou na barriga da perna : e só praticaremos a separação dos ossos do tarso entre si , ou com os ossos do metatarso pelas suas juntas , quando a molestia der lugar a poupar-se alguma porção do pé. Em quanto ás amputações dos dedos do pé , observaremos o mesmo , que fica dito a respeito das amputações dos dedos da mão.

lares , todas as vezes que as ditas extremidades cariadas , fracturadas , ou atacadas da espinha ventosa , se não puderem conservar , ou remediar sem a amputação , e o restante dos ossos , assim como as partes molles se acharem no estado natural , ou em tal estado , que dem esperanças de se restabelecerem : com tudo bem poucas vezes se poderá tentar com utilidade esta operação nos casos de carias , ou exostoses , em razão do estrago , que soffrem as partes molles vizinhas ás articulações. E não obstante achar-se aconselhada por Park nas juntas do joelho , e cotovelo ; he com tudo mais praticavel na das cadeiras , e espadoa (a). O modo de se praticar he

S ii o

(a) O primeiro , quanto eu posso saber , que deo algumas idéas para fundamento desta operação , foi Boncher , o qual mostra * , que muitas vezes se podem dispensar as amputações nas feridas das armas de fogo complicadas com fracturas nas articulações das extremidades , ou junto a ellas , e que a cabeça , e pescoço do osso humero tem sahido com grandes

* Memor. da Academia de Cir. de Paris , T. II. pag. 287 , e 461.

o seguinte. Disposto tudo, e situado o enfermo como para as amputações a retalho, o operador, sendo na junta da espada, faz com hum escalpello duas incisões

porções cariadas ao través de incisões feitas para este fim. White conservou hum braço, ferrando a cabeça do humero cariada, que deslocou, e fez sahir ao través de huma profunda incisão praticada na junta da espada, principiando proximo do acromio, e acabando na parte média do braço, e a cura se completou em quatro mezes. Park propõe esta operação para as juntas do joelho, e cotovelo em huma Dissertação publicada em 1783. Na articulação do joelho aconselha: 1.º que se faça huma incisão na parte anterior da articulação, dous dedos acima, e dous abaixo: 2.º que se faça outra crucial por cima da rodela, que deve cortar transversalmente o tendão extensor da perna, e comprehender metade da circumferencia do membro: 3.º que se levantem estes angulos, e que se cortem os ligamentos, que prendem a rodela, para se tirar este osso: 4.º que se passe huma faca larga por detrás dos ossos, para fazer passagem a huma espatula, que defende as partes molles dos dentes da serra, com a qual se serrão os extremos inferior do femur, e superior da tibia pela parte sã. Esta operação, que Park praticou com successo a 2 de Julho de 1781, foi seguida de huma cura mui longa, mas o enfermo ficou com a sua perna. Na articula-

sões longitudinaes , que profundão até ao osso , da extensão de quatro pollegadas , sobre o musculo deltoides , as quaes , apartadas huma da outra superiormente coufa de duas pollegadas , se encontrão inferiormente , descrevendo a figura da letra V. Feito isto , descarna o retalho de baixo para cima , até descobrir o ligamento capsular , que abre , e córta os tendões dos musculos vizinhos , até poder deslocar a cabeça do osso , e a fazer sahir pela ferida , quanto baste para o ferrar pelo são , abrigando as carnes dos dentes da ferra com huma lamina de papelão , mettida entre estas e o osso. Depois disto puxa o braço ao seu lugar , e cura a
fe-

ção do cotovelo aconselha a operação do mesmo modo , fazendo-se a incisão longitudinal na parte posterior , e tirando-se primeiro o extremo superior do cubito , &c. Que os enfermos operados desta maneira ficão com o membro , quando escaparem da operação , não entra em dúvida ; mas se o membro lhes será de alguma utilidade , ou se a vida corre mais , ou menos risco , do que com as amputações , só se poderá decidir pelo successo de futuras observações.

ferida chegando às partes humas às outras, quanto for possível, com costura seca, deixando na parte mais baixa sahida para as materias, que communmente se fórmao nas partes já ulceradas. Sendo na côxa, prática a operação do mesmo modo, levantando o retalho, que deve ser mais extenso em todas as dimensões na parte anterior, e externa da articulação, e tanto em huma, como em outra laqueará os vasos, que derem sangue, por meio do tenaculo.

C A P I T U L O III.

Da sangria.

§. LXVI.

Sangria em geral.

A Sangria he huma operação de cirurgia feita com lanceta, ou outro qualquer instrumento, ou com bichas destinadas sómente a tirar sangue. (a)

Quan-

(a) Esta operação, huma das mais antigas, como vemos em Hippocrates, Celso, e outros Autho-

§. LXVII.

Quando se faz huma incisão na vêa com lanceta , chama-se a operação phlebo-

res de Cirurgia , he a mais necessaria , e a mais trivial ; pois que por ella se remedeão muitas molestias internas , e externas , e se previnem , ou atalhão muitos symptomas , que sobrevem ás outras operações , e não sei porque fatalidade tem sido reputada como huma insignificante operação , sendo assás difficultosa , e exigindo , para se praticar com segurança , talvez mais conhecimentos anatomicos , do que a maior parte das outras operações. Menos sei a razão , por que se tem reduzido a huma arte distincta da Cirurgia , e Medicina , chamando-lhe , como lhe chamão alguns Escriitores , a parte servil da arte de curar , como se esta operação , em tudo igual ás outras , vilipendiasse alguma cousa os individuos servís , que por desgraca da humanidade a praticão faltos de conhecimentos , e tão ignorantes como os que a tem tratado de servil. Porém felizmente vejo desterrados estes grosseiros abusos no nosso Paiz a favor de huma operação tão necessaria ; pois que os Tavares , os Picanços , os Oliveiras , e outros , que fazem tanta honra á arte de curar , a praticão todas as vezes que com ella podem valer á humanidade , livres da fiducia , que tem alguns Cirurgiões , que apenas ganhão algum credito , logo se desprezão de sangrar.

botomia; e quando se faz em huma arteria, chama-se arteriotomia.

§. LXVIII.

A sangria ou he geral , ou particular. A geral, chamada tambem evacuatoria , faz-se só com o fim de tirar sangue da constituição, e he indifferente fazer-se no pé , ou no braço. A particular ou he derivatoria , como quando sangramos no pé , para alliviar os males da cabeça , e no braço , para alliviar os males do peito, e ventre, ou topica, a qual tira sangue immediatamente da parte enferma, como quando sangramos nos olhos, ou em qualquer parte inflammada.

§. LXIX.

A sangria evacuatoria, e derivatoria faz-se com lanceta, ferindo huma só vêa, a qual fica apta para a repetição , se for precisa , sem a neccssidade de nova operação. A topica faz-se ou picando huma só vêa, ou sarjando, isto he, fazendo algum

gum, ou alguns golpes na pelle, e cellular, ou finalmente applicando bichas, cuja sangria exige a repetição de nova, ou novas operações, se a molestia precisa de mais de huma.

§. LXX.

Para se praticar a operação da sangria, cumpre 1.º apromptar as cousas precisas, como atadura, chumaços, fitta para deter o sangue, agua quente para se banhar a parte, sendo no pé, ou mão, algum emplastro pegajoso, ou tafetá gommado, vaso proprio para se aparar o sangue, e lanceta competente, ou outros instrumentos: 2.º situar o enfermo relativamente á parte, que se ha de sangrar: 3.º tomar conhecimento da vêa, e partes, que lhe ficão proximas: 4.º suspender o refluxo do sangue, para fazer turgir a vêa: 5.º fixar a vêa, para não fugir á lanceta: 6.º ferir a vêa de modo, que se não offendão as partes vizinhas, e se abra huma cesura maior, ou menor, conforme a

repetição das sangrias : 7.º remover os obſtaculos , que ſe oppuzerem á ſahida do ſangue : 8.º ſuſpender a ſahida do ſangue , depois de tirada a porção , que ſe quer : 9.º applicar o chumaço , e atadura , e pôr em deſcanço a parte ſangrada : 10.º remediar os ſymptomas , que podem ſobrevir á ſangria , aſſim como tambem as offenſas de outras partes , que poſſão ſer picadas além da vêa.

§. LXXI.

As ataduras , que communmente ſervem na ſangria , ſão tiras de panno fino , ou fitta de linho do comprimento de tres quartas , e largura de huma até duas pollegadas. Os chumaços ſão feitos de hum bocado de panno dobrado em quatro , ou ſeis dobras de modo , que fiquem da largura , e comprimento de duas pollegadas , ſendo muito preciso apromptar huns poucos ; porque muitas vezes cuita vedar o ſangue com hum , ou dous. A fitta , ſeja de ſeda , de lã , ou de linha , deve ter a lar-

largura de huma pollegada , e comprimento tal , que dê duas voltas ao redor do membro, e se possa atar (a). A agua quente, da qual se usa na sangria do pé, e da mão, deve ser no gráo de calor, que o enfermo possa supportar, para fazer turgir as vêas , unico fim , para que se faz uso della. O emplastro pegajoso , ou tafetá gommado , serve para unir a cesura na ultima sangria, particularmente tendo sido grande. Os vasos para aparar o sangue reduzem-se ou a chicanas, para nellas se observar a quantidade, e qualidade do mesmo sangue , ou ás bacias , nas quaes se mistura com a agua. As lancetas, que se apromptão para fazer as sangrias , podem diversificar em comprimento , largura, e apontado, relativamente á situação, e grossura da vêa, que se ha de sangrar; porque as vêas grossas , e mui cubertas de cellular, precisão de lancetas mais largas; as pequenas, e superficiaes de lan-

T ii

ce-

(a) Hum ourelo he muito melhor , do que as fittas.

cetas mais estreitas. Em quanto ao apontado , seja a lanceta larga , ou estreita , deve ser curto , e largo (a) , e não de ponta de espinho , como querem alguns.

Em

(a) Bell reprova o apontado largo , e curto , allegando que a ferida dos tegumentos he maior , do que a da vêa , seguindo-se mais dores , difficuldade de suspender o sangue , e commummente alguma supuração : mas seria na verdade cousa bem difficullosa fazer-se huma incisão igual na vêa , e tegumentos com a lanceta de ponta de espinho ; porque a figura da cesura deve precisamente ser a mesma , só com a differença de maior , ou menor , seja qual for o apontado : e portanto vejamos qual dos apontados he melhor. O largo faz maior abertura na vêa , profundando menos ; e por consequencia ha menos risco de se atravessar a vêa , e de se ferirem as partes , que estão por baixo ; além disto o sangue corre muito melhor , e não fórma a echymosis com tanta facilidade , como sendo a cesura feita com o apontado agudo. E terão alguma comparação os symptomas , que se seguem da ferida maior dos tegumentos , com os que vem em consequencia da picada de huma arteria , de hum nervo , ou de hum tendão ? Certamente não : logo digo o contrario do que diz Bell , que a lanceta de ponta de espinho he a que se deve desprezar , como capaz dos maiores perigos , principalmente nas mãos de sangradores pouco instruidos.

Em lugar da lanceta se preparão bichas , quando se não achão vêas , ou quando a sangria se faz em parte , onde as não ha de calibre tal , que possão ser abertas com a lanceta. Tambem em lugar de lancetas se usa dos esscarificadores , para se fazerem golpes na pelle , a que chamão farjas , e se tem inventado para isto muitas castas de esscarificadores , mas todos menos uteis, do que a lanceta.

§. LXXII.

A situação do enfermo será assentado na borda da cama , ou em huma cadeira de mediana altura defronte de boa luz , se a molestia dá lugar a escolher-se situação ; porque muitas vezes não póde estar assentado , e então o operador o sangrará deitado , ou encoftado , como lhe fizer melhor geito (a) á luz de véla , ou coufa

(a) Ha pessoas tão medrosas da sangria , que se não deixão sangrar sem serem seguras por alguém : em taes circumstancias fará o operador segurar bem o membro , em que ha de sangrar ; porque qualquer

sa semelhante. Isto feito, situa-se o operador em pé defronte do enfermo hum pouco mais para o lado, em que ha de sangrar, sendo no braço, ou cabeça; e sendo no pé, sentado em huma cadeira baixa.

§. LXXIII.

Para o operador tomar conhecimento da vêa, e partes vizinhas, cumpre tomar o tacto com a cabeça do dedo indicador direito no lugar, onde se ha de sangrar, para deste modo se decidir qual he a vêa mais grossa, e livre de tendão, nervo, ou arteria, cujas partes se distinguem bem pelo tacto, além do conhecimento das suas situações pela anatomia, que he indispensavel aos sangradores.

As vêas dão hum tacto de corpos redondos, semelhantes a pennas de escrever, ou mais delgadas, conforme o seu calibre, com huma certa elasticidade, que
lhes

movimento involuntario póde ser seguido de grande perigo, particularmente nas crianças, que não sabem o que lhes convem.

lhes faz ganhar a figura , que a compressão do dedo lhes faz perder , além de se descobrirem ordinariamente com a vista , não só como corpos redondos , mas azulados.

Os tendões dão hum tacto de corpos redondos , ou conicos , resistindo muito á compressão , e faltando-lhes a elasticidade ; e quando são achatados , ou em fórma de aponevroses , dão o mesmo tacto , porém representando huma fita mais , ou menos larga.

Os nervos , que acompanhão algumas vêas , que se sangrão , são quasi sempre imperceptiveis pelo tacto , e só em pessoas muito descarnadas he que se podem conhecer , sendo grossos , como o mediano : pelo que se fugirá de picar vêas , que são acompanhadas destes órgãos , representados como cordões iguaes , delgados , menos duros , do que os tendões , e nada elasticos , como as vêas.

As arterias dão hum tacto de corpos redondos , elasticos , e mui distintos das outras partes pela pulsação.

§. LXXIV.

Escolhida a vêa , que se ha de sangrar , que deve ser a mais grossa , e a mais livre de tendões , ou nervos , e de nenhuma forte a que estiver contigua a alguma arteria (a) , toma o operador a fit-

(a) Nunca pôde haver motivo , que obrigue o sangrador a picar huma vêa contigua a huma arteria ; porque , ainda que confie muito na sua habilidade , não pôde prevenir algum movimento involuntario do enfermo , particularmente sendo medroso , ou muito sensível. Pelo que na flexão do braço he muito mais seguro não sangrar na vêa brachial , ou vêa da arca , por ser acompanhada da arteria brachial , mormente tendo a mediana , a cephalica , e a cubital , que não são acompanhadas de arterias. Na costa da mão he igualmente mais seguro não sangrar na vêa apoplectica , situada entre o primeiro osso do metacarpo e primeiro osso do dedo pollegar ; porque he communmente acompanhada de hum ramo da arteria radial. No peito do pé corre a arteria tibial anterior , e por cima della passão algumas vêas , que se não devem sangrar , na certeza de que tirar sangue do pé por huma , ou outra vêa he o mesmo ; porque todas se ajuntão a hum só tronco superiormente , do mesmo modo que as da costa da mão , e braço se unem humas

fitta depóis de situado, e seguro o membro ; e applicando o seu meio sobre a vêa , huma pollegada acima do lugar, onde se ha de sangrar , cruza as pontas na parte opposta , e as ata com hum nó de laçada no lado externo , dando-lhe hum gráo de aperto tal , que suspenda o ascenso do sangue pelas vêas , sem impedir o descenso pelas arterias.

§. LXXV.

Feito isto , toma novamente o tacto , para se certificar, com a vêa inchada , do lugar mais próprio para a picada , e a fixa , levando o sangue para cima com o dedo pollegar da mão desoccupada , até pollegada e meia , ou duas pollegadas abaixo do lugar, onde ha de picar, cujo dedo conserva alli até ferir a vêa , a qual

Tom. IV. V pe-

ás outras , para formarem huma só vêa chamada subclavia , e que hoje não póde haver Medico, ou Cirurgião tão ignorante , que pense como os antigos , que pela sangria de tal , ou tal vêa se remedção as moléstias de certos órgãos , quando se sabe que a sangria só he util , porque tira sangue.

pelo aperto da fitta , e compressão do dedo se acha firme , e turgida , para se cortar melhor com a lanceta. Ha muitas vêas , que rolão debaixo do dedo , com que se toma o tacto , e podem fugir á lanceta , dando-se a picada em falso , a pezar das compressões da fitta , e do dedo. Para se evitar este defeito , se atará a fitta mais proximo do lugar escolhido para a picada , ou se aproximará o pollegar mais á fitta , ficando menos espaço entre huma e outra compressão.

§. LXXVI.

Preparada deste modo a vêa , toma o operador a lanceta pelo meio do ferro (que d'antemão tem disposto em angulo agudo com as tachas) entre os dedos pollegar , e indicador da mão direita em flexão , sangrando nas partes esquerdas , e *vice versa* nas direitas ; e apoiando as cabeças dos tres ultimos dedos por baixo do lugar , onde ha de dar a picada , applica a ponta da lanceta sobre a vêa em

hu-

humã direcção obliqua de baixo para cima; e extendendo hum pouco os dedos, que pégão na lanceta, corta os tegumentos, e parede exterior da vêa até penetrar a sua cavidade, em cujo estado perlonga a incisão para diante linha e meia, ou duas linhas, abaixando hum pouco o couce da lanceta, para que a ponta não atravesse a vêa, e vá ferir as partes, que estão por baixo. A vêa póde ferir-se de tres modos, a saber, ao seu comprimento, obliqua, ou transversalmente, dos quaes a ferida obliqua he a melhor, não só porque se não erra tão facilmente a vêa, mas porque a cesura deste modo he mais apta para unir, do que a transversal, e menos sujeita a fechar-se, do que a longitudinal, quando pela mesma picada se pertendem fazer mais sangrias. Além de se não dever passar com a ponta da lanceta á parte opposta da vêa, ha outro meio de se não ferirem as partes contiguas, e he o de dirigir a ponta do instrumento para a parte contraria áquella,

em que estiverem tendões , nervos , ou arterias. Ferida a vêa , apara-se o sangue no vaso destinado para isto , o qual alguma pessoa tem de antemão situado de baixo da parte , que se ha de sangrar.

§. LXXVII.

Algumas vezes , cessando a compressão do pollegar , corre o sangue bem até se tirar a quantidade , que se pertende ; porém outras vezes pára por muitas causas : 1.^a porque a fitta muito apertada não deixa passar o sangue das arterias para as vêas , e daqui vem a necessidade de se affroxar hum pouco a dita fitta até ficar no gráo de aperto , que convier para o sangue correr bem : 2.^a porque o enfermo póde desmaiar ; e então se bórriará com agua fria , para tornar a si ; e se não bastar , se lhe fará cheirar vinagre , ou alkali volatil , e beber agua fria , vinho , ou outro qualquer cardiaco , sendo o principal remedio deitar-se por algum espaço de tempo : 3.^a por ser muito pequena a ce-
su-

fura , o que não tem outro remedio , se-
não huma nova picada : 4.^a finalmente
por se defencontrarem a cesura dos tegu-
mentos da da vêa , defeito que se reme-
dea conservando o membro exactamente
na mesma situação , em que fora picado ,
ou puxando a ferida dos tegumentos para
baixo , para cima , ou para os lados , até
se encontrar com a da vêa.

§. LXXVIII.

Tirada a quantidade de sangue , que
convier , desfata-se a fitta , ajuntão-se os
labios da cesura com o pollegar , e indi-
cador da mão , que não sangrara , sem fi-
car sangue de permeio , e com a outra se
applica o chumaço sustido com algumas
voltas de atadura , cujas pontas se atão
na parte opposta á sangria. Tomado o
sangue , recolhe-se o pé na cama , sendo
a sangria baixa , e suspende-se o braço em
hum lenço atado ao pescoço , sendo alta ,
recommendo-se ao enfermo , que não
faça movimentos com a parte sangrada , e
que

que elle , ou alguem a vigie de quando em quando nas primeiras horas , para que não succeda perder-se muito sangue , no caso que este se solte. Muitas vezes solta-se o sangue , e debalde se applicão outros chumaços , e mais ataduras , porque o sangue repassa tudo : pelo que he preciso tirar o primeiro chumaço , e puxar os tegumentos para o lado externo , a fim de desencontrar a cesura dos tegumentos da da vêa , antes de se applicar o chumaço enxuto.

Para se repetir a segunda , e mais sangrias pela mesma cesura , situa-se o enfermo do mesmo modo , que para a primeira , e o operador desfata a atadura , tira o chumaço com muita suavidade , ou o faz cahir com agua quente , se a parte a pede , ata a fitta , aparta com brandura os labios da cesura , atezando a pelle para os lados , applica a cabeça do dedo mediano da mão , que não sangrara , sobre a mesma cesura , em quanto a vêa se enche ; e tirando-o , leva o sangue com a

ou-

outra de baixo para cima , para este romper a união , que as partes divididas tiverem ganhado , e sahir para huma chicara , que huma pessoa tem defronte da cesura , seguindo no resto o que fica dito.

Se o sangue não sahir , se examinará a causa , que póde ser 1.º má situação do membro : 2.º coalho de sangue atravessado na cesura : 3.º alguma porção de gordura , sahindo pela cesura : 4.º a ecchymosis : 5.º a inflammação , e tumefacção das partes : 6.º finalmente a tenaz união da ferida por effeito de disposição constitucional , ou de ter mediado muito tempo desde a ultima sangria.

A má situação , isto he , não estar o membro na mesma , em que fora sangrado , faz desencontrar as cesuras , e portanto não corre a sangria : pelo que conhecemos quanto he util situar exactamente a parte sangrada como quando se sangrara.

O coalho de sangue dissolve-se com agua quente ; e se não basta , destroe-se

com a ponta de huma tenta , ou alfinete.

A gordura atravessada na cesura desvia-se com a tenta ; e sahindo para fóra , se corta com as pontas da tisoira.

A ecchymosis , isto he , o sangue diffundido na cellular vizinha , porque , sahindo pela cesura da vêa , não póde sair pela dos tegumentos , tem lugar ou em quanto a sangria está ligada , ou quando o operador espreme o sangue. No primeiro caso não se deve fazer mais sangria por aquella cesura , e se applicarão sobre a ecchymosis chumaços molhados em cozimentos tonicos adstringentes acompanhados de alguma compressão feita com voltas de atadura moderadamente apertadas. No segundo cumpre desfatar a fitta , e fazer entrar o sangue outra vez na vêa , ou sair pela cesura externa , mediante brandas compressões feitas com os dedos ; e se ainda assim não correr sangue , se sangrará em outra parte , usando-se dos meios acima ditos para a cura da ecchymosis.

A inflammação , e tumefacção das partes embarça a reperição das sangrias naquelle lugar, e exige o trato antiphlogistico interno, e externo, segundo a offensa local, ou o estado constitucional.

A tenacidade da união, que tem lugar quando medêa muito tempo de huma sangria á outra, ou quando ha, como succede em muitos sujeitos, huma grande tendencia das partes para a união por primeira intenção, desfaz-se com a tentativa, ou cabeça do alfinete; e se não póde ser, pica-se segunda vez a vêa abaixo da primeira picada, ou outra qualquer vêa, que for livre de perigos.

Na ultima sangria se aproximão bem os labios da cesura, entre os quaes não deve ficar sangue, e se applica hum ponto falso, e por cima chumaço, e atadura; mas póde dispensar-se o ponto falso molhando-se o chumaço em agua fria, e deixando-o por dous, ou tres dias, no fim dos quaes se acha ordinariamente a ferida unida.

O symptoma, que mais trivialmente se segue á sangria , he a inflammacção excitada pelo estimulo da picada na pelle, na vêa, em algum tendão, nervo, ou no periossio : e esta inflammacção será maior, ou menor, segundo a parte picada, e o estado, ou disposição constitucional.

A inflammacção da pelle céde ordinariamente a algumas applicações emollientes, ou águas saturninas, e produz huma ligeira suppuração na cesura, que se cura com qualquer ceroto, particularmente com o de chumbo.

A inflammacção das vêas, isto he, da sua membrana interna, poucas vezes tem lugar, e se attribue a sua causa ao ar, que póde entrar na cavidade destes órgãos por descuido de se não conservar bem unida a cesura; mas quando se verifica he muito trabalhosa, porque se estende até muito longe do lugar picado, produzindo symptomas gravíssimos, que concluem a vida do enfermo, se o tratamento antiphlogístico, constitucional, e

to-

topico lhe não atalha o progresso (a). A offensa dos nervos , ou tendões póde ser seguida das mais funestas consequencias ; e por isto se vê quanto importa, que o Cirurgião , ou Medico , que sangra , saiba bem a situação destes órgãos, para os não offender, e ao mesmo tempo nunca profundar a ponta da lanceta de modo , que vare a vêa de parte a parte , unico meio de evitar taes riscos : porque

X ii

ain-

(a) João Hunter tem attribuido todos os máos symptomas , que se seguem ás picadas das sangrias, á inflammação da tunica interna das vêas, a qual não só se estende até ao coração , mas termina algumas vezes por suppuração , sendo a causa da morte dos pacientes. Eu não duvido da possibilidade desta inflammação ; mas occorre tão poucas vezes, que não ha razão para attribuirmos a esta causa todos os máos symptomas , que sobrevem á sangria , como quer Hunter ; pois que , ainda achando-se as vêas inflamadas nos exames, que fazemos nos cadaveres, não podemos decidir se a dita inflammação he hum effeito da offensa das outras partes , ou a causa dos symptomas, que apparecêrão , mormente quando vemos com tanta frequencia effeitos tão decididos das picadas dos nervos, ou tendões, que nos não deixão dúvida alguma sobre a natureza da offensa.

ainda que as arterias , e tendões se conhecão com muita facilidade : com tudo os nervos , e periossio são imperceptiveis , e só pela situação se decide da sua existencia. A picada do nervo he immediatamente conhecida por huma dor aguda , a qual ordinariamente vai abatendo , e no fim de alguns dias deixa o enfermo livre. Porém algumas vezes , em lugar de abater , cresce até ao segundo , ou terceiro dias , e se estende até á virilha na extremidade inferior , e até á axilla na superior , causando a inchação de algumas glandulas destas partes. O lugar picado inflamma-se , e a inflamação lavra mais , ou menos pelo comprimento do nervo offendido , seguem-se febre , inquietações , vigílias , vomitos , perturbação das funções de alguns órgãos , que sympathizão com o nervo picado , convulsões , e algumas vezes o tetanismo. A picada dos tendões , ou aponevroses não he logo seguida de dor aguda , mas vem do segundo dia por diante , e cresce cada vez mais ,

mais , estendendo-se por todo o musculo do tendão picado , que se torna tenso , e rijo como huma corda , seguindo-se a inflammção , febre , e mais symptomas ditos na picada dos nervos , particularmente o tetanismo (a). Quando pelos symptomas referidos conhecemos o orgão picado , cumpre não sangrar mais naquelle lugar , e lançar mão dos antiphlogistos internos , que forem compativeis com a molestia , que obrigára a sangrar , e com as mais circumstancias , em que se achar o enfermo. Topicamente se empregaráõ os emollientes em fomentações , banhos , ou cataplasmas ; e crescendo os symptomas , seguiremos o que fica dito no Capitulo

pi-

(a) A' vista de symptomas tão distintos das offensas dos nervos , e tendões , nenhuma dúvida pôde ficar sobre quaes são destes orgãos os offendidos , nem mesmo que huns e' outros são capazes de darem os mesmos resultados , quando são picados , e os tendões ainda mais do que os nervos , contra o sentimento daquelles , que os julgão insensiveis , e contra a opinião de Hunter , que attribue os ditos symptomas á inflammção da tunica interna das vêas.

pitulo das convulsões como symptomas das feridas. *

As picadas do perioffio em lugares descarnados, como no tornozelo interno, são algumas vezes seguidas de dores grandes, e inflammação, que se limita ao lugar offendido, e cede commummente aos emollientes, e fedativos, ou vai ao processo da suppuração, a qual se cura com muita facilidade. Em quanto ás picadas das arterias, observaremos o que fica dito no Capitulo do aneurifma. **

Sangria em particular.

§. LXXX.

Da sangria do braço.

Na flexura do braço achão-se quatro vêas, que são a vêa brachial, basilica, ou vêa d'arca, a mediana, a cephalica, e a cubital, as quaes se podem sangrar,
mas

* Tom. I. Cap. VI. pag. 197.

** Tom. III. Cap. XI. pag. 305.

mas com muito cuidado , para se não offenderem as partes contiguas a ellas. A vêa brachial , situada no meio da flexura , ou sangradouro , he ordinariamente a mais grossa , e a mais descoberta , e por tanto a que preferem os sangradores , que só tem em vista tirar sangue : porém como esta vêa he acompanhada da arteria brachial , que lhe fica ordinariamente por baixo , e póde ser picada por incidente não esperado , a pezar de todos os cuidados do operador; por tanto o mais seguro partido he não sangrar tal vêa , excepto quando a arteria estiver distante della o espaço de duas , ou tres linhas ; e não só haverá a cautela de se não varar com a lanceta , mas a de dirigir a ponta deste instrumento para a parte opposta. A vêa mediana , ou de todo o corpo , acha-se situada obliquamente de baixo para cima , estabelecendo huma communicação entre a basilica e cephalica , cruzando obliquamente a direcção do tendão do biceps , e do nervo cutaneo externo , o qual passa hu-

humas vezes por baixo , e outras por cima desta vêa ; e portanto cumpre desviar a lanceta do tendão do biceps , e da sua aponevrose , sangrando ao lado externo do dito tendão , e não profundando a lanceta , para não ser tocado o nervo cutaneo. (a)

As vêas cephalica , e cubital , a primeira situada na parte anterior da flexura , a segunda na posterior , são as mais livres de perigo , excepto varando-se de parte a parte de modo , que se offenda a aponevrose , que cobre todos os musculos do ante-braço ; porque então podem sobrevir alguns dos symptomas das picadas dos tendões. Pa-

(a) Os symptomas , que se seguem , quando se pica este nervo , são huma dor aguda , que se estende até á espadoa , e desce aos tres primeiros dedos , seguida ordinariamente da sua paralyfia , e dos mais symptomas das picadas dos nervos , e tendões. Os antigos escaldavão taes picadas com oleo a ferver : mas esta prática tem sido geralmente desprezada por pouco efficaz. Foubert usava de hum trocisco de minio , que mettia na cesura , o qual , passada a dor grande , que excita , remedeia os symptomas da picada.

Para se sangrar qualquer destas quatro vêas , prepara-se tudo o que he preciso , como fica dito (LXX) ; e tomando-se o tacto para conhecimento da vêa , das partes vizinhas , e do lugar mais livre , ata-se a fitta abaixo do ventre do biceps , ficando o nó ao lado externo , e pica-se a vêa depois de bem chea , com as cautelas acima referidas , no braço direito com a mão direita , e no esquerdo com a esquerda , seguindo em tudo o mais o que fica dito na sangria em geral. Se pela delgadeza das vêas , ou muita gordura do enfermo se não puderem descobrir pela vista , nem pelo tacto , sangramos na costa da mão , ou em outro qualquer lugar do ante-braço , onde apparecer vêa capaz para se sangrar , e livre de arterias , ou tendões , na certeza de que sangrar mais abaixo , ou mais acima , nesta , ou naquella vêa , he tudo o mesmo , com tanto que se possão fazer as sangrias precisas.

Da sangria da costa da mão.

§. LXXXI.

Na costa da mão achão-se duas vêas, huma no intervallo do primeiro osso do dedo pollegar, e primeiro osso do metacarpo, chamada cephalica, da cabeça, ou apopletica (*a*), e outra entre os dous ultimos ossos do metacarpo, chamada salvatella, na mão direita hepatica, e na esquerda splenica (*b*). Estas vêas correm de baixo para cima encoistadas aos tendões extensores dos dedos, ou sobre elles. A apopletica he além disto acompanhada de huma arteria, e de hum nervo: pelo que convem muito evitar a offensa

des-

(*a*) Nomes dados pelos antigos, que suppunhão a sangria desta vêa mui proveitosa nas molestias da cabeça, de cuja opinião nós conhecemos a falsidade.

(*b*) Os antigos lhes derão estes nomes, por suporem que a sangria na salvatella direita aproveitava nas enfermidades do figado, e na esquerda nas do baço, cujas opiniões são igualmente destituidas de fundamento.

destas partes , sangrando de maneira , que se não varem estas vêas com a lanceta , para o que , tomado o tacto , se ata a fitta acima do punho , e se banha a mão com agua quente , fazendo-lhe esfregações , até que a vêa escolhida se encha bem , para se picar debaixo das cautelas referidas , e se prosseguir no restante como fica dito. Esta sangria na costa da mão só tem lugar , quando na extremidade superior se não achão outras vêas , ou quando se pertende satisfazer ao capricho de alguns doentes , que possuidos de abusos ainda tem alguma prevenção a favor de tal sangria.

Da sangria do pé.

§. LXXXII.

As vêas , que se podem sangrar no pé , são a grande saphena , situada sobre o tornozelo interno , a pequena saphena , sobre o externo , a virginal no peito do pé , e o arco , que fórmão as duas saphenas anastomosadas sobre o metatarso , af-

sim como tambem alguns ramos, que dos dedos vem descarregar-se neste arco. Todas as vêas situadas no peito do pé ou correm ao comprimento dos tendões extensores dos dedos, e flexôres do pé, ou cruzão as suas direcções: além disto a virginal he acompanhada algumas vezes da arteria tibial anterior, e o arco das sapphenas cruza a direcção desta arteria, a qual lhe passa por baixo. A grande sapphena está sobre o periossio do tornozelo, e he acompanhada do nervo crural, que a serpeja mais, ou menos: por cujos motivos quando sangrarmos qualquer destas vêas, que nos parecer mais descoberta, e mais grossa (unica razão da escolha, e não as opiniões dos antigos, que lhes derão os nomes mencionados sem fundamento algum), cumpre 1.º tomar o tacto para nos desviarmos de tendões, e arterias: 2.º atar a fitta acima dos tornozelos, ou no peito do pé, segundo o lugar escolhido para a picada, que deve ser dous dedos distantes da fitta: 3.º metter o pé em

em huma bacia de agua quente , e fazer-lhe esfregações até as vêas incharem: 4.º tirar o pé da agua , enxugallo , apoiar o calcanhar na borda da bacia , em cima de huma cadeira , ou do joelho do operador , que está assentado , e picar a vêa debaixo dos preceitos , que dissemos em geral: 5.º aparar o sangue em algum vaso , para sabermos a quantidade , que se tira , e a que se deve tirar , o que se não póde calcular bem mettendo-se o pé outra vez na agua , como he costume: 6.º finalmente tomar o sangue , e applicar o chumaço , e atadura chamada estribo.

Quando em razão da delgadeza das vêas , ou da muita gordura se não puderem sangrar as vêas do pé , e apparecer alguma pelo seguimento da perna acima , seja a saphena interna , a externa , ou peronea , as poderemos sangrar , e mesmo as preferiremos , em razão do pouco , ou nenhum risco , que tem de se offenderem nervos , ou tendões.

Se a sangria de pé for precisa em
pef-

pessoa , que tenha as pernas inchadas , ou os pés , como acontece nas mulheres paridas , faremos huma compressão com chumaços , e atadura por algum espaço de tempo antes da sangria , para que , retirados os foros , deixem perceber a vêa.

Tambem podemos escolher hum , ou outro pé nas sangrias baixas , e hum , ou outro braço nas altas ; porque ha pessoas , que tem as vêas mais descobertas , ou mais grossas de hum lado , do que do outro.

Da sangria do genital.

§. LXXXIII.

Em muitas molestias do genital são convenientes as sangrias topicas ; porém mais particularmente no priapismo. A vêa pudenda , que corre ao comprimento do dorso do genital , he a que se fere com a lanceta , fazendo-a turgir , se he preciso , pelo aperto da fitta ; e quando se tem feito a sangria , basta hum bocado de tafetá gommado para estancar o sangue.

Da

Da sangria das jugulares.

§. LXXXIV.

A sangria das vêas jugulares , aconselhada para a esquinencia , frenesi , mania , melancolia , cephalgia , apoplexia , ophtalmias , e muitas outras molestias de cabeça , he na verdade a que de mais perto tira maior copia de sangue , e por tanto tem vogado em todos os tempos (a). Para se praticar senta-se o enfermo na cama , ou em huma cadeira com a cabeça encostada a travesseiros , ou ao peito de hum ajudante , e o operador , tendo a lanceta prompta , e huma carta de jogar curva como huma telha , para encaminhar o sangue a huma chicara , comprime com o
de-

(a) He verdade que a jugular , na qual se sangra , he a externa , e muitas vezes hum ramo desta : pelo que parecerá pouco efficaç nas molestias , que atacão os órgãos internos de cabeça. Todavia as communicações , que ha entre as duas jugulares , interna , e externa , fazem que descarregando-se huma , se descarregue tambem a outra.

dedo pollegar da mão esquerda a vêa por cima da clavicula até turgir bem , em cujo estado hum ajudante , ou qualquer pessoa a comprime pela parte superior para a fazer firme , e não fugir á lanceta. Picada a vêa do mesmo modo que se picão as outras , e com mais franqueza , por não haver perigo algum , tira o ajudante o dedo , conservando o operador a compressão com o seu até se fazer a sangria conveniente , e então , cessando com a compressão , deixa o sangue de correr , e basta applicar na cesura hum bocado de tafetá gommado.

Muitas vezes não basta a compressão do dedo para fazer turgir a vêa ; porque o sangue vai pelas communicações para a jugular interna : em taes casos cumpre fazer a compressão immediatamente acima da clavicula com chumaços applicados sobre a jugular , que se ha de picar , sobre os quaes se põe o meio de huma liga , cujas pontas se atão debaixo do braço opposto : e se com esta compressão não

tur-

turge a vêa , faremos outra semelhante sobre a do lado opposto ; porque , comprimidas ambas , demora-se mais o sangue.

Da sangria das vêas raninas.

§. LXXXV.

A sangria destas vêas foi aconselhada por alguns praticos na esquinencia depois das sangrias geraes , e das jugulares : porém hoje ninguem se lembra de taes sangrias ; e quando he preciso tirar sangue topicamente da garganta , o fazem com bichas applicadas ao redor do pescoço com muito mais proveito : com tudo se alguem achar esta sangria conveniente , se poderá praticar do modo seguinte. Depois de aquecida a boca com bochechas de agua quente , e demorado o sangue nas jugulares por meio de duas ligaduras (LXXXIV) , levanta o operador a ponta da lingua com os dedos pollegar , e indicador da mão esquerda , e com a lanceta na direita abre as duas

vêas raninas ; porque huma não basta para dar o sangue , que se quer tirar. Para o suspender basta ordinariamente tirar as ligaduras feitas sobre as jugulares ; e se ateima em correr, se farão tomar bochechas de aguas adstringentes.

Da sangria pelo nariz.

§. LXXXVI.

Como a hemorrhagia pelo nariz tem sido faudavel em muitas molestias , lembrarão-se os antigos de sangrar os vasos da membrana pituitaria , mettendo em huma , ou em ambas as ventas huma brócha de sedas de javali , e movendo-a em muitas direcções até correr o sangue , que julgavão preciso , depois o estancavão com agua fria , ou aguas adstringentes. Esta sangria , posto que pouco usada , não deixa de ser util em muitas queixas da cabeça , que peccão em sobegidão de sangue. (a) *Da*

(a) Eu não fallarei da sangria da vênâ frenetica , situada na ponta do nariz , e das aspicientes nos can-

Da sangria da testa.

§. LXXXVII.

Na testa acha-se huma vêa chamada fusana , ou vêa da fronte , a qual se póde sangrar banhando-se a testa com agua quente , atando-se huma fitta junto á raiz do cabello , até a dita vêa turgir , e pican-do-se com lanceta. Esta sangria de nada serve , e em lugar della serão muito mais proveitosas as bichas , quando se precise tirar sangue daquelle lugar.

Das ventosas seccas , e sarjadas.

§. LXXXVIII.

As ventosas são huns vasos de vidro , ou de metal com a boca mais estreita do que o fundo , as quaes se applicão

Z ii

des-

tos dos olhos ; porque não ha molestia , em que a sangria de taes vêas possa aproveitar , pela pouca descarga , que se consegue , sendo muito mais efficazes sangrias topicas por meio de bichas.

despejadas de ar , para attrahirem , ou forverem a pelle para dentro de si.

De dous modos se despejão as ventosas do ar : hum he incendiando dentro dellas pequenos armeos de estopa , e applicando-as á pelle , em quanto arde a estopa : outro he tirando-lhes o ar depois de applicadas , por meio de huma bomba , ou seringa , que se ajusta a huma torneira engastada no seu fundo. Este ultimo modo exige mais apparatus , e ventosas mais complicadas ; por cujos motivos tem sido geralmente desprezado.

As ventosas seccas applicão-se para excitar estímulos , e produzir derivações , e tem lugar nas feridas venenosas , nas molestias de nervos , ataques de cabeça , hemorragias , e particularmente nos hysterismos , e se podem lançar em todas as partes , onde possa assentar com igualdade a boca da ventosa. Para se levantarem as ventosas , carrega-se na pelle junto á boca destes vasos , de modo que possa entrar o ar , e immediatamente se despegão.

As

As ventosas sarjadas (pouco usadas nos nossos dias , e muito pelos antigos , quando querião excitar grandes estímulos , e tirar sangue por derivação , ou chupar venenos) applicão-se duas , ou tres vezes no mesmo sitio , até a pelle córar , e se elevar bastante pelos liquidos attrahidos ; e então fazendo-se tres , finco , ou mais sarjas com lanceta na pelle elevada , se renova a applicação da ventosa tantas vezes , quantas se julgar precisa para fazer a descarga de sangue , que convier. Feito isto , alimpa-se o sangue , e se applica no lugar sarjado huma prancheta de fios seccos , ou untados em algum ceroto , e por cima chumaços , e atadura conveniente. (*a*)

Da

(*a*) A sangria da vêa pupis , e de outras situadas na parte cabelluda da cabeça , praticavão-se applicando ventosas , e sarjando o lugar empolado , depois de rapado o cabello : mas estas sangrias achão-se abandonadas no dia de hoje , e com razão ; porque as bichas , ou incisões sem o soccorro das ventosas , chamadas sarjas cirurgicas , ou esscarificações , produzem melhor effeito com menos crueldade.

Da sangria topica por meio de bichas.

§. LXXXIX.

Esta sangria he das mais uteis, que se fazem, não só porque tira sangue immediatamente da parte doente, mas porque reune a evacuação com o menor estimulo possível. O seu uso he antiquissimo, mas não tão extenso como no presente tempo, o que se vê bem no decurso desta Obra.

As bichas, ou sanguesugas são huns insectos aquaticos, que applicados na pelle a penetrão, fazendo-lhe huma abertura triangular, pela qual chupão o sangue. As melhores são as que tem a cabeça pequena, o lombo preto com riscas verdes e amarellas, a barriga vermelha e amarellada: e faltando-lhes estas qualidades, tem muito risco de serem peçonhentas; e por tanto não se devem applicar.

Para se applicarem as bichas, limpa-se bem a parte, lavando-a com agua
quen-

quente , e esfregando-a com hum panno até se fazer vermelha , se se não achar inflammada ; e mettendo-se as bichas em huma ventosa , sendo muitas , ou em hum vidro mais pequeno , chamado bicheiro , sendo huma , ou duas , se applica a boca deste , ou daquella ao lugar , que se quer sangrar , até as bichas pegarem ; e logo que pegarem , deixão-se encher , e cahir per si. Tambem se podem applicar as bichas huma a huma sem ventosa , ou bicheiro , pegando-se-lhes com hum panno pela cauda , e aproximando-se-lhes a cabeça ao lugar , que se ha de sangrar. Para as bichas pegarem melhor , será bom tellas fóra da agua algum tempo antes de se applicarem ; porque esfaimadas pégão mais avidamente. Se ainda assim não quizerem pegar , se deitará assucar , ou sangue fresco de pombo , ou frango sobre a parte.

Pela cahida das bichas ficão as mordeduras deitando sangue , que se deixará correr até estancar , lavando-se a parte de
quan-

quando em quando com agua quente. Muitas vezes não convem tirar muito sangue, ou não veda espontaneamente : em taes casos, limpo o sangue, se applicaráõ sobre as mordeduras camadas de isca de panno queimado, ou alguns pós estiticos, chumaços, e atadura conveniente. Se alguma, ou algumas bichas ateimão em chupar mais sangue do que he preciso, o que se mede pelas forças do enfermo, pelo numero das bichas, e pelo muito que enchem, se farão cahir deitando algum tabaco no lugar, onde estão ferradas. (a) C-A-

(a) Eu não fallarei da arteriotomia, isto he, da sangria das arterias; pois que, a pezar de ser aconselhada por muitos Medicos antigos, está fóra de uso nos nossos tempos, e com bastante razão pelos seguintes motivos : 1.º por se lhe não conhecer utilidade, ou vantagem sobre a sangria das véas : 2.º por ser muito custoso suspender o sangue, e exigir ataduras mui apertadas, que incommodão os enfermos : 3.º por se perder o uso da arteria picada, em razão de ser preciso aproximarem-se as suas paredes huma á outra, para se suspender o sangue : 4.º finalmente por ser algumas vezes necessario passar-se á laqueação, por não parar o sangue pelos outros meios.

C A P I T U L O IV.

Das fontes , e sedenhos.

§. XC.

AS fontes , e sedenhos são humas ulceras , ou chagas artificiaes , que se abrem em qualquer parte do corpo para estabelecimento de huma nova descarga.

§. XCI.

Como as fontes , e sedenhos produzem huma derivação de estímulos , e de humores , fica claro contra a opinião de Van-Helmont , e muitos outros , que são utilíssimas em muitas molestias , como em fluxões , e congestões chronicas , de cabeça , de olhos , de ouvidos , de garganta , de peito , de ventre , &c. , e muito particularmente quando a constituição se acha habituada a huma descarga , e esta se supprime ou espontaneamente , como purgações , &c. , ou pela arte , como na

cura das chagas antigas ; porque em taes casos são indispensaveis , humas vezes para se entreter a vida , outras para se poderem curar as molestias sem o receio que a constituição estranhe a falta da descarga , a que estava habituada. (a)

§. XCII.

Posto que em todas as partes do corpo se possão abrir fontes ; com tudo a parte inferior, e externa do musculo deltoides no braço , a parte inferior, e interna da coxa , e a parte superior, e interna da perna , são os lugares , que com menos incommodo dos pacientes se escolhem para este fim ; porque se podem conservar os appositos com ligaduras , que se não desmanchão tão facilmente.

Os

(a) Os antigos pensarão , que certos vicios , ou venenos dos humores sahião pelas fontes , ou sedenhos : mas nós sabemos que a derivação dos estímulos , e humas excreção mais sem qualidade especifica , são os meios , pelos quaes se pallião , ou curão as molestias , em que as fontes , ou sedenhos se aconselhão.

Os sedenhos preferem ás fontes , todas as vezes que convem estímulos mais fortes , e descargas mais abundantes ; e se abrem em todas as partes do corpo , onde se julga que a derivação he mais conveniente , a qual póde ser proxima , assim como a das fontes , quando se praticão junto á molestia , e remota , quando se abrem longe do mal.

§. XCIII.

Para se abrirem as fontes , toma-se huma préga transversal na pelle , segura de hum lado por hum ajudante , e do outro pelo operador , o qual com huma lanceta , ou bisturi faz hum golpe de cima abaixo no meio da dita préga , que chegue até á cellular , em cujo golpe , solta a pelle , mette huma bolinha de cera , chamada grão , e por cima applica hum chumaço sustido com algumas voltas de circular (a). Passados quatro , ou cinco

Aa ii dias ,

(a) Os antigos abrião as fontes com o cauterio em braza , cujo methodo foi seguido do caustico , co-

dias , levantão-se os appositos , e principia-se o curativo diario , que consiste em limpar a ulcera , lavando-a com agua morna , metter-lhe huma nova bolinha , ou a mesma depois de limpa , e applicar-lhe huma prancheta , ou bocado de panno com algum ceroto , e hum chumaço fustido com as voltas de circular. Em lugar da atadura circular usão algumas pessoas de chapas de latão , ou prata amoldadas ao lugar , e seguras com huma fitta , a qual preza em hum extremo da chapa , vem affivelar ao outro , ou segurar-se em hum botão por meio de cascas. Esta casta de ligadura prefere á primeira ; porque ,
além.

mo o nitrato de prata , o antimonio muriato , ou outro qualquer , posto sobre a pelle ao través de hum buraco com as dimensões , que deve ter a fonte , praticado em hum emplastro do tamanho da palma da mão , o qual se applica na parte com o dito buraco no lugar , onde deve ser a fonte , marcado com tinta. Sobre o caustico se applicão fios , chumaços , e atadura , que se conservão em quanto se fórma a escara , a qual , derrubada com algum ceroto , deixa a ulcera , em que se mette a bolinha de cera , para se continuar a cura diaria como fica dito.

além de ligar , defende a fonte dos toques , ou injúrias externas.

§. XCIV.

Para se passarem os sedenhos , prepara-se hum a agulha propria , que he como hum a lanceta , no fundo da qual se enfia hum a tira de panno franjada , ou hum cordão de algodão , cujo principio se unta em gemma d'ovo ; e levantando-se hum a préga transversal na pelle , como disse nas fontes , se atravessa pela base com a agulha de baixo para cima , ou de cima para baixo , tirando-se pela parte opposta. Passado o sedenho , dá-se hum nó em cada ponta , applicação-se alguns fios nas feridas sustidos com hum emplastro , chumaços , e atadura conveniente , de baixo da qual devem ficar as pontas do sedenho. No fim de quatro , ou cinco dias principião as curas diarias , que consistem em tirar todo o apposito , em alimpar as chagas , em puxar nova porção de sedenho untada em balsamo d'Arceo , ou gemma

ma d'ovo , e em applicar fios molhados nos mesmos remedios , novo emplastro, chumaço , e atadura. Quando se tem passado todo o sedenho , se substitue outro , ou se torna a puxar o mesmo , porém em direcção opposta. Posto que em muitas partes , como no cachaço , seja mais facil passar-se o sedenho transversalmente ; com tudo sempre o devemos passar longitudinalmente , para melhor sahida da materia , e para se não formarem bolsos , onde esta se demore , e cause dores , e inflamações. Tanto as fontes , como os sedenhos crião muitas vezes carnes babosas , que se devem destruir com os cathetereticos , dos quaes usaremos tambem para renovar estas ulceras , quando se forem seccando.

Quando as fontes , ou sedenhos se querem fechar , ou porque se tenha vencido a molestia , ou porque se julguem inuteis , iremos diminuindo a bolinha , ou cordão gradualmente , até deixarmos as ulceras sem corpos estranhos , em cujo
es-

estado se fechão espontaneamente : e se não succeder assim , as seccaremos com fios , ou aguas deseccantes , tendo sempre em vista não supprimir taes evacuações sem purgarmos brandamente os enfermos duas , ou mais vezes , para evitarmos a estranheza , que soffre a constituição da falta de huma evacuação , a que estava habituada , particularmente tendo existido muito tempo.

Da inoculação das bexigas.

§. XCV.

A inoculação das bexigas consiste em communicar o veneno de huma pessoa a outra (a) , o que se faz 1.º tirando-se a
ma-

(a) Eu não fallarei da utilidade da inoculação ; porque ninguem deixa de conhecer no dia de hoje depois de tantas , e tão repetidas experiencias , que a inoculação livra do contagio , e por consequencia da morte a muitos individuos , que aliás seriam victimas de tão terrivel mal. Por meio da inoculação se poupa hum prodigioso numero de vassallos para o estado , se conserva a vista a muitos , e se preserva a

materia bexigosa de alguma pessoa , que tenha bexigas de boa qualidade (a) , e que seja sadia : 2.º fazendo-se huma ligeira incisão com lanceta no epiderme , que apenas appareça sangue : 3.º applicando-se hum fio de algodão , ou couza semelhante na incisão , embebido na materia , e sustido com hum bocado de tafetá gommado. Posto que huma só destas incisões baste para pegar a enxertia ; com tudo

belleza , que as cicatrizes das bexigas por contagio costumão destruir. Tambem não fallarei do modo de preparar , ou dispôr os fugeitos para se inocularem , e do que se lhes deve fazer em quanto durão as bexigas , por não pertencer a este lugar , limitando-me sómente ao modo mais suave , e mais seguro de inocular o veneno , como a experiencia tem mostrado a todos.

(a) Posto que todos saibão , que o veneno bexigoso he a mesma couza em todos os individuos , e que as differenças de boas , ou más bexigas procedem do estado constitucional , pois que a materia de bexigas crySTALLINAS produz bexigas confluentes , e a destas bexigas crySTALLINAS ; com tudo ha menos receio de que com a materia das bexigas boas se inocule tambem alguma outra infecção , qua possa influir no exito da molestia , que se vai a produzir.

do será mais seguro fazerem-se duas, humma em cada braço, nos lugares, onde se abrem as fontes, isto he, junto á borda inferior, e externa do musculo deltoides, ou na parte interna, e inferior das côxas. Se a inoculação produz o effeito, que se deseja, segue-se dor, e inflammação nas incisões depois do quarto dia por diante: e desde o setimo até o dezoito principião a sahir as bexigas, cuja irrupção, e de mais estados se passão ordinariamente com mui pouco incommodo dos inoculados. (a)

Tom. IV.

Bb

CA-

(a) Além deste modo de inocular as bexigas, ha outros, que devemos rejeitar, comô untar qualquer parte do corpo com a materia das bexigas; e atar ao redor de hum braço, ou perna hum cordão passado pela dita materia, em razão de diffundirem o veneno na atmosphera, e poderem vir as bexigas como por contagio. Tambem abandonaremos os methodos de profundas incisões, e de fios passados com a agulha ao través da pelle; porque estes methodos são seguidos de grandes inflammações, e suppurações, que abrem grandes chagas difficultosas de curar, além de produzirem tumores nas glandulas da axilla, ou virilhas, segundo o lugar, onde se inocula, que são muito mais trabalhosos de curar, do que os que se seguem á simples arranhadura, que eu proponho.

CAPITULO V.

*Das ligaduras demonstradas nas Estampas
desta Obra.*

ESTAMPA V.

NEsta Estampa se achão gravados parte dos appositos , de que fallei em geral. *

N. 2. 6. 7. 10. 13. 16. 17. e 18. mostram differentes figuras de pranchetas, de que fazemos uso para o curativo de muitas molestias chirurgicas.

N. 3. 4. e 5. mostram as figuras dos lichinhos destinados aos mesmos fins.

N. 1. 8. 9. 12. 14. e 15. mostram differentes méchas accommodadas a differentes castas de chagas.

N. 19. mostra hum escovinha de fios para alimpar as ulceras , ou de cabello para alimpar a ferradura dos ossos.

N.

* Tom. I. pag. 16. §. XVIII. e seg.

N. 20. e 21. mostram em pequeno os cordões, ou tiras para os sedenhos.

N. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. e 39. mostram as figuras dos emplastros, e chumaços fendidos, e recortados de diferentes modos, para se ajustarem a todas as partes do corpo.

N. 30. 55. e 64. são canulas metallicas para a bronchotomia, e outros usos.

N. 40. e 41. mostram as cataplasmas, e emplastros estendidos, ficando certa margem livre para maior aceio, ou na qual se estendem emplastros pegajosos para maior segurança.

N. 43. 44. 45. 46. 52. 53. e 59. são as figuras das talas, e chumaços, que as forrão, das quaes se faz uso nas fracturas.

N. 47. mostra huma atadura enrolada em dous globos.

N. 48. e 49. mostram chumaços graduados, iguaes, e desiguaes.

N. 50. representa hum estribo, que

ampara o pé em casos de feridas , chagas , ou fracturas.

N. 56. he huma manopla , que na mão serve para os mesmos fins.

N. 51. e 57. mostram os encoistos dos membros fracturados , os quaes se fazem de hum lençol dobrado pelo comprimento em tres , ou quatro dobras , e enrolados pelos extremos até ao meio sobre si , ou sobre corpos mais duros , como rolos de páo , ou de palha.

N. 62. he huma atadura circular , enrolada em hum só globo , a qual se acha desenrolada em o N. 63.

N. 58. mostra o laço , que se faz ao redor de hum membro para se fazerem as extensões nos casos de fracturas , e deslocções , puxando-se pelas pontas da atadura.

N. 60. caixa com arcos , para defender os membros fracturados das compressões da roupa.

N. 54. e 61. são embrulhos de panho , ou de fios para encher certos vasos ,

como a cova do braço , a curva da perna, &c. , sobre os quaes se applicão as ataduras , ou destinados a livrar as partes das compressões.

E S T A M P A VI.

Nesta Estampa se achão gravadas as ataduras simples , e compostas , e algumas applicadas , que mostrão as ligaduras iguaes, e desiguaes.

N. 1. mostra a atadura T. triplicado.

N. 2. T. dobrado.

N. 3. T. dobrado com seu escapulario.

N. 4. representa a figura humana com varias ligaduras applicadas. A. ligadura compressiva , ou nó de enfardar , inteiramente inutil. B. C. escapulario applicado. D. suspensorio applicado. E. pequena espiral. F. medeana espiral. G. ligadura unitiva. H. mostra as inversões. I. ligadura compressiva. L. ligadura expulsiva. M. ligadura igual. N. ligadura obtusa. O. ligadura unitiva das feridas transversaes. P. grande espiral.

N. 5. T. dobrado para o nariz.

N. 6. T. dobrado para as virilhas.

N. 7. T. dobrado para os peitos.

N. 8. mascara , de que se usa nas feridas combustas.

N. 9. T. dobrado para a cabeça.

N. 10. atadura de virilha.

N. 11. lenço triangular para varios usos.

N. 12. outra mascara composta para se atar.

N. 13. lenço , com que se faz o grande toucado.

N. 14. mostra o modo , com que se péga em huma atadura para se applicar.

N. 15. a mesma atadura desenrolada.

N. 16. gualapo de dezoito pontas , para as fracturas da perna , com duas cavas , superior , e inferior , para se ajustarem ao calcanhar , e curva da perna.

N. 17. gualapo de quatro pontas , para muitos usos.

N. 18. T. simples.

N.

N. 19. outro T. dobrado , mas em huma só peça.

N. 20. outro T. simples mais largo no centro.

N. 21. T. largo para a espadoa.

N. 22. gualapo de seis pontas , para varios usos.

N. 23. atadura chamada de nadega.

N. 24. mostra o gualapo de seis pontas , com que se faz a ligadura da cabeça , chamado o gualapo de Galeno.

N. 25. T. com bolsa para o nariz.

N. 26. suspensorio para o scroto.

E S T A M P A VII.

Nesta Estampa se mostrão applicadas huma grande parte das ligaduras de cabeça empregadas para differentes fins.

N. 1. mostra a ligadura regia , a qual , applicadas as pranchetas , e chumaços A. B. C. D. E. , se faz com huma atadura do comprimento de vara e meia , ou duas varas , e pollegada e meia de largo , enrolada em hum só globo , dando circula-

res ao redor da cabeça de modo, que as ultimas descubram parte das primeiras, como se vê em G. F., segurando-se o ultimo extremo com alfinetes.

N. 2. faz ver o grande toucado, que serve na operação do trepano, ou em qualquer caso, em que seja precisa huma ligadura contentiva, e se faz com hum lenço do comprimento de tres palmos e meio, e largura de tres, dobrado pelo comprimento em duas metades; porém a de baixo excedendo em largura dous, ou tres dedos, cujo meio, depois de applicados alguns dos appositos A. B. C. D. E. F. G. H. O., se situa no alto da cabeça, atando-se as pontas da metade externa debaixo da barba, e as da interna na nuca, ficando a porção excedente, que se volta para cima, e se préga posteriormente com alfinetes, disposta como huma volta de circular I. M. N.

N. 3. representa o gualapo de Gale-
no, ligadura mais firme do que a antecede-
nte, a qual se faz com hum pedaço de
pan-

panno de tres palmos e meio de comprido , e dous de largo , com tres pontas em cada extremo , resultadas de dous côrtes em iguaes distancias , como se vê em A. A. A. D. E. F. G. H. Applicados os appositos , e chumaços B. C. , situa-se o meio do gualapo no alto da cabeça com as pontas pendentes sobre os seus lados , das quaes as anteriores se levão á nuca , onde sobrepõe huma em cima da outra , as posteriores assentão sobre estas , e se trazem a atar na fronte M. , e as medianas descem pelos lados da cabeça N. , e vem atar debaixo da barba O.

N. 4. mostra o toucado de preta , o qual se faz com hum lenço de tres pontas D. , cujo meio , situados os appositos A. B. C. E. , se applica na fronte ; e levando-se as duas pontas a cruzar na nuca sobre a terceira , se trazem a atar na testa , ficando o toucado como se vê G. F. H.

N. 6. faz ver o gorro de Hippocrates , ou *capelina* , que se pratica com huma atadura B. de dez varas de comprido , e

dous dedos de largo enrolada em dous globos , tendo hum seis varas , e outro quatro. E applicados os appositos, e chumaços A. , situa-se o meio da atadura na fronte, e se levão os globos á nuca, onde , passado o grande por cima do pequeno, se faz com este huma inversão, e se conduz pelo alto da cabeça até á testa , em cujo lugar lhe passa por cima o globo grande, que anda sempre ao redor da cabeça descrevendo huma circular F. G., e o pequeno da testa á nuca, descrevendo espiraes medianas D. C. E. , até cubrir toda a cabeça , acabando-se esta ligadura por segurar os extremos com alfinetes.

N. 5. mostra o mesmo gorro de Hippocrates, chamado gorro lateral, que differe do antecedente em se fazerem as inversões aos lados da cabeça , e as espiraes medianas B. G. D. correrem da direita á esquerda , sustidas pela circular E. F. Esta ligadura de nada serve , porque se desmancha facilmente , e faz
com-

cômpressões fortes nos lugares das inversões.

N. 7. mostra a bolsa de Pibrac, para poupar as costuras verdadeiras nas feridas da lingua : A. a bolsa com o arame, e atadura : B. a dita bolsa mostrada como deve estar situada dentro da boca : C. o arame situado na ponta da barba, e pescoço : D. o atado da ligadura, da qual, depois de applicada a bolsa, se levão os extremos a cruzar na nuca, por baixo das orelhas, e dalli vem a atar na testa.

N. 8. faz ver a ligadura frontal E., feita com hum gualapo de quatro pontas A., o qual tambem se faz com huma circular B., servindo para conter os appositos D. C.

N. 9. ligadura unitiva D. E. F., a qual se pratica com huma atadura D., enrolada em dous globos D., depois de applicados os appositos A. B. C.

N. 10. mostra huma ligadura contentiva, chamada T. triplicado B. D. E. F. G., a qual se applica como se mostra

em I. I. I. L. H. M., depois de situados os appositos precisos cubertos com o chumaço A.

N. 11. he a ligadura chamada T. singelo, applicada como se vê em C. D. E. F., a qual se póde tambem fazer com huma circular A. por meio de inversões feitas na testa, e na nuca, depois de applicados os chumaços B.

N. 12. mostra a ligadura chamada meio gorro, ou *scapha*, a qual se faz com huma atadura de tres varas de comprido, pollegada e meia de largo D., enrolada em hum globo. Applicados os appositos A. B. C., se deixa hum bocado de atadura pendente sobre a face, conduzindo-se o globo com obliquidade desde a testa á nuca por cima de hum dos parietaes E., donde se conduz por cima da orelha opposta a fazer circulares ao redor da cabeça; e voltando-se a ponta pendente sobre a face por cima do outro parietal I., vai á nuca, onde he segura por duas, ou mais circulares F. G. H., pregando-se o ultimo extremo com alfinetes. N.

N. 13. mostra a ligadura chamada suspensorio ocular, a qual se faz com hum lenço de tres pontas A. , que se applica sobre os chumaços B. C. , como se demonstra em D. E. Esta ligadura he muito propria para quando se applicão cataplasmas nos olhos, mettendo-se estas entre as suas dobras.

N. 14. faz ver a ligadura chamada monoculo simples, que se pratica com huma atadura de quatro varas de comprimento, e dous dedos de largo, enrolada em hum globo B. , cujo extremo applicado na nuca, depois de postos os chumaços, se fazem huma, ou duas circulares ao redor da cabeça, por cima das orelhas, até o globo tornar á nuca, donde se conduz por baixo da orelha do lado enfermo por cima do olho, e sobre o parietal opposto E., dando-se assim tres círculos em espiraes pequenas, até que chegando o globo á nuca, torna a fazer circulares ao redor da cabeça C. D.

E S T A M P A VIII.

Nesta Estampa se continúa a mostrar o resto das ligaduras praticadas na cabeça para varios usos.

N. 1. faz ver a ligadura chamada monoculo dobrado, que serve quando ambos os olhos precisão de ligaduras compressivas. Pratica-se com huma atadura de sete varas de comprido, e dous dedos de largo, enrolada em dous globos B. ; e depois de situados os chumaços A., põe-se o meio da atadura na testa, elevão-se os globos a cruzar na nuca, para se trazerem por baixo das orelhas, por cima dos olhos, e parietaes até á nuca, donde continuação do mesmo modo a fazer tres, ou quatro voltas, descrevendo pequenas espiraes E. E. F. F. C. C., e acabão em algumas circulares ao redor da cabeça D. D.

N. 2. mostra a ligadura, que se chama monoculo compressivo, a qual se faz com huma atadura de quatro varas de
com-

comprido, dous dedos de largo, enrolada em hum globo D. Situados os appositos A. B. C. E. F., toma-se a atadura, e applica-se o seu extremo sobre os appositos, ficando hum bocado pendente sobre a face, e leva-se á nuca por cima do parietal opposto, e dalli por baixo da orelha G. até chegar acima do olho, dando-se assim tres, ou quatro voltas, depois das quaes se leva a ponta pendente H. sobre o parietal do mesmo lado L., finalizando com a outra ponta por circulares ao redor da cabeça I.

N. 3. he a ligadura chamada açamo compressivo, ou fossa d'Amintas', feita com o T. singelo, composto de huma tira de quatro varas de comprido, largura de hum dedo, ajuntando-se-lhe ao meio outra de tres palmos, a qual, applicada pelo comprimento do nariz, e fronte acima E. até á nuca, fica o meio da transversal por baixo das ventas, e os seus extremos enrolados em dous globos se levão por cima das orelhas a cruzar na nuca sobre

a antecedente, donde se trazem por baixo das orelhas a cruzar sobre a raiz do nariz, e dalli vão outra vez á nuca por cima dos parietaes D. D., para continuarem a fazer circulares F. ao redor da cabeça. Esta ligadura serve nos casos de fracturas dos ossos do nariz, ou nos de hemorragias, depois de applicados os appositos B., ou passado o cordão com os lichinos A.

N. 4. mostra a ligadura chamada açam contentivo, a qual se faz com huma atadura de tres varas e meia de comprimento, e hum dedo de largo, enrolada em hum globo B., applicando-se o extremo na ponta do nariz G., com hum bocado de meia vara pendente sobre o peito; e levando-se pelo alto da cabeça F. á nuca, se conduz por cima das orelhas, e por baixo do nariz D. G. D., dando assim duas, ou tres voltas até tornar á nuca, a cujo lugar se levará tambem pelo alto da cabeça F. a ponta pendente sobre o peito, a qual se sujeita com algumas circulares ao redor da cabeça. N.

N. 5. faz ver o suspensorio do nariz feito com o T. dobrado , do qual a tira transversal he do comprimento de tres varas , e as perpendiculares de tres quartas B. , e todas da largura de hum dedo. A sua applicação faz-se pondo o meio da tira transversal sobre o beijo de cima , e as perpendiculares aos lados do nariz C. C. , as quaes , cruzando sobre a raiz do nariz , vão á nuca por cima dos parietaes E. E. , onde são sujeitas pelos extremos da transversal , que sobem por cima das orelhas , e , cruzando na nuca , acabão por circulares ao redor da cabeça D.

N. 6. faz ver a funda contentiva do beijo de cima , cuja ligadura se pratica com hum gualapo de quatro pontas E. , comprimento de vara e meia , fendido quasi até ao meio. A sua applicação , depois de situados alguns dos appositos A. D. , consiste em pôr o meio sobre o beijo de cima F. , e levar as duas pontas superiores por baixo das orelhas a cruzar na nuca , e a atar na testa , e as inferiores

por cima das orelhas G. G. a cruzar do mesmo modo na nuca , e a atar na testa H. As letras B. C. mostram os alfinetes , e linha , com que os antigos fazião a costura encruzada , a qual nós suprimos com a secca , e ligadura descripta Tom. III. pag. 48. §. XXXVI.

N. 7. mostra a funda contentiva dos beijos , cuja ligadura se faz com hum gualapo como o antecedente , porém mais largo , e com hum buraco no meio B. , que deve corresponder á boca. A sua applicação , depois dos appositos A. , consiste em ajustar o buraco do gualapo á boca , e levar as pontas por cima e por baixo das orelhas C. a cruzar na nuca , e a atar na testa D.

N. 8. mostra a ligadura chamada compressor do queixo , a qual serve para conter o queixo de baixo no seu lugar , quando se tem deslocado , e se faz com huma tira de cinco varas de comprimento , pollegada e meia de largo , enrolada em hum só globo B. , depois de situados os
chu-

chumaços A. A sua applicação consiste em situar o extremo sobre a face do lado enfermo, ficando hum bocado de tres palmos pendente sobre o peito, dalli leva-se o globo á nuca por cima do parietal opposto G., donde se traz ao redor do pescoço, para sujeitar o primeiro extremo, o qual por meio de huma inversão E. sobe até á nuca por cima do parietal do lado enfermo H., onde torna a ser sujeito pelo globo, que, chegando outra vez á nuca, faz tres, ou quatro espiraes pequenas por baixo da orelha do lado enfermo C., e por cima do parietal do lado são G., acabando por algumas circulares ao redor da cabeça F.

N. 9. representa a ligadura chamada suspenforio do queixo, que se faz com hum gualapo de quatro pontas B., comprimento de vara e meia, depois de situados os chumaços A., pondo o meio na ponta da barba C., e levando as pontas de cima D. por baixo das orelhas á nuca, donde cruzadas fazem circulares E.

ao redor da cabeça , e as pontas de baixo sobem pelas faces acima ao alto da cabeça F. , onde atão , e vão prender-se na nuca ás primeiras.

N. 10. faz ver o cabresto simples, ligadura que serve , como a precedente , nas fracturas do queixo , e como contentiva em muitos casos. Faz-se com huma atadura de seis varas de comprido , pollegada e meia de largo , enrolada em hum globo A. , depois de situados os chumaços B. , pondo-se o extremo de baixo da barba , e levando-se o globo pela face acima D. ao alto da cabeça , e descendo por detrás da orelha do lado são até vir outra vez debaixo da barba , donde continúa do mesmo modo a fazer tres , ou quatro circulares , passando na ultima volta pela parte anterior da ponta da barba C. , para ir á nuca , donde acaba fazendo circulares ao redor da cabeça E.

N. 11. representa o cabresto dobrado , cuja ligadura se faz com huma atadura do comprimento de dez varas , polle-

legada e meia de largo , enrolada em dous globos C. , depois de applicados os chumaços A. B. D. , pondo-se o seu meio de baixo da barba , e levando-se os globos pelas faces acima F. a cruzar no alto da cabeça , donde baixão a buscar outra vez a parte inferior da barba ; e feitas assim tres , ou quatro espiraes , se levão os globos de debaixo da barba á nuca , e dalli se trazem a cruzar na parte anterior da ponta da barba E. , donde , tornando á nuca , acabão a fazer circulares ao redor da cabeça G. Esta ligadura , que serve nos casos de fracturas em ambos os lados , tambem se póde fazer com huma atadura enrolada em hum só globo , e talvez mais commoda , e segura.

N. 12. mostra a ligadura chamada erecto da cabeça , a qual serve nas feridas transversas do cachaço , e quando se pretende conservar a cabeça levantada , ou em extensão : pratica-se com huma atadura de dez varas de comprido , pollegada e meia de largo , enrolada em dous glo-

globos A. , cujo meio se applica na testa D. ; e levando-se os globos a cruzar na nuca , descem a buscar as covas dos braços , donde sobem aos lados do pescoço B. B. , para cruzarem na nuca , e testa , e tornarem a seguir as mesmas derrotas , até tres , ou quatro voltas , no fim das quaes acabão por circulares ao redor do peito C.

N. 13. mostra a mesma ligadura vista pela parte das costas : A. a atadura enrolada a dous globos : B. as circulares ao redor do peito : C. C. as voltas , que passam debaixo dos braços : D. D. as que sobem pela parte anterior dos hombros : E. o seu cruzamento na nuca : F. as circulares ao redor da cabeça.

N. 14. faz ver a ligadura chamada gravata , a qual serve em todos os casos de molestias no pescoço , humas vezes como contentiva , e outras como unitiva , segundo o enrolado da atadura em hum globo B. , ou em dous , cujo comprimento póde ser de huma até tres varas. Sua

ap-

applicação , depois de situados os appostos , ou chumaços A. , consiste em fazer circulares ao redor do pescoço C. , seja de baixo para cima , seja de cima para baixo.

N. 15. mostra o gualapo chamado K. da nuca A. , ligadura contentiva , de que se usa mui trivialmente. O seu meio C. applica-se na nuca por cima dos chumaços B. As duas pontas de cima vão pela parte superior das orelhas D. D. a atar na testa , e as de baixo vão atar na parte anterior do pescoço.

E S T A M P A IX.

Nesta Estampa se mostrão as ligaduras , que empregamos no curativo de diferentes molestias do tronco , praticadas do ventre para cima.

N. 1. faz ver a faixa do tronco com o seu escapulario. A. mostra a faixa , a qual se faz com huma tira de panno de linho , do comprimento de cinco quartas , e da largura do panno , dobrada em tres , ou
qua-

quatro dobras , e enrolada em hum globo , com a qual se fazem circulares ao redor do peito , segurando-se o extremo do fim com alfinetes , ou pontos. B. B. mostram duas tiras pregadas , ou cozidas na faixa , as quaes , cruzando-se , vão por cima dos hombros a cruzar segunda vez entre as espadoas , e a pregar-se , ou cozer-se na faixa.

N. 2. representa a ligadura chamada espiga descendente , a qual serve nas deslocções , e fracturas da clavicula , depois de applicados os chumaços competentes , e hum telha de papelão amoldada ao lugar , e depois de fixadas as espadoas pelo 8 de conta n.º 4. Principia-se esta ligadura applicando-se a ponta de hum atadura do comprimento de dez varas , largura de duas pollegadas , enrolada em hum globo , na cova do braço do lado são ; e levando-se pela parte anterior do peito , vai passar por cima da clavicula junto ao pescoço , donde desce por detrás do hombro a buscar a axilla do lado enfer-

fermo, para dalli subir, e vir cruzar sobre a mesma clavicula, e ir pelas costas ao lugar, onde principiára. Feitas assim cinco, ou seis voltas B. D., faz-se hum circular ao redor do braço C., e acaba-se com algumas circulares ao redor do peito A. Para que estas voltas se não desmanchem com os movimentos, que o enfermo faz, se cozerão humas ás outras com pontos de agulha, e linha, particularmente nas crianças, a quem falta a razão para se conservarem quietas.

N. 3. mostra a ligadura, que serve para depois da bronchotomia, a qual se póde fazer como a gravata do n.º 14. da Estampa VIII., furando-se as voltas da atadura circular, quando passão por cima da parte operada, ou com hum gualapo atado por quatro pontas no cachaço, e furado no lugar correspondente á operação A.

N. 4. faz ver a ligadura chamada 8 de conta, que aproxima, e fixa as espaldas, e se faz com hum atadura de qua-

tro varas de comprimento , duas pollegadas de largo , enrolada em hum globo , applicando-se a ponta na axilla do lado são ; e trazendo-se por cima do hombro do mesmo lado , desce pelas costas á axilla opposta B. , donde sóbe ao hombro , para dalli descer pelas costas ao lugar , onde principiára E. , cruzando em A. Deste modo se fazem tres , ou quatro voltas até se acabar a atadura , que se segura com hum ponto.

N. 5. mostra a mesma ligadura vista pela parte anterior com as voltas B. C. D. E. , aproximadas por meio de hum tira A. , que se lhes passa por baixo , ou se situa transversalmente antes de se principiar a ligadura , a fim de prevenir o estimulo , que causão as ditas voltas cortando a pelle nas covas dos braços.

N. 6. representa a capelina do hombro , que applicação nos mesmos casos , em que tem lugar a espiga descendente ; mas he muito menos efficaç , e por tanto inutil. Faz-se com hum atadura de dez

varas de comprido , duas pollegadas de largo , enrolada em dous globos , dos quaes o maior faz as circulares ao redor do peito. A sua applicação consiste em pôr o meio da atadura sobre a clavicula , junto ao pescoço , e levar o globo maior pela espada á axilla opposta , donde principia a fazer circulares ao redor do peito , as quaes pela parte anterior , e posterior sujeitão as voltas , que faz o globo menor da parte posterior á anterior , por meio de tantas inversões , quantas são as vezes , que passa por cima da clavicula , cubrindo este osso em toda a sua extensão.

N. 7. faz ver a ligadura chamada estrellado simples , que se pratica nas fracturas da espada depois de applicados os appositos competentes , sustidos com o 3 de conta n.º 4. Faz-se com huma atadura de oito varas de comprido , duas pollegadas de largo , enrolada em hum globo , cujo extremo se applica na axilla opposta , e se leva o globo por cima da espada ao hombro do lado enfermo , don-

de desce á axilla pela parte anterior C., e sóbe ao hombro opposto pela parte posterior, donde desce pela anterior C. a buscar a axilla, onde principiára, da qual sóbe ao hombro do mesmo lado, para ir á axilla do lado enfermo pela parte anterior do peito, e dalli, subindo ao hombro, desce á axilla opposta pela parte anterior do peito, cruzando em B. com a volta antecedente. Deste modo se fazem tres, ou quatro voltas em pequenas espiraes, e se acaba com algumas circulares ao redor do peito A.

N. 8. he o mesmo estrellado simples visto pelas costas. A. mostra as circulares, que andão ao redor do peito: B. o cruzamento das voltas no meio das costas: C. C. as voltas, que andão ao redor dos hombros.

N. 9. representa o estrellado dobrado, ligadura mui firme, que serve nas fracturas de ambas as espadoas, seja das claviculas, ou das omoplatas; e se faz com huma atadura de doze varas de comprimento.

prido, duas pollegadas de largo, enrolada em dous globos. A sua applicação consiste em pôr o meio da atadura em hum das axillas, e subir com os globos hum pela parte anterior C., e outro pela posterior, a cruzar no hombro, junto ao pescoço, donde baixão á axilla opposta, e sobem tambem, hum pela parte anterior C., e outro pela posterior, a cruzar no hombro junto ao pescoço, para dalli irem buscar a axilla, onde se principiára, e seguirem as mesmas voltas até quatro, ou cinco vezes, descrevendo espigas nos lugares D. D. B., e acabarem por circulares A. ao redor do peito.

N. 10. he o mesmo estrellado visto pelas costas. D. D. são as espigas dos hombros: C. C as voltas dadas ao redor dos hombros: B. a espiga das costas: A. as circulares ao redor do peito.

N. 11. mostra huma ligadura chamada *quadriga*, que serve nas fracturas das costélas, e se faz depois de applicados os chumaços, e lamina de papelão,
com

com huma atadura de dez varas de comprido, duas pollegadas de largo, enrolada em hum, ou dous globos iguaes. A sua applicação principia como no estrellado simples, ou dobrado, segundo se enrola em hum, ou dous globos: e quando se tem feito as voltas B. B. C. C., se principião a fazer espiraes medianas ao redor do peito de cima para baixo, até acabar por duas circulares A.

N. 12. representa o suspensorio simples das mammas, ligadura, que se pratica depois de feita alguma operação nas mammas, e depois de applicados os appositos competentes. Faz-se com huma atadura de oito varas de comprido, duas pollegadas de largo, enrolada em hum globo, cujo extremo se applica na axilla do lado enfermo B.; e trazendo-se o globo por cima da mamma, e hombro opposto C., se leva pelas costas outra vez á axilla, onde principiára, para continuar assim tres, ou quatro voltas em pequenas espiraes de baixo para cima, finalizando

do por duas circulares ao redor do peito A.

N. 13. faz ver o mesmo suspensorio dobrado, ligadura destinada para os mesmos usos, quando he preciso ligar ambas as mammas. Pratica-se com huma atadura de doze varas de comprido, duas polegadas de largo, enrolada em dous globos, applicando-se o meio em qualquer das axillas D., e levando-se os globos a cruzar no hombro opposto E., donde baixão a buscar a mesma axilla, e dalli vem cruzar na opposta, para subirem ao hombro contrario C., de cujo lugar vem outra vez buscar a mesma axilla, onde, cruzando-se, vão á opposta, para continuarem do mesmo modo tres, ou quatro voltas cruzadas em B., acabando por circulares A. ao redor do peito.

N. 14. mostra a ligadura contentiva chamada T. inverso, do qual a tira transversal A. anda á roda do peito, e ata anteriormente; e as perpendiculares B. B. sobem pelos hombros, e vão atar-se anteriormente na tira transversal. N.

N. 15. he o mesmo T. inverso , situado aos lados do peito : A. tira transversal , que se ata em C. : B. C. são as tiras perpendiculares , as quaes cruzão no hombro , e vão atar em C.

E S T A M P A X.

Nesta Estampa se achão gravadas varias ligaduras praticadas no tronco , principalmente do ventre para baixo.

N. 1. faz ver huma ligadura contentiva , chamada colete , a qual se faz com huma peça de panno da largura de palmo e meio A. , e do comprimento preciso para dar huma volta ao redor do corpo , e atar por pontas nas costas , ou sobrepôr , e ser pregada com alfinetes. Esta peça tem humas cavas , que se accommo-dão ás covas dos braços , e humas hombreiras B. B. , as quaes , pregadas anterior , e posteriormente , segurão o colete no seu lugar.

N. 2. mostra huma ligadura contentiva , que serve no pescoço , hombros , e
par-

parte superior do peito, chamada palatina, a qual se faz 1.º com huma circular A. ao redor do corpo: 2.º com huma tira comprida, cujo meio se coze, ou préga na circular entre as espadoas; e vindo os extremos por cima dos hombros B. B., cruzão sobre o sterno, e se préção também á circular: 3.º finalmente com hum collar C. C., que, andando ao redor do pescoço, cruzão as suas pontas anteriormente, e se préção nos extremos da tira B. B.

N. 3. mostra a espiga inguinal simples, ligadura mui util nas deslocações superiores do femur, nas fracturas do seu pescoço, e nas hernias, depois de reduzidas as partes pela taxis cuberta. Faz-se, depois de applicados os appósitos competentes, com huma atadura de dez varas de comprido, duas pollegadas de largo, enrolada em hum globo, cujo extremo applicado em G., se leva o globo pelas costas a fazer duas circulares; e quando chega a D., desce obliquamente

a fazer hum rodeio á parte superior da coxa , vindo da parte anterior para a externa E. , e desta pela posterior para a interna , donde sóbe pela virilha , para cruzar com a volta antecédente em B. , e daqui ir buscar a ilhargia G. , e as costas , até chegar a D. , donde continúa a fazer semelhantes rodeios até quatro , ou cinco em medianas espiraes , que descrevem a espiga B. , subindo a ultima volta C. á parte anterior do ventre , onde se prega ás primeiras circulares , e dalli , feita hum inversão , acaba por algumas voltas ao redor do ventre.

N. 4. representa a espiga inguinal dobrada , que tem lugar quando he preciso ligar ambas as coxas , ou quando ha hernias de ambos os lados. Pratica-se com hum atadura de doze varas de comprimento , duas pollegadas de largo , enrolada em dous globos , pondo-se o seu meio nos lombos , e trazendo-se os globos a cruzar em cima dos pubis , donde trocados , fazem os rodeios ás coxas D. D. ; e
su-

subindo pelas virilhas, vão outra vez aos lombos, para dalli continuarem quatro, ou cinco voltas semelhantes em medianas espiraes de baixo para cima, descrevendo tres elpigas C. C. B., e acabando por algumas circulares ao redor do ventre A.

N. 5. mostra a ligadura contentiva, chamada T. da virilha, da qual a tira transversal A. se ata ao redor do ventre, e a perpendicular C. vai por dentro da coxa, e volta por fóra a pregar-se no lugar B.

N. 6. faz ver a ligadura chamada T. dobrado das virilhas, que serve quando ha molestias, ou se fazem operações em ambos os lados. A tira transversal A. ata-se ao redor do ventre: as duas perpendiculares C. C. vão por dentro das coxas, e vem por fóra B. B. a pregar-se na tira transversal.

N. 7. mostra a ligadura chamada suspensorio do genital, a qual se faz 1.º atando-se huma tira A. ao redor do ventre: 2.º tomando-se huma atadura de vara e

meia de comprido , huma pollegada de largo , enrolada em hum globo , com a qual se fazem espiraes ao redor do genital C. , e se prendem os extremos B. á primeira tira.

N. 8. mostra a ligadura chamada F. singelo do anus , que serve para conter appositos , ou remedios applicados neste lugar : A. a tira transversal atada em B. : C. a tira perpendicular , que vai pelo interfemineo , e virilha do lado enfermo a atar anteriormente na tira transversal.

N. 9. mostra a mesma ligadura com seu escapulario. C. C. fazem ver a tira transversal atada em E. : A. o principio do escapulario : B. B. os dous ramos , que vão por cima dos hombros a prender-se anteriormente na tira transversal.

N. 10. he huma ligadura contentiva , chamada trochanter singelo. Faz-se com huma atadura de tres varas de comprido , duas pollegadas de largo , enrolada em hum globo , com o qual se dão duas voltas ao redor do ventre A. ; e chegando

sobre a ilhargá do lado enfermo , se traz obliquamente pela parte anterior da coxa C. a fazer huma volta D. , para subir obliquamente a pregar-se nas circulares A. , cruzando com a primeira volta na parte anterior da coxa B.

N. 11. mostra huma ligadura compressiva para as hernias umbilicaes , a qual consiste 1.º em o T. inguinal dobrado , cuja tira transversal anda ao redor do ventre C. C. , depois de applicado o centro sobre os chumaços D. , e as tiras perpendiculares F. F. , voltando pela parte externa das coxas E. E. , vão atar-se á dita tira transversal : 2.º em hum escapulario A. , cujos ramos B. B. se vão pregar na tira transversal posteriormente.

N. 12. faz ver huma ligadura contentiva , ou compressiva para as molestias do perineo , chamada collar das misérias , a qual se faz 1.º com hum gualapo de quatro pontas , das quaes as duas anteriores , depois de applicado no interfemineo , se atão com as posteriores na parte ex-
ter-

terna, e anterior das coxas C. C. : 2.º de hum escapulario A. formado com hum tira de duas varas de comprido, pollegada e meia de largo, a qual, deitada pelos hombros, abraça as pontas do gualapo pela parte posterior, e anterior do corpo, para as atezar quanto for preciso.

N. 13. he hum suspenforio para o escroto, feito com hum tira transversal, que se ata ao redor do ventre C., e hum perpendicular furada no lugar A., para dar sahida ao genital, cujas pontas, passando por baixo do escroto, a do lado direito para o esquerdo, e a do esquerdo para o direito B., levantão o mesmo escroto, e se prendem á tira transversal.

N. 14. mostra hum ligadura contentiva, chamada trochanter dobrado, a qual se faz com hum atadura de quatro varas de comprido, duas pollegadas de largo, enrolada em dous globos, pondo-se o meio na parte anterior do ventre A.; e levando-se os globos a cruzar nas costas, se trazem acima dos pubis B., onde cruzão,

zão, e vão pela parte anterior, e externa das coxas C. C. á parte posterior, para cruzarem no interfemineo D., e subirem pelas virilhas outra vez aos lombos, fazendo-se deste modo as voltas, que forem precisas, e acabando por algumas circulares ao redor do ventre.

N. 15. representa a ligadura de Monro, empregada na paracentesis do ventre. B. he a faxa do ventre apertada por quatro fivelas, e pontas postas em iguaes distancias: A. escapulario, que prende a faxa anterior, e posteriormente, para não descer: D. duas tiras, que vão pelo interfemineo a prender-se na faxa pela parte das costas E. E.: B. C. huma abertura, por onde se faz a operação. Esta ligadura, inventada para fazer a compressão no tempo, e depois da operação, he mui complicada, pouco efficaz, e suppre-se muito bem com huma faxa de baeta, que dê quatro, ou cinco voltas ao redor do ventre.

E S T A M P A X I.

Esta Estampa faz ver as ligaduras, que se praticão nas extremidades superiores destinadas a differentes usos , particularmente ás deslocações , e fracturas.

N. 1. mostra a ligadura chamada espiga ascendente , que serve para as deslocações da cabeça do humero , e se faz com hum atadura de dez varas de comprimento , duas pollegadas de largo , enrolada em hum globo. A sua applicação, depois de situados os outros appositos, que vem a ser alguns gualapos , que cubrão o terço superior do braço , e parte da espadoa , consiste em pôr o extremo da atadura na axilla opposta , e trazer o globo pelas costas a ganhar a parte superior do hombro, donde desce á axilla pela parte anterior , para fazer hum volta D. ao redor do braço, feita a qual, sóbe obliquamente de fóra para dentro , e vai pela parte anterior do peito outra vez á axilla opposta , donde torna pelas costas

acima do hombro enfermo a cruzar com o rodeio antecedente, dando-se assim quatro, ou sinco voltas, que descrevem a espiga C. , acabando por huma volta na parte mais alta do peito A. , e passando pela axilla opposta, vem a finalizar em algumas circulares B. ao redor do peito.

N. 2. mostra huma ligadura circular feita com huma atadura de tres quartas de comprido, pollegada e meia de largo, a qual serve para conter os appositos, que se empregão na cura das fontes, ou casos semelhantes, cahindo as voltas humas em cima das outras.

N. 3. faz ver huma ligadura empregada nas fracturas simples do braço, a qual se pratica com huma atadura enrolada ao redor do mesmo braço em grandes espiraes feitas em cima da pelle, ou sobre alguns gualapos, que a precedem, sobre cujas voltas assentão os chumaços compridos, que servem de forro ás talas, cuja applicação se mostra n.º 4.

N. 4. mostra as talas conservadas nos

seus lugares por meio de tres fittas , cujos nós de laçada devem assentar sobre a tala externa.

N. 5. representa huma ligadura contentiva , feita com huma atadura de duas , ou tres varas de comprido , duas pollegadas de largo , enrolada em hum globo , cujas voltas se dão em pequenas espiraes.

N. 6. he a mesma ligadura , só com a differença das voltas se tocarem pelas margens. Tanto huma , como outra destas ligaduras podem servir em lugar de gualapos nos casos de fracturas simples , repetindo-se as voltas humas em cima das outras as vezes precisas , para offerecerem huma cama suave ás talas , e mais appositos , que vão por cima. Mas como estas ligaduras aconselhadas por alguns praticos tem o inconveniente de muitas voltas , que se não podem desfinchar tão facilmente como as dos gualapos , sem se bullir muito com o braço , tem sido geralmente rejeitadas , e só as praticaremos como contentivas nos casos de chagas , ou feridas.

N.

N. 7. mostra as talas empregadas nas fracturas do braço , situadas nos seus lugares , e sustidas com voltas espiraes em lugar das fittas n.º 4. , prevenção mui util quando os enfermos são muito inquietos , ou crianças faltas de razão para conhecerem o muito , que convem a quietação.

N. 8. faz ver outra ligadura contentiva feita com quatro , ou cinco voltas de huma circular.

N. 9. mostra duas , ou tres voltas de circular dadas humas em cima das outras , a qual alguns praticos aconselhão nos casos das fracturas simples do ante-braço , antes de se applicarem os gualapos , ou outros quaesquer appositos.

N. 10. mostra as voltas de circular , que rodeão o ante-braço fracturado , as quaes fazem as vezes de gualapos , para sobre ellas assentarem os chumaços compridos , que servem de forro ás talas , como se vê n.º 14.

N. 11. faz ver huma ligadura contentiva , que se faz na flexura com huma

circular , que descreve espiraes de baixo para cima , e serve de conter appositos , ou medicamentos naquelle lugar.

N. 12. faz ver huma ligadura compressiva , praticada no ante-braço com huma atadura de seis varas de comprido , pollegada e meia de largo , enrolada em hum globo , a qual faz espiraes de cima para baixo , e depois de baixo para cima , cuja ligadura póde tambem servir em lugar de gualapos nos casos de fracturas simples.

N. 13. mostra huma ligadura contentiva feita com huma atadura de tres varas de comprido , pollegada e meia de largo , enrolada em hum globo , com a qual se fazem espiraes medianas desde o punho até á flexura.

N. 14. faz ver a ligadura , que se pratica nas fracturas simples do ante-braço , constando de circulares espiraes , e chumaços compridos n.º 10. , sobre os quaes assentão as talas sustidas com tres fittas.

N. 15. mostra huma ligadura compressiva, que serve nas distensões da junta do punho com o ante-braço, depois de situados os gualapos embebidos nos remédios convenientes.

N. 16. mostra a ligadura compressiva, que se faz sobre os aneurismas, ou picadas da arteria brachial, constando 1.º dos chumaços graduados, 2.º de hum chumaço comprido, que se situa ao longo do caminho da arteria, 3.º de huma atadura de tres varas de comprido, pollegada e meia de largo, enrolada em hum globo, com a qual se fazem duas circulares ao redor da parte superior do ante-braço; e levando-se obliquamente para cima sobre a flexura, vai fazer hum rodeio á parte inferior do braço, donde torna a descer ao ante-braço, cruzando com a volta antecedente na flexura, e descrevendo huma cruz, ou X. Deste modo se fazem quatro, ou cinco voltas, e se acaba por tres, ou quatro circulares ao redor da parte inferior do braço.

N. 17. mostra huma ligadura chamada espiga do punho, ligadura recommendada nas deslocções do mesmo punho com o ante-braço, a qual consta 1.º de chumaços accommodados ás costas, e palma da mão, os quaes se devem estender até ao terço inferior do ante-braço, 2.º de huma tira de panno, com a qual se fazem algumas voltas ao redor do punho, e ante-braço, 3.º de huma atadura de quatro varas de comprido, pollegada e meia de largo, enrolada em hum globo, cuja applicação consiste em fazer duas voltas iguaes ao redor do ante-braço, e trazer-se o globo obliquamente pelas costas da mão a passar entre o dedo pollegar, e indicador, donde atravessa a palma da mão da parte anterior á posterior; e subindo outra vez pelas costas, cruza com a volta antecedente, e vai fazer hum rodeio á parte inferior do ante-braço para tornar a fazer quatro, ou cinco voltas do mesmo modo, e descrever a espiga, acabando por duas, ou tres circulares ao redor do

ante-braço. Esta ligadura serve tambem nas feridas transversas da parte inferior, e externa do ante-braço, e costas da mão, particularmente achando-se os tendões cortados. E sendo a ferida na face interna destas partes, convem fazer huma semelhante ligadura, porém opposta, isto he, ficando a espiga na parte interna do punho, e ante-braço. A figura immediata faz ver a mesma ligadura, mas applicada ao dedo pollegar, ficando a espiga na base deste dedo, para o que se farão as voltas em torno d'elle de dentro para fóra, e serve nas deslocações dos ossos, que o compõe, e nas feridas dos seus extensores.

N. 18. representa a ligadura da sangria na flexura, a qual se faz dando duas, ou tres voltas ao redor da parte superior do ante-braço, e inferior do braço, cruzando na flexura, e atando-se os extremos na parte externa, cuja ligadura precisa de huma tira de tres quartas de comprimento, e pollegada e meia de largo.

N. 19. mostra huma ligadura contentiva praticada em differentes molestias, que atação a junta do braço, e ante-braço, cujo cruzamento se póde fazer em qualquer ponto da circumferencia da dita junta.

N. 20. representa huma ligadura chamada meia luva, empregada nas deslocacões das phalanges dos dedos, ou em conter appositos, e remedios nestas partes. Pratica-se com huma atadura de cinco varas de comprido, huma pollegada de largo, enrolada em hum globo, fazendo-se duas voltas ao redor do punho, e trazendo-se o globo a fazer espiraes ao redor dos dedos de modo, que as voltas cruzem humas com as outras na base dos mesmos dedos. Feito isto, dão-se algumas voltas espiraes ao redor da mão, acabando por duas, ou tres circulares ao redor do punho.

N. 21. faz ver a ligadura chamada luva inteira, a qual tem lugar quando he preciso cubrir os dedos em toda a sua

ex-

extensão, e se pratica com huma atadura de oito varas de comprido, huma pollegada de largo, enrolada em hum globo, dando-se duas voltas ao redor do punho, e levando-se obliquamente até á cabeça do dedo minimo, donde deverá fazer espiraes medianas até á base deste dedo, para dalli subir outra vez ao punho, e baixar a fazer as mesmas voltas ao dedo annular, e a todos os mais, se for preciso, seguindo-se tres voltas espiraes ao redor da mão, e acabando-se por cubrir o dedo pollegar do mesmo modo, e segurar o resto da atadura por duas, ou tres circulares ao redor do punho.

N. 22. mostra o gualapo de dezoito pontas, applicado ao braço, cujo gualapo se deve preferir a todas as ligaduras, que se praticão nos casos de fracturas do braço, e ante-braço, e muito particularmente nas complicadas; porque se podem curar as feridas, e chagas ao través de huma abertura, que faremos cortando as pontas do gualapo, que assentarem sobre

a offensa , cuja abertura se cobre com hum chumaço depois de feita a cura , e applicadas as talas. E sendo indispensavel humma tala no lugar da abertura , se segurarà com fittas distinctas das que atão as outras , para se poder tirar quando se faz a cura , sem se desmanchar o resto do apparelho.

N. 23. representa a capelina do cotovelo , ligadura aconselhada nas deslocções da junta do braço com o ante-braço , a qual se faz com humma atadura de seis varas de comprimento , pollegada e meia de largo , enrolada em hum globo. A sua applicação sobre os appositos competentes consiste em dar duas voltas iguaes ao redor da parte inferior do braço , e trazer o globo por cima do cotovelo para fazer finco , ou seis espiraes alternativamente para cima , e para baixo do mesmo cotovelo , acabando por algumas circulares ao redor do ante-braço.

N. 24. mostra as figuras das talas , chumaços compridos , fittas , e ataduras ,
que

que servem para as ligaduras , que praticamos nas extremidades superiores.

E S T A M P A XII.

Nesta Estampa se achão gravadas muitas das ligaduras , que se praticão nas extremidades inferiores para differentes usos , a que são destinadas , como se vai a mostrar.

N. 1. faz ver huma ligadura contentiva , que se faz com huma atadura de quatro varas de comprimento , duas pollegadas de largo , enrolada em hum globo , dando-se voltas espiraes ao redor da coxa de baixo para cima , e acabando-se com algumas circulares ao redor do ventre. Além desta ligadura praticada na coxa esquerda , mostra-se outra na direita , que consiste em duas , ou tres circulares humas em cima das outras , da qual usão alguns praticos nas fracturas simples para maior segurança , como primeiro apposito.

N. 2. mostra as voltas espiraes dadas ao redor das coxas fracturadas , ligaduras ,

sobre as quaes se applicão os chumaços compridos, que servem de forro ás talas, e que alguns preferem aos gualapos, mas sem razão ; porque são mui incommodas na sua applicação , e muito mais se he preciso desfazellas. Todavia os que se quizerem servir dellas , as poderão fazer com pedaços de ataduras do comprimento de duas, ou tres varas, enroladas em hum globo, e tantas, quantas forem precisas para cubrirem as coxas , e fazerem huma camada de panno, sobre a qual persistão os outros appósitos sem magoarem a pelle.

N. 3. faz ver as mesmas ligaduras com as talas applicadas , e sustidas com huma atadura , a qual principia a fazer espiraes na parte inferior , e vai subindo até cubrir toda a extensão das talas, acabando por algumas circulares ao redor do ventre.

N. 4. mostra duas, ou tres voltas de circular dadas ao redor da perna , quando alguns dos ossos se acha fracturado , e a fractura he simples. N.

N. 5. he huma ligadura contentiva, que se faz na parte superior da perna com huma atadura de duas varas de comprido, pollegada e meia de largo, enrolada em hum globo. A sua applicação consiste em fazer espiraes de cima para baixo, acabando por duas, ou tres circulares.

N. 6. faz ver a ligadura, de que usão alguns nas fracturas simples da perna, feita com huma, ou mais ataduras, enroladas em hum globo, e dando-se com ellas voltas espiraes de baixo para cima, e de cima para baixo, até se fazer huma camada macia, sobre a qual assentão os outros appositos.

N. 7. mostra a mesma ligadura, sobre a qual estão situados os chumaços compridos, que servem de forro ás talas.

N. 8. he a mesma ligadura com as talas applicadas, e sustidas com huma atadura do comprimento de quatro, ou cinco varas, largura de pollegada e meia, enrolada em hum globo, com a qual se fazem espiraes de baixo para cima, cubrindo as talas em toda a sua extensão. N.

N. 9. faz ver huma ligadura unitiva para a fractura longitudinal da rodéla , praticada com huma atadura de quatro varas de comprido , duas po'legadas de largo , enrolada em dous globos , passando hum sobre a rodéla por huma fenda praticada no meio da atadura , e fazendo-se assim tantas voltas , quantas bastarem para aproximar as porções separadas , acabando por circulares na parte inferior da coxa , e superior da perna.

N. 10. he huma ligadura contentiva , chamada espiga do joelho , a qual se pratica nas deslocações da rodéla , e se faz com huma atadura de quatro varas de comprido , duas pollegadas de largo , enrolada em hum globo , dando-se voltas espiraes do centro para fóra , as quaes , cruzando na curva da perna , vão por cima e por baixo do joelho descrevendo duas espigas nas partes lateraes.

N. 11. he huma ligadura contentiva , chamada capelina do joelho , a qual se faz com huma atadura de seis varas de
com-

comprido, duas pollegadas de largo, enrolada em dous globos, dos quaes o maior faz circulares na parte inferior da coxa, e superior da perna, e o menor cobre o joelho, fazendo-se inversões de cima para baixo, e de baixo para cima, sujeitas com as voltas, que dá o globo maior, acabando-se por duas circulares iguaes feitas por cima, e por baixo do joelho. Esta ligadura póde tambem servir nas fracturas transverfaes da rodéla; porém não he das melhores, em razão das inversões magoarem muito a pelle.

N. 12. faz ver a ligadura compressiva, que se faz sobre os aneurismas da poplitea, com hum atadura de quatro varas de comprimento, duas pollegadas de largo, enrolada em hum globo, da qual, posto o extremo sobre os chumaços graduados, que comprimem o tumor, se leva o globo a fazer tres, ou quatro espiraes por baixo, e por cima do joelho, até se acabar a atadura.

N. 13. mostra hum ligadura, que se

se pratica nas fracturas transversaes da rodéla, a qual se compõe 1.º de alguns gualapos postos ao redor da junta da perna com a coxa, cubrindo tambem a rodéla, depois de aproximadas as suas porções divididas, e relaxados os musculos por meio da maior extensão da perna, e alguma flexão da coxa: 2.º de dous chumaços semilunares situados pela parte superior, e inferior da rodéla: 3.º de hum gualapo de quatro pontas, e furado no meio n.º 17., cujo buraco ajustado á mesma rodéla, ficão duas pontas para cima, e duas para baixo: 4.º de huma atadura de quatro, ou cinco varas de comprido, duas pollegadas de largo, enrolada em dous globos, cujo meio applicado na parte anterior, e inferior da coxa, se levão os globos a cruzar na curva, para dalli virem cruzar na parte anterior, e superior da perna, donde tornão á curva, para irem á parte anterior, e inferior da coxa, continuando deste modo tres, ou quatro rodaios, e acabando cada globo por duas

cir-

circulares iguaes acima , e abaixo do joelho. Tambem se póde fazer esta ligadura com a atadura enrolada em hum só globo , e fazendo-se com ella circulares por cima , e por baixo do joelho. Applicada assim esta atadura , atão-se as pontas do gualapo as de cima com as de baixo , a fim de aproximarem as voltas circulares dadas por cima , e por baixo do joelho humas ás outras. Esta ligadura junta com a situação , em que a perna deve ficar por trinta , ou quarenta dias , que deve ser na maior extensão possível , atalha , como eu mesmo tenho observado , todos os defeitos , que podem resultar da fractura transversal da rodéla , quando for ligada de outra maneira. Alguns praticos conservão a perna na extensão por meio das talas n.º 18. , e ligaduras ; mas estas são muito incommodas , e basta situar a perna , e seguralla sobre travesseiros. Cumpre notar-se , que se deve mover a rodéla sobre a sua junta de quando em quando , para se não colar aos condylos do femur.

N. 14. faz ver huma ligadura chamada X do joelho , a qual serve nas fracturas obliquas da rodéla , e se faz com huma atadura de sinco varas de comprido , duas pollegadas de largo , enrolada em dous globos , cujo meio applicado na curva , se trazem os globos hum por cima , outro por baixo do mesmo joelho a cruzar sobre a rodéla quatro , ou sinco vezes , acabando por circulares na parte inferior da coxa , e superior da perna. Esta ligadura não he com tudo tão efficaz como a antecedente n.º 13.

N. 15. mostra o gualapo de dezoito pontas , que devemos preferir a todas as ligaduras praticadas nas fracturas simples , e complicadas de coxa , e perna , pelas razões apontadas no n.º 22. Estampa XI.

N. 16. faz ver a ligadura chamada espiga ascendente , que serve nas deslocações da cabeça do femur , e fracturas do seu pescoço , a qual se faz com huma atadura de dez varas de comprido , duas pollegadas de largo , enrolada em hum glo-

globo , fazendo-se duas circulares ao redor do ventre , e trazendo-se o globo pela parte anterior da coxa a fazer hum rodeio , depois do qual sóbe obliquamente para cima a cruzar com a volta antecedente , e a buscar as costas pelo lado doente , para dalli tornar a fazer do mesmo modo fino , ou seis voltas , que descrevem a espiga ascendente , finalizando por duas , ou tres circulares ao redor do ventre.

N. 17. mostra o gualapo de quatro pontas , e furado , que serve na fractura da rodéla.

N. 18. faz ver o mesmo gualapo applicado , e os chumaços semilunares , assim como tambem huma tala , com que alguns praticos conservavão a perna em extensão.

N. 19. mostra huma ligadura , que serve para a sangria feita sobre o tornozelo interno , chamada estribo , a qual se faz com huma atadura de tres quartas de comprimento , pollegada e meia de largo ,

enrolada em hum globo , cujo extremo applicado sobre o chumaço com hum bocado pendente sobre o calcanhar , vai o mesmo globo fazer hum rodeio á parte inferior da perna , da parte anterior para a posterior , até chegar sobre o calcanhar , donde vai á planta do pé , passando por cima do extremo pendente , e continúa a fazer circulares ao redor do pé , até se acabar , e se atar o ultimo extremo com o primeiro , o qual do calcanhar vem ao peito do pé por meio de huma inversão , a qual firma a volta , que passa sobre o calcanhar. Esta ligadura he pela sua firmeza mui util , particularmente nas crianças , e nas pessoas delirantes.

N. 20. faz ver huma ligadura contentiva chamada xadrez , ou calçado do Anjo , a qual se faz com huma atadura de tres varas de comprido , pollegada e meia de largo , enrolada em hum globo , dando-se duas circulares ao redor do peito do pé , e fazendo-se rampantes pela perna acima , até perto do joelho , donde ,

de, feitas duas circulares, se continuão a fazer rampantes de cima para baixo, as quaes cruzão com as voltas antecedentes, e se finaliza por duas circulares ao redor do peito do pé, pregando-se o extremo com alfinetes, ou atando-se com o primeiro por cima do calcanhar.

N. 21. mostra a ligadura chamada espiga do peito do pé, empregada nas deslocações da junta do pé com a perna, a qual se faz com huma atadura de quatro varas de comprido, pollegada e meia de largo, enrolada em hum globo, dando-se duas circulares ao redor do peito do pé, e levando-se o globo de dentro para fóra, e de baixo para cima, a fazer hum rodeio pela parte posterior da perna, donde se traz a cruzar com a volta antecedente, e a ganhar a planta do pé pela parte externa, para dalli continuar quatro, ou cinco voltas semelhantes, que descrevem a espiga no peito do pé, e parte anterior e inferior da perna, acabando-se por duas circulares ao redor da perna.

N. 22. 24. e 25. mostram as ligaduras, que se empregão na ruptura do tendão d'Achilles ; mas pouco efficazes , e mui bem suppridas pela chinéla de Petit.

N. 23. mostra huma ligadura compressiva , que se pratica nas inchações soffradas das extremidades inferiores , e se faz com huma atadura de quatro , ou cinco varas de comprido , pollegada e meia de largo , enrolada em hum globo , dando-se voltas espiraes medianas desde a ponta do pé até ao joelho , ou mais acima , se he preciso. Esta ligadura he muito mais util fazendo-se com huma atadura de baeta , se esta não excitar muito calor.

E S T A M P A XIII.

Nesta Estampa se mostram

N. 1. a situação , que Pott recommenda nas fracturas da coxa , ou da perna , com o joelho dobrado B , e a extremidade inferior descansando sobre dous travesseiros A A. , cuja situação permite ao enfermo jazer de lado , e por tanto repu-

tada pelo Author como mais commoda , e até mais util para se conseguir a união dos ossos. C C. fazem ver as ligaduras chamadas espigas , feitas com huma circular sobre as talas , e os outros appositos. Todavia a experiencia mostra , que tal situação he muito mais incommoda , e que poucos enfermos a podem supportar tantos dias , quantos são precisos para se firmar a união dos ossos.

N. 2. mostra huma das melhores máquinas , que se tem inventado para apoio das pernas quebradas , a qual consta 1.º de huma caixa , ou peça superior , cujo assento , ou fundo he feito de tiras de panno , ou fittas largas situadas dous , ou tres dedos longe humas das outras : 2.º de huma peça mediana , sobre a qual se levanta , e abaixa a primeira peça , ou caixa : 3.º de huma peça inferior , sobre a qual se levanta , e abaixa a peça mediana por meio de huma grade. A he hum estribo , que por meio de hum parafuso , mettido em algum dos buracos B B , se aproxima á plan-

planta do pé. C he huma manivella, que por meio do dente I. levanta mais ou menos a peça superior da máquina, dobrando pelos eixos F G. E E E são tres corréas, que se prendem a hum lado da caixa, e vão affivelar no opposto, para segurarem a perna na situação, que lhe convem. H H mostram a peça inferior da máquina, que assenta em cima da cama, entre a qual e a peça mediana ha huma grade D, que levanta as duas peças superiores, quanto se deseja. Posto que esta máquina seja huma das mais bem imaginadas; com tudo de nada serve, assim como todas as que encontramos estampadas, e descriptas nas Obras de muitos Authores, sendo muito melhor encosto para as pernas quebradas os rolos de palha embrulhados em hum lençol, e atados por meio de fittas, em razão da sua brandura, e facilidade, com que se podem haver.

N. 3. faz ver o apparelho empregado na ruptura do tendão d'Achilles, com

a chinéla de Petit. A. mostra algumas voltas de circular dadas sobre chumaços , e sobre estas huma corrêa com fivela , a qual se aperta por cima do joelho : B. huma fivela , que aperta a corrêa , que vem do salto da chinéla D. a prender-se na primeira corrêa , que rodea a parte inferior da coxa : C. as voltas de circular, que contém os chumaços situados aos lados do dito tendão , para o conservarem na sua propria situação.

N. 4. e 5. mostram duas talas de páo , as quaes juntas , e seguras pelas duas corrêas , fórmão huma bóta , na qual se encerra a perna depois de applicados os appósitos , sahindo os tornozelos pelos buracos feitos na sua parte inferior. Estas talas tem a vantagem de conservar as pernas entaladas com mais segurança do que todas as outras , e nas situações , que forem mais commodas aos enfermos ; porém fazem compressões mui desagradaveis , e excitão estímulos seguidos muitas vezes de inflammações , suppurações, e gangrena.

N. 6. 7. 8. e 9. mostram diferentes figuras de talas feitas de taboinhas delgadas , rachadas pelo comprimento em muitas peças estreitas , conservadas em situação por hum forro de pellica colado a ellas. Estas talas , que se segurão por fitas passadas ao través de fendas praticadas nas suas partes superiores , e inferiores , são as melhores , e mais commodas , que até ao presente se tem inventado , e preferíveis ás de lata , e outras materias , de que se tem servido os praticos.

C A P I T U L O VI.

Das deslocações em geral.

§. XCVI.

CHama-se deslocação a sahida do extremo de hum , ou mais ossos do seu lugar natural , e póde ser completa , incompleta , simples , complicada , recente , ou antiga.

§. XCVII.

A completa consiste na total sahida do extremo de hum osso do seu lugar natural para outro differente, como a sahida da cabeça do humero da cavidade glenoidea para a cova do braço.

§. XCVIII.

A incompleta, chamada tambem torcedura, consiste na sahida parcial do extremo de hum osso do seu proprio lugar, como quando o condylo interno do femur vai occupar a fossa externa da tibia, &c.

§. XCIX.

A simples he aquella, que, ou seja completa, ou incompleta, he livre de qualquer outro damno, excepto o da sahida total, ou parcial do extremo do osso da sua propria situação.

§. C.

A complicada he toda a deslocação

acompanhada d'outra molestia, como ferida, fractura, chaga, inchação, inflamação, dores grandes, paralyfia, vigilia, febre, convulsões, &c.

Causas.

§. CI.

As causas das deslocações ou são internas, ou externas. As internas são 1.^o convulsões, com as quaes se agitam os musculos de modo, que fazem saltar os ossos fóra dos seus lugares: 2.^o a fraqueza, ou paralyfia dos mesmos musculos, e ligamentos, os quaes dão lugar a que o pezo de hum membro desloque o osso, que mais supportar o dito pezo: 3.^o as collecções de synovia, as quaes dilatando, e amollecendo os ligamentos, dão lugar á sahida do osso do seu lugar: 4.^o finalmente a inchação das extremidades articulares, com a qual se engrossão as cabeças, e se enchem as fôssas ao ponto de não poderem permanecer encontradas. As causas

fas externas são todo o esforço violento, que podem soffrer as juntas, como puções, pancadas, quédas, saltos, &c.

Sinaes.

§. CII.

Os sinaes das deslocações são 1.º dores, e falta de movimentos: 2.º mudança na figura da junta em consequencia de alguma violencia, ficando huma elevação no lugar, onde existe o extremo do osso deslocado, e huma cova, ou falta no lugar, que este deixára: 3.º alteração nas dimensões do membro, ficando humas vezes mais curto, outras mais comprido, segundo a estrutura da junta, e a causa, que produzíra a deslocação: 4.º finalmente huma certa postura do membro, da qual não pôde fahir sem muito incommodo, e dores. Quando a deslocação for incompleta, as dores, e falta de movimentos serão maiores, o membro ordinariamente mais comprido, e a parte pouco des-

desfigurada , mas percebendo-se alguma elevação para hum parte , e alguma falta na opposta. Se a deslocação vier por causa de fraqueza , ou paralyfia dos ligamentos , e musculos , será a junta mui move-dição , e se achará hum espaço maior , ou menor entre as peças articuladas.

A deslocação causada pelo ajuntamento de liquidos na articulação , ou inchação dos extremos articulados , conhece-se facilmente pela mudança , que estas causas produzem na articulação , pela falta de movimentos , e pela dureza , ou fluctuação , que achamos na parte enferma. Podemos ajuntar a estes sinaes os accidentes , que algumas vezes acompanhão , ou sobrevem ás deslocações , como dores grandes , inchação , inflammation , convulsões , vigílias , paralyfias , gangrena , diminuição de movimentos , ou perda total , anchyloses , suppurações , carias , &c.

Prognostico.

§. CIII.

O prognostico das deslocções he relativo 1.º á sua antiguidade ; porque as recentes são mais faceis de remediar , do que as antigas : 2.º á causa de junta ; porque as peças articuladas por ginglymo , são mais difficultosas de reduzir , quando se deslocção , do que as articuladas por enarthroses , ou arthrodia : 3.º á especie de deslocção ; porque a incompleta he mais facil de reduzir , do que a completa : 4.º ás causas ; porque as que vem por violencias externas , e convulsões , curão-se mais facilmente , do que as que vem pelas outras causas internas , isto he , por paralyfias , fraquezas de musculos , e ligamentos , collecções de humores nas juntas , ou inchações dos ossos , em razão da difficultade , que ha de se curarem estas molestias , de que as deslocções são effectos : 5.º ás complicações ; porque as

des-

deslocações acompanhadas de feridas , fracturas , inchações , ou outra qualquer indisposição , são mui difficultosas de reduzir , e de curar , por se apresentarem indicações differentes , que algumas vezes pedem soccorros oppostos aos que convem ás deslocações : 6.º a idade , e sexo ; porque nas primeiras idades , e nas mulheres são mais faceis as reducções , e a restauração dos movimentos das juntas , do que nos velhos , e gentes robustas : 7.º á quantidade de musculos , que rodeão a junta ; porque sendo muitos , ou de muita força , he mais difficultosa a reducção : 8.º finalmente ao estado morbozo , ou fadio da constituição ; porque quanto melhor faude gozar o fugeito , mais feliz será o resultado da reposição dos ossos nos seus lugares.

Cura.

§. CIV.

Toda a deslocação apresenta tres indicações a encher , que são a reposição
do

do osso no seu lugar natural , a sua conservação em quanto se vigorão as partes molles, e a correcção, ou prevenção dos accidentes , que existem , ou podem sobrevir.

Primeira indicação.

§. CV.

A primeira indicação enche-se pondo-se o osso no seu lugar , o que se faz 1.º situando o enfermo como for conveniente assentado em huma cadeira, deitado na cama , em cima de huma meza , no pavimento, ou de qualquer modo, que o Cirurgião julgar conveniente: 2.º fazendo as extensões , e contra-extensões precisas (a) , até que o extremo deslocado vença a altura da cavidade , de que sahíra, para ser conduzido ao seu lugar , cu-

Tom. IV.

Ll

jas

(a) Chama-se extensão , fallando-se de fracturas, e deslocações, estirar os membros, puxando-os pelos extremos; e contra-extensão, puxallos em sentido opposto, ou firmar a parte do corpo, a que elles se pégão, de modo que não venha apòs as extensões, que se fazem.

jas extensões , e contra-extensões faz o operador com as duas mãos pegando no membro por cima , e por baixo da deslocação , e puxando em sentidos oppostos o que for bastante para igualar extremo com extremo , e repôr o osso deslocado. Quando as forças do operador não bastão , serão a extensão , e contra-extensão feitas por ajudantes , que , puxando com as mãos , ou ataduras enlaçadas nos lugares convenientes , igualemente os extremos , para o operador os conduzir aos seus lugares (a). Como os musculos contrahidos

(a) Tem-se inventado muitas maquinas para se fazer a extensão , e contra-extensão , como se pôde ver nas Obras de Oribase , de Pareo , de Hildano , de Sculteto , de Petit , de Ravaton , de Heister , &c. , e tem vogado muito o ambi , o banco , e glosfocomo de Hippocrates , a máquina de Michault , a de Petit , o reductor de Ravaton , a máquina de Freke , e outras : porém , a pezar dos louvores , que se tem dado em diferentes tempos a muitas destas máquinas , eu as julgo desnecessarias , e mesmo prejudiciaes , em razão das grandes pizaduras , que causão , e do embaraço , que offerecem á reducção dos ossos , além de estirarem muito as partes molles , e de as lacerarem , ou arrancarem algumas vezes.

dos offerecem muita resistencia ás extensões, e contra-extensões, cumpre deitar os laços em partes, onde os musculos, que devem ceder, não sejam affogados pelo aperto dos ditos laços, os quaes devem além disto assentar sobre chumaços, para não magoarem tanto a pelle. A melhor contra-extensão, que se póde fazer, consiste em fixar o corpo, e parte deslocada a alguma cousa firme, por meio de ligaduras; porque deste modo não vem o corpo apôs as extensões, que então se empregão todas em vencer a contracção dos musculos: 3.º conduzindo o osso ao seu lugar depois de feitas as sufficientes, e graduadas extensões, isto he, depois de se acharem parallellos os extremos deslocados, o que o operador fará encaminhando com os dedos ao seu lugar o extremo deslocado pelo mesmo caminho, por que sahíra. He muito preciso buscar-se este caminho, ainda que não seja o mais breve; porque he por elle que se achão ordinariamente rotos os ligamen-

tos (*a*) , e a entrada mais desembaraçada (*b*) : 4.^o deixando ir o osso vagarosamente ao seu lugar , para evitar a pizadura dos ligamentos , e outras partes molles , da qual se podem seguir dores , inflammações , e outros symptomas temiveis. Hum estalo , que algumas vezes se ouve , a diminuição de dores , e a figura natural da parte , são os sinaes mais certos de se achar o osso no seu lugar.

Muitas vezes não podemos reduzir os ossos deslocados sem empregarmos certos meios , que dispõem para a locação , como 1.^o sangrar , adietar , e usar dos antiphlogísticos constitucionaes , e topicos , se a inchação , e inflammção tiverem augment-

(*a*) Eu digo ordinariamente , porque nas deslocações causadas por molestias das juntas , e nas incompletas , distendem-se os ligamentos sem se romperem , ao contrario do que succede nas deslocações completas causadas por grandes violencias.

(*b*) O conhecimento da structura da articulação , e partes , que a rodeão , nos mostra ordinariamente os lugares , por onde os ossos se deslocão , e por onde devem ser locados.

gmentado tanto , que impedão a redução : 2.º applicar emollientes , e tonicos , para resolver congestões : 3.º animar , ou vigorar os musculos , e ligamentos relaxados , ou paralicados , com os remedios espirituosos , e tonicos : 4.º curar certas molestias , que são causa da deslocação , como ajuntamentos de synovia , paralyfias , exostoses , &c. : 5.º finalmente remediar as fracturas , que se complicão com a deslocação. (a)

Segunda indicação.

§. CVI.

A segunda indicação , isto he , conservar os ossos nos seus lugares , enche-se por meio de ligaduras , e situação. As ligas-

(a) Mui poucas vezes podemos repôr no seu lugar hum extremo deslocado , quando o osso , que lhe pertence , se acha tambem fracturado ; porque se perdem as extensões , e contra-extensões no lugar da fractura ; e em taes casos cumpre tratar primeiro da fractura , para que , depois desta curada , e o osso unido firmemente , se loque o extremo deslocado.

gaduras consistem na applicação de alguns gualapos, ou chumaços molhados em agua ardente (*a*), ou cozimentos apropriados ao estado da parte, como emollientes, tonicos, &c., e algumas voltas de atadura moderadamente apertadas, e dadas segundo os preceitos apontados no Capitulo das ligaduras. A conservação, e aperto das ligaduras devem ser relativos ás causas, antiguidade das deslocações, e robustez dos musculos; porque nas constituições debeis, cujos musculos são fracos, nas deslocações antigas, e nas que vem por causas internas, devem as ligaduras ser mais apertadas, e permanecer mais tempo. A situação assim do corpo, como da parte deslocada deve ser tal, que os musculos estejam relaxados (*b*), e a mesma

(*a*) Eu prefiro a agua ardente a todos os cozimentos, quando alguma indicação particular os não exige, em razão do aceio, e tambem porque fortifica mais as partes.

(*b*) O estado da relaxação dos musculos não consiste, como querem alguns, em se situar o membro na meia flexão, e extensão, na meia adducção,

ma parte não soffra esforços violentos , com os quaes se torne a deslocar o osso: pelo que nas deslocações das extremidades superiores , queixo , costélas , &c. , poderão os enfermos andar de pé , ou fazer assentados ; porém nas do espinhaço , cadeiras , e extremidades inferiores deverão estar na cama , com a parte em decanço , por meio de encoostos , o tempo que for preciso para se vigorarem os musculos , e ligamentos. Quando as articulações gozão de grandes movimentos , como as das extremidades , he preciso movellas brandamente de quando em quando , durante o uso das ligaduras , para se evitar a união das peças articuladas.

Ter-

e abducção , cuja situação será quasi sempre muito incommoda , e mesmo impraticavel ; mas consiste em se evitar que os musculos entrem em acção , o que se consegue facilmente pondo-se o membro em decanço por meio de encoostos , apoios , ou suspensorios ; porque deste modo não entrão os musculos em acção , seja qual for a situação da parte.

Terceira indicação.

§. CVII.

A terceira indicação enche-se remediando-se os accidentes presentes, e prevenindo-se os que podem sobrevir, o que se consegue communmente com remedios constitucionaes, e topicos relativos á casta de accidente, que existe, ou ha probabilidade de poder vir, como antiphlogisticos internos, e topicos, havendo diathesis phlogistica, tonicos espirituosos, e antiespasmoticos, havendo debilidade, congestões lentas, ou paralyfia, e finalmente com os remedios convenientes a cada molestia, que ataca as juntas, e he causa da deslocação.

C A P I T U L O VII.

Das deslocações em particular.

§. CVIII.

Da deslocação do queixo inferior.

O Queixo inferior em razão da estrutura das suas articulações com os temporaes, póde sómente deslocar-se para diante, e para baixo, isto he, podem os condylos sahir das fossas glenoideas para a parte anterior das apophyses transversas. Se a deslocação for só de hum lado, chama-se singela ; e se for de ambos, chama-se dobrada. Os bocejos, e movimentos convulsivos dos musculos, que movem o queixo, são as causas mais triviaes das suas deslocações (a) : com tudo as quédas, e pancadas recebidas

Tom. IV.

Mm

nes-

(a) Ha pessoas tão sujeitas a esta deslocação, que he preciso ampararem o queixo, quando bocejão, para se não deslocar.

nesto osso , produzem algumas vezes o mesmo effeito. Em consequencia da deslocação dobrada fica a boca aberta , e a ponta da barba descançando sobre o sternó , e em consequencia da singela fica a dita ponta inclinada para o lado opposto á deslocação , seguindo-se além disto dores , difficuldade de fallar , de engulir , e de conter a saliva. (a)

Para se locar o queixo inferior , fittua-se o paciente sentado em assento baixo com a cabeça encostada ao peito de hum ajudante , que a segura com as duas mãos postas por cima das orelhas. Feito isto , mette o operador os dous pollegares embrulhados em pannos na boca de modo , que as polpas fiquem sobre os dentes molares inferiores , e as palmas de ambas as mãos aos lados do queixo.

En-

(a) Hippocrates falla de muitos outros symptomas , que acompanhão esta deslocação , como vomitos , febre , inflammação , convulsões , lethargo , e a morte ao decimo dia , se se não repõe o osso : porém a experiencia mostra o contrario.

Então carregando com força directamente para baixo, e movendo o queixo brandamente para trás, os condylos escorregão facilmente para os seus lugares. Quando a deslocação for singela, applicará maior força no lado deslocado, e para este mesmo moverá com brandura o queixo. Acabada a reducção, que se conhece pelo estalo, ou estalos, pela figura natural da parte, falta de dores, e facilidade dos movimentos, se applicará o apposito, que consiste em chumaços, gualapos, e a ligadura chamada cabresto. (a)

Das deslocações da cabeça, e espinhaço.

§. CIX.

As articulações das vertebrae humas

Mm ii

com

(a) Eu não fallarei de muitos outros methodos de se praticar a reducção do queixo inferior; porque os julgo menos efficazes, e mais incommodos, nem tão pouco de certas prevenções para não serem mordidos os dedos na acção do osso ir ao seu lugar; porque basta não se deixar ir de repente, para se prevenir este inconveniente.

com outras , e com a cabeça pelos condylos do occipital , são taes , e tão prezas com ligamentos , e carnes , que rarissimas vezes permittem as deslocações destes ossos , particularmente completas , sem haver fracturas , e quando acontecem em consequencia de grandes violencias , como cahir de alto , ou receber o impulso de corpos pezados , ou movidos com grandes forças , são mortaes em breve tempo.

Na deslocação da cabeça , ou para melhor dizer das primeiras vertebrae do pescoço (*a*), fica a cabeça inclinada para diante , ou para o lado , e com a barba sobre o peito , seguindo-se mudança de figura no pescoço , perda de sentidos , e de sensibilidade , descarga involuntaria de fezes , e urina , e a morte , se os ossos

des-

(*a*) Eu creio que a maior parte dos praticos tem tomado as deslocações das primeiras vertebrae do pescoço entre si (que são mais facéis) por deslocações da cabeça ; porque parece impossivel deslocar-se o occipital , e viver o enfermo algum tempo , em razão da desordem , que soffre precisamente a medulla oblongada.

deslocados se não repõem com toda a brevidade possível.

Para se locarem a cabeça , ou primeiras vertebrae , se fará assentar o enfermo no pavimento , e seguro por ajudantes , que lhe carregão nos hombros , applica o operador , situado por detrás do paciente , as duas mãos aos lados da cabeça , e a levanta directamente para cima com brandura , ou movendo-a para os lados , até se completar a reducção , que se conhece pelo estalo maior , ou menor , que se sente , e pela restauração gradual das funções perdidas. Postos os ossos no seu lugar , se pratica a ligadura conveniente , e se ordenão a dieta , sangrias , e mais remedios precisos , segundo as indicações , que se apresentarem.

De todas as restantes vertebrae as mais facéis a deslocar-se são as lombares , depois as cervicaes , e mui poucas vezes as dorsaes , pela razão de se deitarem as suas apophyses espinhosas humas sobre as outras , e as costélas , que se articulão pe-
los

los seus lados , lhes servirem de apoio. Quando as vertebrae se chegam a deslocar pelos seus corpos , de nada valem os soccorros cirurgicos ; porque os pacientes morrem em breves minutos : porém quando se deslocação só por huma , ou ambas as apophyses obliquas , algumas vezes se reduzem , e os enfermos se restabelecem dos symptomas , que se seguem a estas deslocações , os quaes são dores grandes no lugar deslocado , paralyfia total , ou parcial de todas as partes , que ficam para baixo da deslocação , cuja paralyfia he tanto mais perigosa , quanto a offensa he alta , retenção de fezes , e urinas nos primeiros dias , e depois descargas involuntarias destes excretos , e finalmente a gangrena , que algumas vezes vem aos lugares , que soffrem compressões , como espinhaço , nadegas , extremidades inferiores , &c. Além destes symptomas acha-se o espinhaço torto , curvando-se humas vezes para diante , outras para os lados , e muito desigual no lugar da deslocação ,

cu-

cuja desigualdade he maior , ou menor conforme o numero das vertebrae deslocadas. Se o espinhaço se curva para diante , achão-se deslocadas as duas apophyses obliquas ; se para o lado direito , a apophyse esquerda ; e se para o esquerdo , a direita.

Differentes methodos , e máquinas se tem inventado para se praticar a reducção das vertebrae deslocadas ; porém o mais seguro consiste em fazer deitar o enfermo atravessadamente em huma cama estreita , mettendo-se-lhe de baixo do lugar deslocado , e do lado da curvatura do espinhaço hum barril , ou outro qualquer corpo cylindrico , para se augmentar a curvatura com brandas compressões feitas nos extremos do mesmo espinhaço , até que as apophyses obliquas apartadas humas das outras , possam ganhar as suas situações naturaes , o que o operador ajudará carregando para dentro na vertebra , ou vertebrae , que sahirem para fóra. Se deste modo se não consegue a reducção , he irre-

mediavel o damno ; porém se se consegue , o enfermo póde endireitar-se , e só resta ligar convenientemente a parte , e usar dos remedios precisos para restituir as funções lesadas. (a)

A

(a) Ha outras deslocações destes ossos causadas pela disposição rachitica , isto he , pela falta de nutrição , e por consequencia da rijeza precisa para suste-rem o pezo , que lhe fica superior , seguindo-se huma curvatura viciosa do espinhaço , chamada carcunda , a qual he maior , ou menor segundo o numero das vertebbras deslocadas , e o progresso da molestia. Os enfermos atacados desta disposição na infancia , ficão algumas vezes muito defeituosos ; porque crescem muito pouco , a cabeça augmenta deformemente , o espinhaço curva-se em hum , ou mais lugares , as costéllas deprimidas em huns lugares , e levantadas em outros , alterão as dimensões do peito ; resultando embaraços consideraveis nas funções dos órgãos desta cavidade , e algumas vezes a morte , o ventre faz-se tumido , e riço , as pernas tortas , e ordinariamente engrossão as extremidades articulares. Alguns tem supposto que a disposição rachitica he a escrofulosa , atacando os ossos do espinhaço , e que todas as mais desordens da economia são hum effeito da compressão , que soffre a medulla espinhal , e da mudança de lugar , e compressões , que soffrem as entranhas do peito , e ventre. Todavia eu acho que são duas disposi-

A deslocação da ultima vertebra dos lombos com o osso sacro exige a mesma operação ; que empregamos nas deslocações das outras vertebraes ; porém se este osso se deslocar pelas articulações com os ossos das cadeiras , o reporemos no seu

Tom. IV.

Nn

lu-

ções differentes , que consistem a escrofulosa na debilidade das glandulas do systema lymphatico , da qual lhes resulta hum entorpecimento , que lhes impede as suas funções , particularmente sendo fatigadas por algum estimulo particular , como o venereo , a materia das chagas , das bexigas , do sarampão , &c. , e a rachitica na molleza dos ossos , causada humas vezes pela falta da terra calcarea , e acido phosphorico , que os vasos excretorios deixão de dar aos ossos , outras vezes pela solução , e absorvencia dos mesmos principios extrahidos dos ossos pela acção augmentada dos absorventes.

O vulgo , e a maior parte dos Professores da arte de curar attribuem o estado prominente de alguma vertebra (primeiro sinal sensivel da disposição rachitica) a alguma violencia externa , e pertendem a redução com ligaduras , talas , máquinas , &c. , e não só os que ignorão a natureza da molestia usão destes meios , mas tambem os que conhecendo a disposição rachitica , pertendem endireitar o espinhaço com máquinas , e ligaduras. De todas as máquinas inventadas para este fim a que pareceo melhor , e que vogou

lugar, fazendo compressões desencontra-
das na parte anterior dos innominados, e
posterior do sacro, até o levarmos, quan-
to for possível, ao seu lugar, onde se con-
servará com a situação, e ligaduras con-
venientes. Eu tenho visto algumas deslo-
ca-

mais foi a de Le Vacher *: porém a experiencia tem
mostrado, que, além de ser incommoda, he perju-
dicial, assim como todos os coletes inventados para
o mesmo fim: pelo que os melhores meios que a ex-
periencia tem mostrado para se emendar a disposição
rachitica, e atalhar os seus effeitos no espinhaço, são
1.º conservar o paciente deitado, e particularmente
de costas o mais tempo que for possível: 2.º appli-
car-lhe vesicatorios aos lados da vertebra, ou verteb-
ras prominentes, os quaes se conservarão abertos
pelo espaço de dous, ou tres mezes, polvilhando as
chagas com as cantaridas em pó, ou abrindo as de
novo, quando se fecharem: 3.º fomentar-lhe o espi-
nhaço todas as noites com alcali volatil, e oleos es-
senciaes, ou fazer-lhe fricções seccas: 4.º metter o
enfermo em banhos de agua morna de meia hora ca-
da hum pelo espaço de hum, ou dous mezes, para
depois os tomar frios, e particularmente do mar:
5.º finalmente dar-lhe os tonicos internamente, com-

* Memor. da Academ. de Cir. de París, Tom. IV.
pag. 605.

cações destas resistirem a todos os esforços do operador , e virem as peças deslocadas a ganhar com o tempo as suas situações naturaes sómente com o soccorro da situação , e ligaduras.

O osso coccyx he de todas as peças do espinhaço a que pela sua situação , e exposição ás injúrias externas , se desloca mais facilmente. As quedas , e pancadas contra este osso , o deslocão para a parte anterior , e os partos laboriosos , ou grandes ajuntamentos de fezes no intestino re-

Nn ii

cto ,

binados com os calcares , como quina , ferro , soda phosphorada , ponta de veado calcinada , &c. Como o pezo do corpo sobre a tortura do espinhaço tende a augmentalla cada vez mais , tem-se lembrado alguns buscarem meios de suspender a cabeça , e espaldas com differentes máquinas , como a inventada por Le Vacher , ou a mesma correctã por Jones , a cadeira de Darwin * , &c. ; porém debalde se empregão estes , quando a disposição rachitica se não emenda constitucionalmente : pelo que as julgo inuteis , e incommodas , além de dispendiosas.

* Zoonomia , or the laws of organic life , Vol. II. pag. 89.

Osso , para a posterior. A dor local , que augmenta com o tossir, e espirrar, a mudança de figura da parte , havendo cova quando se desloca para dentro , e elevação , sendo para fóra , a difficuldade de andar , e de expullar as fezes , e urina, algumas vezes são os sinaes da deslocação deste osso, a qual se remedeia, sendo para fóra , comprimindo-o até ir ao seu lugar, e conservando-o com chumaços, e a atadura T, e para dentro, puxando-o para fóra com o dedo indicador untado em oleo, e mettido no anus , seguindo-se a mesma ligadura , mas menos apertada. Nesta ultima especie de deslocação he muito conveniente conservar a parte em falso por meio de almofadas , em quanto o enfermo está na cama , ou por meio de cadeira furada, quando se assenta.

Das deslocações das costélas.

§. CX.

Posto que muito tempo se duvidasse
das

das deslocações das costélas , e poucos Authores tratem dos meios de as remediar ; com tudo a inspecção dos cadaveres tem mostrado aos praticos modernos a possibilidade de taes deslocações, e não só se deslocação pelas suas cabeças articuladas com as vertebraes , mas pelas suas extremidades articuladas com o osso sternum. Na deslocação pelas cabeças , que se faz para a parte interna em consequencia de grandes pancadas , ha dores no lugar não tão agudas como nas fracturas , alguma depressão , que faz perceber que a costéla está mais dentro do que as outras , e finalmente difficuldade de respirar acompanhada com tosse. Para se locar huma tal deslocação , faremos curvar o enfermo para diante sobre hum barril , ou cousa semelhante , e comprimiremos as vertebraes superior , e inferior para dentro até a costéla se aproximar quanto for possível ao seu lugar (a). Isto feito , praticaremos a

li-

(a) Poucas vezes se consegue a redução completa , em razão de se não poder puxar a costéla pa-

ligadura, que consiste em chumaços, e algumas voltas da faixa de peito moderadamente apertadas, e sustidas com escapulario. Na deslocação da extremidade anterior, que he sempre para fóra, formando hum angulo com a cartilagem, basta a simples compressão com chumaços, e ataduras por bastante tempo, para se conseguir a melhora. Esta especie de deslocação he mais trivial nas crianças, em consequencia do aperto, que fazem as mãos das pessoas, que lhes pégão por baixo dos braços.

Da deslocação das claviculas.

§. CXI.

As claviculas articulão-se pelo extremo interno com o osso sternó, e pelo externo com o processo acromio da omoplata, e a pezar dos fortes ligamentos, que fortificão estas articulações, com tudo algumas vezes se deslocão os ditos extremos,

ra fóra: porém o defeito, que fica, he pouco incommodo, e vencido ordinariamente pela natureza.

mos, porém o interno mais do que o externo, em consequencia de quedas, e pancadas. Como estes ossos são mui descubertos, conhecem-se facilmente as suas deslocações, e além disto o enfermo sente dores no lugar da deslocação, que augmentão consideravelmente em qualquer movimento, que se queira fazer. Para se fazer a reducção, feja qual for o extremo, assenta-se o enfermo em hum assento baixo, e hum ajudante, situado por detrás d'elle, péga nos hombros, e aproxima as espadoas ao espinhaço, em quanto o operador com os dedos reduz o extremo deslocado, e applica os appositos, os quaes consistem 1.º no 8 de algarismo: 2.º nos chumaços postos sobre toda a clavícula, e hombro, e particularmente sobre o extremo, que se deslocára: 3.º na ligadura chamada espiga: 4.º finalmente em hum suspensorio, o qual, supportando o pezo do ante-braço, não deve levantar o braço, mas antes conservallo hum pouco descabido.

Da deslocação do humero.

§. CXII.

O humero he de todos os ossos do corpo o mais sujeito a deslocar-se pela sua articulação com a omoplata , não só em razão da força , que recebe a cabeça , ser muito pequena para a facilidade dos movimentos , de que goza a extremidade superior , mas porque o hombro he muito exposto a pancadas , quedas , e esforços violentos , causas mui triviaes desta deslocação. Quando a cabeça do humero sahe da fossa glenoidea por alguma das causas referidas , póde ir para fóra , para baixo , ou para dentro , e achar-se em tres lugares differentes , que são na parte externa da omoplata , isto he , na fossa infra-espinhosa , na cova do braço , e debaixo do musculo grande peitoral entre a apophyse coracoidea , e clavicula. A cova do braço he de todos estes lugares aquelle , para onde a cabeça do osso vai em quasi todas

as deslocações , sendo preciso , para ir para os outros lugares , que se combinem os esforços ; ou pancadas com certas situações do braço , como achar-se em adducção , para se deslocar para a parte externa , e em abducção , para a interna , &c. O musculo deltoide , o supra-espinhoso , os tendões do biceps , o processo acromio , e a clavícula defendem a deslocação directamente para cima , e só terá lugar complicando-se com a fratura do dito processo , e clavícula.

As dores , huma cova debaixo do acromio , e a falta de movimentos , são os sinaes communs da deslocação do humero ; e se além disto o braço estiver mais comprido , affastado do peito , e a cabeça do osso mettida na cova do braço , he a deslocação para a parte inferior , e produz algumas vezes inchações , e paralyfia , pela compressão , que soffrem os vasos , e nervos na axilla : porém se o braço se achar inclinado para cima do peito , e a cabeça do humero formando hum tumor

na fossa infra-espinhosa , he a deslocação para a parte externa , e será para a interna , se a dita cabeça formar hum tumor debaixo do musculo peitoral entre a apophyse coracoidea , e clavicula , e o braço se achar mais curto , e afastado do peito. (a)

Reconhecida a deslocação pelos sinais referidos , e o lugar , onde se acha a cabeça do osso , cumpre escolher o methodo , que lhe convem , combinando sempre a suavidade com a segurança. De todos os methodos até hoje inventados para se repôr a cabeça do humero no seu lugar , só adoptarei dous como mais seguros , e faceis (b). O primeiro , que
con-

(a) Alguns praticos fallão da deslocação do humero directamente para baixo ; porém a figura redonda da sua cabeça faz que esta escape para a fossa infra-espinhosa , ou para a cova do braço , e por tanto só pôde haver esta deslocação por algumas das causas internas.

(b) Como a deslocação do humero he muito frequente , tem dado lugar em todos os tempos a inventarem-se muitos methodos para a sua reposição , dos

consiste em locar com o pé, serve nas deslocações inferiores, e recentes. O segundo, que se pratica com extensões, e contra-extensões, serve nas inferiores antigas, e nas lateraes antigas, ou modernas.

Oo ii

Pri-

quaes alguns modificados, ou simplificados, se tem tambem adoptado para outras juntas. Hum dos mais antigos, chamado methodo da escada, ou da porta, consiste em situar o enfermo de pé em cima de hum cadeira, e fazer-lhe passar o braço por cima de hum degrão, ou porta, que se guarnece de pannos dobrados; para sobre estes descansar a axilla. Então hum ajudante segura o braço pelo pulso descabido para baixo, em quanto o operador, situado em pé em cima de outra cadeira, para encaminhar com os dedos o osso ao seu lugar, manda tirar a cadeira, sobre a qual se acha o enfermo, para que o peso do seu corpo faça a contra-extensão. Este methodo falha muitas vezes, e he susceptivel de grandes pizaduras, dores, inflammções, suppurações, e muitos outros symptomas, que o tem feito abandonar. Pelos mesmos motivos se tem desprezado o ambi de Hippocrates, o hombro de hum ajudante, e o páo aos hombros de dous homens, sobre cujas coufas se faz passar o braço do enfermo, para ser locado do mesmo modo, que na porta, ou degrão da escada.

Outro methodo, tambem muito usado, consiste em fixar o corpo do enfermo assentado em assento

Primeiro methodo.

§. CXIII.

Para se locar o humero com o pé, deita-se o enfermo no pavimento em cima de

baixo, e estender o braço, puxando-se com as mãos de ajudantes, ou com laços, em quanto o operador, com hum lenço passado pela axilla, e atado pelas pontas no seu cachaço, levanta a cabeça do osso ao seu lugar. Este methodo, muito fallivel, e por isto rejeitado presentemente, tem dado lugar a varias réformas, como á de se levantar a cabeça do osso com hum novello, ou rolo de pão guarnecido de pannos: porém estes corpos duros são mais prejudiciaes, do que o lenço, e por tanto abandonados totalmente.

Mais outro methodo, o qual consiste em fazer deitar o enfermo no pavimento, e levantallo por dous ajudantes vigorosos, situados em cima de huma meza, ou coufa femelhante, pegando-lhe pelo braço deslocado. Este methodo tem-se tambem posto em prática, puxando-se o braço por cordas passadas sobre polés.

Como todos estes methodos são falliveis, e rigorosos, tiverão os praticos recurso a máquinas, que fizessem a extensão, e contra-extensão graduadas de maneira, que não excedessem, nem cessassem de repente, defeitos que se notão quando são feitas por

de hum colchão , e o operador , descalçando o pé direito , se opéra no braço direito , ou *vice versa* , se deita tambem no colchão , mas com a cabeça para a banda dos pés do enfermo. Então pegando com as duas mãos no pulso do braço deslocado , faz a extensão , em quanto com o pé mettido na axilla faz a contra-extensão , augmentando gradualmente huma e outra até que a cabeça do osso vá ao seu lugar ajudada com o calcanhar , que a conduzirá

ajudantes , e Petit inventou huma * , que tem sido objecto de muitas disputas , a qual não descreverei pela julgar inutil , ou desnecessaria , pois que não ha deslocação alguma antiga , ou recente , que se não possa reduzir por algum dos dous methods , que eu proponho. Freke inventou outra , que se acha gravada na Estampa LXXVIII. do Tom. VI. do systema de Cirurgia de Bell , á qual este Author dá preferencia , e recorre nos casos , em que fora precisa mais força do que a que podem fazer os ajudantes : porém os mesmos motivos , que aponte na de Petit , nos decidem a desprezalla , assim como todas as mais , que se tem inventado ; e por isso nada direi das suas construcções , e applicação.

* Traité des Maladies des os , Tom. I. pag. 198.

rá para fóra , quando esta tiver vencido a altura da fossa glenoidea. Muitas vezes não basta a força do operador para fazer a extensão : em taes casos hum ajudante segura o enfermo pelos hombros , e outro ajuda a puxar pelo pulso. Este methodo he o mais suave , em razão de se fazer a contra-extensão com hum corpo tão macio como o pé , e o que devemos tentar com preferencia a todos os outros , ainda nas deslocações antigas , nas quaes tenho observado falhar mui poucas vezes.

Segundo methodo.

§. CXIV.

O segundo methodo , ao qual recorreremos quando falhar o primeiro , se pratica do modo seguinte. Sentado o paciente em huma cadeira , se lhe passa hum lençol , dobrado pelo comprimento em quatro dobras , por baixo do braço proximo á axilla , cujos extremos se atão a alguma cousa firme. Feito isto , manda o ope-

operador fazer a extensão por ajudantes, que puxão pela mão, e punho (a) na direcção conveniente, isto he, obliquamente para baixo, achando-se a cabeça na cova do braço, e em angulo recto com o

cor-

(a) Alguns praticos dobrão alguma cousa o antebraço, a fim de metterem os musculos em relaxação, e fazem a extensão puxando pela parte inferior do braço, por meio de ligaduras enlaçadas acima dos condylos do humero: porém esta prática não he a melhor, em razão de se affogarem hum grande parte dos musculos, que devem ceder, para o osso vir ao seu lugar, e resultarem deste affogamento grande estímulo, com o qual se contrahem os musculos em lugar de cederem, e pizaduras seguidas muitas vezes de inchações, inflammações, e outros danos, que custão a remediar: pelo que as extensões feitas pela mão, e ante braço são mais suaves, e produzem melhor effeito, por se não comprimirem os musculos, que devem estender-se. Alguns allegão contra esta prática, 1.º que a extensão quanto mais remota se faz, menos obra no lugar da deslocação: 2.º que as forças se perdem nas juntas, que ficão no meio: 3.º finalmente, que ficando huns musculos relaxados, e outros tenhos, são precisas maiores forças, e por consequencia maiores distensões: porém todas estas objecções são de pouca monta, como nos mostra a experiencia, e eu tenho observado constantemente.

corpo , achando-se debaixo do musculo peitoral , ou na fossa infra-espinhosa. Ao passo que os ajudantes fazem a extensão igual , e graduada , dirige o operador com os dedos a cabeça do osso ao seu lugar , e recommenda aos ajudantes que abrandem a extensão pouco a pouco , quando a cabeça do osso tiver vencido a altura da fossa , para que a dita cabeça não vá repentinamente ao seu lugar.

Quando as mãos dos ajudantes não bastão para fazerem a extensão conveniente , o que acontece nas deslocações antigas (*a*) , poderemos recorrer ás ligaduras enlaçadas no pulso , e puxadas por mais ajudantes. Reduzida a deslocação , o que se conhece pelo estalo , pelo allivio do enfermo , e pela figura natural da parte ,

(*a*) Nas deslocações antigas tem as partes molles , que cercão o osso , abraçado a sua cabeça , e peçoço tão estreitamente , que são precisas grandes forças para o desalojar daquelle lugar , e esta he a grande difficuldade , que offerecem algumas deslocações nas suas reposições , difficuldade , que humas , ou outra vez he invencivel , e a deslocação irremediavel.

te , segue-se a applicação dos appositos , que consistem em alguns gualapos molhados nos remedios convenientes , sustidos com a ligadura chamada espiga , e hum suspensorio , no qual se conserva o antebraço em meia flexão , e o braço aproximado ao peito. A conservação , aperto das ligaduras , e quietação dos enfermos , devem medir-se pela antiguidade da deslocação , robustez , e idade do paciente , e mais circumstancias , que acompanharem a deslocação ; porque humas vezes acha-se a fossa diminuida pela synovia , que a enche nas deslocações antigas , e o osso falta fóra com muita facilidade , se se não conserva com as ligaduras ; outras vezes lhe acontece o mesmo , quando os musculos , e ligamentos relaxados o não conservão firme no seu lugar , e lhe falta o soccorro das ligaduras , remedios , e quietação.

Da deslocação do ante-braço.

§. CXV.

O ante-braço pela sua articulação com o braço póde deslocar-se para trás, e para os lados, a pezar da structure complicada desta articulação, e dos ligamentos, que a fortificação: tambem se póde deslocar para diante; mas esta deslocação será complicada com a fractura da apophyse olecrane. Como esta junta he mui descarnada, as suas deslocações são faceis de descubrir pela vista, e palpando-se, além das dores, e impossibilidade de movimentos, que se lhes seguem. Quando a deslocação for para a parte posterior, que he a mais frequente, achar-se-ha a olecrane na parte posterior, e inferior do braço, e o ante-braço mais curto. As deslocações lateraes são sempre incompletas, isto he, passa o cubito a occupar o lugar do radio, ou *vice versa*.

Para se praticar a redução, senta-se

O enfermo em humã cadeira , e seguro o braço , e tronco por ajudantes , fazem outros a extensão puxando pela mão , e punho ; e quando os extremos deslocados se achão parallellos , péga o operador com a mão esquerda no hombro , e com a direita no pulso , sendo a deslocação no braço esquerdo , e *vice versa* no direito , e faz hum flexão apressada , aproximando as mãos hum a á outra. Deste modo se reduz a deslocação , quando esta he para a parte posterior ; porém sendo para os lados , ou para a parte anterior , cumpre , feita a extensão , applicar as palmas das mãos sobre os extremos deslocados , e carregar no de dentro para fóra , e no de fóra para dentro , até se conduzirem aos seus lugares. Nas deslocações para a parte anterior , ou posterior aproveita muitas vezes o methodo seguinte , o qual eu julgo mais facil , e mais suave. Assentado o enfermo como fica dito , applica o operador o cotovelo do seu braço direito na flexura do braço esquerdo , sendo este o

deslocado, e *vice versa* no direito; e pegando na mão com os dedos interlaçados com os do enfermo, faz huma flexão tal, que aproxime a mão ao hombro, em cuja flexão se loca facilmente o osso, o que se conhece, assim como em todos os methodos, pelo estalo, boa figura da parte, e facilidade dos movimentos. Locado o osso, ou ossos, se applicaráõ os appositos, que consistem em alguns gualapos molhados nos remedios convenientes, sustidos com algumas voltas de circular, e o suspensorio, no qual se conservará o ante-braço em meia flexão.

Algumas vezes acontece a deslocação das juntas do radio, e cubito entre si, humas vezes na superior, outras na inferior, e poucas em ambas. Quando estas deslocações se complicaõ com as do punho, ou flexura, reporemos estas primeiro, e depois as destes ossos entre si, o que he mui facil, assim como muito difficuloso conservallos, sendo muitas vezes preciso recorrer a talas, e ligaduras, como se applicação nas fracturas.

Da

Da deslocação do punho.

§. CXVI.

O punho pela articulação dos tres primeiros ossos do carpo com o cubito, e radio, póde deslocar-se para dentro, e para fóra, e raríssimas vezes para diante, ou para trás, em razão das apophyses effiloideas lhes servirem de reparo; e bem que esta articulação goze de muitos movimentos livres, todavia desloca-se mui poucas vezes.

As causas mais frequentes da deslocação do punho são as quedas, nas quaes as mãos indo adiante, para defenderem o corpo, encontram grandes resistencias, e tambem os grandes esforços, que se fazem para mover cousas pezadas, ou sustenter o corpo na acção de cahir.

Como a junta do punho he descarnada, qualquer deslocação completa he facilmente conhecida logo que se vê, e se palpa este lugar, além da perda de

movimentos, e dores, que soffre o enfermo, e direcção da mão curvada para o lado opposto á deslocação. Nas deslocações incompletas, que tem lugar nas articulações dos ossos das duas fileiras entre si, ou nas dos ossos do metacarpo, ha dores, falta maior, ou menor de movimentos, e desigualdades no punho, isto he, cavidade em huma parte, e eminencia em outra, cujas desigualdades podem com tudo occultar-se por algum tempo, se houver grande inchação.

Para se reduzirem as deslocações do punho, assenta-se o enfermo em huma cadeira, e dous ajudantes fazem a extensão, e contra-extensão, hum pegando pela mão, e outro pela parte superior do ante-braço. Isto feito, o operador conduz com os seus dedos os ossos aos seus lugares, mandando inclinar a mão para fóra, para dentro, para trás, ou para diante em opposição á parte, para onde se deslocarão os ossos. Feita a reducção, applica os appositos, que consistem em gualapos,

ligadura espiga, e suspenforio. Se a deslocação for incompleta, isto he, se algum dos ossos, que compõe o carpo, sahir alguma couza do seu lugar, praticaremos a reducção, e sobre os gualapos, e chumaços applicaremos alguma, ou algumas talas, para evitar nova sahida do osso, que neste lugar acontece mui frequentemente, se não ha esta cautela.

*Das deslocações dos ossos do metacarpo,
e dedos.*

§. CXVII.

Os ossos do metacarpo podem deslocar-se pelas suas bases para dentro, ou para fóra, e poucas vezes se deslocão completamente, excepto o ultimo, que se póde deslocar para a parte posterior. As primeiras phalanges dos dedos podem deslocar se para todas as partes, isto he, para dentro, para fóra, para trás, e para diante; porém as segundas, e terceiras entre si deslocão-se communmente para den-

dentro, poucas vezes para fóra, e ainda menos para os lados. O conhecimento destas deslocações he facil, quando se combinão as dores, e falta de movimentos com a má figura da parte, que nós descobrimos vendo-a, e palpando-a. Para se praticar a reducção de todas estas deslocações, basta que o operador segure o punho com huma das mãos, e com os dedos da outra puxe pela extremidade do dedo até reduzir o osso deslocado, depois do que applica os gualapos, chumagos, e talas, se forem precisas, sustido tudo com a ligadura competente, e situa a mão em descanso no suspensorio.

*Da deslocação do femur com os ossos
das cadeiras.*

§. CXVIII.

As pancadas, e quedas combinadas com certas situações, ou geitos, que se fazem, dão lugar, ainda que poucas vezes, a saltar a cabeça do femur fóra da
fos-

fossa cotyloidea , que a recebe. Eu digo poucas vezes ; porque a profundidade da fossa , e os ligamentos , e musculos , que fortificação , e cárcão esta junta , a defendem de soffrer deslocações a miudo , e repetidas vezes se toma a fractura do pescoço do femur , que he mui frequente , pela deslocação da sua cabeça (a). A deslocação da cabeça do femur póde fazer-se para cima , e para trás , para cima , e para diante , para a parte inferior , e anterior , e finalmente para baixo : porém de todas estas situações , que a dita cabeça póde ganhar , a anterior , e inferior he a que se observa com mais frequencia , em razão da borda cotyloidea ser mais baixa anteriormente , e faltar inferior , e anteriormente. Quando a coxa se desloca , ha dores , falta de movimentos , e mudança de figura da parte , além disto , deslocando-se para cima , e para diante ,

Tom. IV.

Qq

ap-

(a) Quando tratar desta fractura , darei os sinais decisivos , que a distinguem da deslocação da cabeça do femur.

apparece sobre o pubis hum tumor formado pela cabeça do offo , o grande trochanter acha-se mais acima , comparado com o do outro lado , a coxa em extensão , a perna mais curta , e o joelho , e pé voltados hum pouco para fóra. Sendo para cima , e para trás , a perna fica muito mais curta , o tumor formado pela cabeça do offo acha-se na fossa glutea , a coxa em adducção , as cabeças do triceps mui tensas , e o joelho , e ponta do pé voltados para dentro. Sendo para diante , e para baixo , acha-se o tumor formado pela cabeça no buraco ovalado , a perna mais comprida , a nadega mais baixa , e o pé , e joelho voltados para fóra. Finalmente sendo para baixo , a perna fica muito mais comprida , a fossa cotyloidea muito sensível , acima do grande trochanter , e o joelho , e pé quasi nas suas situações naturaes ; e se fazem alguma differença , será voltando-se qualquer coufa para dentro. As deslocações recentes -locão-se mais facilmente do que as antigas ; e as que se
fa-

fazem para o buraco ovalado, ou directamente para baixo, são (contra a opinião de alguns) mais facéis de reduzir, do que as que se fazem para os outros lugares; a razão d'isto mostra-se na robustez dos músculos, e na maior altura da borda cotyloidea superior, e posteriormente.

Para se praticar a reducção, deita-se o enfermo de costas na cama, e hum pouco sobre o lado sã, e se passa por entre as coxas hum lençol dobrado pelo comprimento em quatro dobras, cujo meio ficando na virilha do lado doente, cruzão os extremos sobre a ilhargia do mesmo lado, e se atão a alguma coisa fixa, ficando hum pela parte das costas, e outro pela parte do peito (a). Feito isto, fa-

Qq ii

zem

(a) Alguns praticos mandão, que o centro desta ligadura fique na virilha opposta ao damno, para não affogar os músculos, que devem ceder: porém como o objecto principal, que devemos attender na locação deste osso, he levantar a cabeça dos lugares, em que está alojada, para montar a borda cotyloidea, fica claro, que as extensões, e contra-extensões não precisão ser muito grandes, e que esta ligadura, que eu

zém os ajudantes a extensão puxando pela perna com as mãos , e se não basta , com ataduras enlaçadas por cima dos tornozelos. Ao passo que se faz a extensão , passa o operador huma toalha dobrada por dentro da coxa deslocada , junto á sua base , cujas pontas entrega a hum ajudante , para puxar por ellas directamente para fóra ; e quando as forças extensoras , e contra-extensoras chegam a desalojar a cabeça do osso , péga no joelho com huma das mãos pela parte de fóra , e com a outra na base da coxa pela parte de dentro , para com a primeira carregar no joelho para dentro , fazendo-lhe huma meia rotação para o lado opposto áquelle , para que se acha voltado , e com a segunda puxar para fóra o extremo superior do femur. Deste modo vai facilmente o osso ao seu lugar , o que se conhece pelo allivio

proponho , não só faz a contra-extensão , mas affasta a coxa para fóra , e ajuda a desalojar a cabeça do osso , e igualmente fica claro , que são escusadas as duas ligaduras , que outros propõem , passadas por cada virilha , para fixarem melhor as cadeiras.

vio do enfermo , boa figura da parte , e estalo , que se percebe. Conseguida a reducção , applicação-se os appositos , que consistem em alguns gualapos sustidos com a ligadura espiga , e se conserva o enfermo na cama o tempo preciso para se vigorem os musculos , e ligamentos.

Quasi sempre ficão os enfermos manquejando por muito tempo , não só por effeito da falta do ligamento redondo , que se québrea , mas por effeito das congestões , que se seguem á ruptura , e pizaduras , que soffre o ligamento capsular , e mais partes molles.

Quando o osso se desloca para cima , são precisas maiores forças extensoras , e contra-extensoras , do que quando se desloca para baixo , e para diante ; com tudo algumas vezes nas deslocações antigas não se póde conseguir a reposição , e os enfermos ficão aleijados , com a differença , que jazendo a cabeça do osso no buraco ovalado , vem com o tempo a ganhar movimentos , e a poder andar.

Nes-

Nesta junta podem haver deslocações parciaes , em consequencia de pancadas sobre o grande trochanter ; e a razão he , porque a cabeça do osso piza as cartilagens , e mais partes contidas na fossa , seguindo-se o enfarto destas mesmas partes , o ajuntamento da synovia , e outras desordens , que fazem sahir a cabeça do osso do seu lugar ; e como esta especie de deslocação se póde confundir com as inchações reumaticas , e escrofulosas desta junta , convem examinar bem se os seus effeitos (que são dores , claudicação , e encolhimento da perna) procedem de alguma pancada sobre o grande trochanter , ou de alguma das disposições acima ditas , para se lhe administrar os remedios convenientes , que são as sangrias topicas , a quietação , e os resolutivos tonicos , &c.

Da deslocação da rodela.

§. CXIX.

A rodela póde deslocar-se para cima , para baixo , para dentro , ou para fóra. Nas deslocações para cima rompe-se o ligamento , que prende este osso á tuberosidade anterior da tibia ; e nas que se fazem para baixo , rompe-se o tendão dos musculos extensores da perna. Tanto em huma , como em outra destas deslocações , que se conhecem pelas dores , falta de movimentos , e mudança da figura da parte , vai a rodela facilmente ao seu lugar , conduzida pelos dedos do operador , pondo-se a perna na maior extensão , e a coxa em meia flexão , situação , que o enfermo deve guardar em quanto a natureza faz a união dos extremos do ligamento , ou tendão quebrados , aproximando-se com a ligadura , que se pratica nas fracturas transversas deste osso. Se qualquer destas deslocações se complicar

com a deslocação da tibia , faremos primeiro a reducção deste ultimo osso.

Nas deslocações lateraes , que são quasi sempre incompletas , isto he , passa a fossa externa da rodela para cima do condylo interno do femur , ou *vice versa* , se situará a extremidade inferior do mesmo modo , e o operador conduzirá com os dedos a rodela ao seu lugar , carregando alguma couza no lado mais distante da junta. Feita a reducção , se applicão os appositos , que são alguns gualapos sustidos com voltas de circular.

Da deslocação da tibia.

§. CXX.

A tibia póde deslocar-se para trás , para diante , e para os lados , interessando nestas deslocações mais , ou menos a rodela , vista a connexão , que ha entre estes dous ossos por meio do ligamento anterior. Destas deslocações as lateraes são mais frequentes do que as anteriores , e
po-

postêriores , e humas e outras são ordinariamente incompletas ; porque a estrutura da junta (ginglymo) , e os ligamentos , que a fortificação , dão lugar a que mais facilmente succedão fracturas , ou lacerações , do que deslocações completas. Todavia tal póde ser a violencia , e geito , em que esteja a perna , que aconteça a deslocação completa. A deformidade da junta , achando-se o condylo externo do femur occupando a fossa interna da tibia , ou *vice versa* , a falta de movimentos , e dores insupportaveis , são os sinaes , que fazem conhecer estas deslocações.

Para se praticar a reducção , deita-se o enfermo de costas na cama , e fixado o corpo por meio do lençol , como na deslocação do femur , hum sufficiente numero de ajudantes fazem a extensão puxando directamente a perna com as mãos , ou ligaduras enlaçadas acima dos tornozelos. Então o operador , applicando as palmas das mãos sobre os extremos dos ossos desencontrados , os comprime op-

postamente até os reduzir aos seus lugares , depois do que applica os gualapos fustidos com algumas voltas de circular , e situa a perna estendida , e amparada por meio dos rolos feitos com o lençol.

A extremidade superior , ou a inferior do peroneo desloção-se algumas vezes por effeito de violencias externas , e as dores , e falta de movimentos se attribuem a outras causas , se hum exame escrupuloso com o tacto não decide da natureza da molestia. Reconhecida alguma destas deslocações , se fará a redução , conduzindo-se com os dedos o extremo deslocado ao seu lugar , o qual se conservará com as ligaduras competentes , e talas , se forem precisas.

Da deslocação do pé.

§. CXXI.

O pé articula-se com a perna por meio do astragalo , e extremidades inferiores da tibia , e peroneo , cuja articulação ,
além

além de ser preza por fortes ligamentos, tem aos lados os dous tornozelos, que a fazem afsás firme; com tudo as violencias externas, como saltos, quédas, pancadas, &c., causão a deslocação do dito astragalo para differentes partes, isto he, para a parte posterior, ficando o calcanhar mais comprido, e o pé mais curto; para a anterior, ficando o pé mais comprido, e o calcanhar como sumido; para o lado interno, ficando a planta do pé voltada para fóra; e para o lado externo, ficando a dita planta voltada para dentro. Estas deslocações lateraes só tem lugar fracturando-se ao mesmo tempo os tornozelos, ou ao menos deslocando-se o externo. A deformidade da parte, as dores, e falta de movimentos, bastão para conhecermos estas deslocações, e o tacto nos confirma do lugar, para onde sahíra o osso, assim como tambem se a deslocação he completa, ou incompleta.

Qualquer que seja a deslocação, deve repôr-se promptamente, para o que se

deitará o enfermo na cama , e hum sufficiente numero de ajudantes fazem a extensão , e contra-extensão , puxando pela perna junto ao joelho alguma couza dobrado , e pelo calcanhar , e peito do pé , até que os extremos deslocados se ponhão parallelos , em cujo estado serão conduzidos ao seu lugar com os dedos do operador. Se a deslocação se complicar com fractura de algum dos tornozelos , se fará a reducção desta depois de locado o osso , e se applicaráõ os appositos , e ligaduras competentes.

Das deslocações dos outros ossos do pé.

§. CXXII.

O calcaneo póde deslocar-se pela sua articulação com o astragalo para a parte interna , e a sua deslocação causar dores , deformidade no pé , e perda maior , ou menor de movimentos. Reduz-se do mesmo modo que fica dito no astragalo , e a sua reducção he mais difficilissima : pelo
que

que exige maiores extensões , e contra-extensões. Os outros ossos do tarso , e metatarso deslocão-se quasi sempre parcialmente , e se reduzem do mesmo modo , que se disse no carpo. Alguns praticos reduzem estas deslocções parciaes assentando a planta do pé sobre hum rolo de pão , e movendo-o em cima do dito rolo detrás para diante , e de diante para trás : porém este methodo he pouco efficaç , e mui doloroso.

As deslocções das phalanges , quando se deslocão , exigem as mesmas diligencias , que disse tratando das deslocções das dós dedos da mão.

C A P I T U L O VIII.

Das fraçturas em geral.

§. CXXIII.

CHama-se fraçtura , ou quebradura dos ossos a separação da sua continuidade por alguma violencia , e se distingue em
sim-

simples, composta, e complicada. A simples consiste em huma só divisão do osso, a qual póde ser obliqua, ou transversal (*a*). A composta consiste em duas, ou mais divisões de hum osso, sós, ou acompanhadas de lascas, ou na divisão de dous ossos, que compõem huma parte, como o cubito, e radio fracturados ao mesmo tempo (*b*). A complicada he aquella fractura, que, ou seja simples, ou composta, he acompanhada de molestias, ou

(*a*) Alguns praticos fallão da fractura longitudinal dos ossos, isto he, de rachas, que correm ao seu comprimento, outros negão a existencia de taes fracturas: eu não duvido, que hum osso possa rachar pelo seu comprimento; mas como estas fracturas não exigem soccorros manuaes para a sua reposição, e só as applicações topicas, que convem nas contusões, com as quaes a fractura longitudinal se póde equivocar, por isso não farei menção dellas.

(*b*) Alguns chamão a esta fractura de dous ossos completa, e a de hum incompleta: porém eu chamarei fractura completa a divisão de hum osso na sua totalidade; e incompleta, aquella, que só o divide em parte, cuja fractura se verifica sómente nos ossos chatos, e largos.

ou accidentes , que apresentam diferentes indicações a encher , além da reposição dos extremos fracturados , como de deslocações , de feridas , de hemorragias , de inchações , de febre , de convulsões, &c.

Causas.

§. CXXIV.

As causas das fracturas se reduzem a predisponentes , e accidentaes. As predisponentes são 1.º a grande dureza dos ossos ganhada pela idade : 2.º a dureza natural de certas porções dos mesmos ossos , como o centro de todos os compridos , e alguns lugares dos chatos , onde falta a dispoila : 3.º a mesma dureza alterada para mais , ou para menos do estado natural por alguma molestia , que ataque os ossos , como a caria , o veneno venereo , a disposição rachitica , escrofulosa , scorbutica , &c. : 4.º finalmente o frio do inverno , em cuja estação são os ossos mais quebradiços. As accidentaes são es-

for-

forços mais , ou menos violentos , quedas , pancadas , movimentos convulsivos , geitos , puxões , &c.

Sinaes.

§. CXXV.

Quando em consequencia de alguma , ou algumas das causas das fracturas ficão dores , e falta de movimentos no membro , ou parte , que recebêra a offensa , ha alguma suspeita de fractura , cuja suspeita se muda em realidade , 1.º se palpando-se a parte dorida , se sente alguma desigualdade nas superficies , ou cristas dos ossos : 2.º se pegando-se em hum e outro extremo do osso quebrado , e movendo-se em meias rotações , ou para os lados desenhadamente , se sente crepitação , isto he , estalos , que dão os extremos fracturados roçando hum pelo outro : 3.º se as dores , e falta de movimentos são acompanhadas de deformidade da parte , isto he , de membro mais

cur-

curto , e grosso , ou curvado em parte , onde não ha junta , o que succede , quando os extremos fracturados sobrepõem hum em cima do outro por effeito da contracção dos musculos : 4.^o finalmente se havendo ferida , se descobrem pelo tacto , ou vista os extremos em contacto hum com outro , sobre-postos , ou sahindo ao través das partes molles , humas vezes inteiros , outras partidos em varias lascas , ou esquirolas.

Prognostico.

§. CXXVI.

Decidida a existencia da fractura , e sua qualidade por alguns dos sinaes acima mencionados , fazemos o seu prognostico fundado nas circumstancias seguintes : 1.^a as fracturas simples curão-se mais facilmente do que as compostas , e estas do que as complicadas : 2.^a a fractura transversal simples , ou composta he mais facil de curar do que a obliqua ; porque

ou os extremos se achem em mutuo contacto, ou se reponhão, conservão-se sem grande difficuldade, e da sua conservação resulta huma união mais prompta, e a prevenção de accidentes, que atrazem, ou difficultem a cura: pelo contrario as obliquas, ou lascadas; porque não só se não conservão os extremos em contacto, sobre-pondo hum sobre o outro, mais ou menos segundo a obliquidade da fractura, e força dos musculos, que encurtão o membro por falta do apoio do osso, mas as pontas agudas dos extremos, ou esquirolas (se as ha) picão, e irritão as partes molles, seguindo-se dores, inchações, inflammções, e outros muitos symptomas, que desordenão, e atrazão mais, ou menos a cura, além de ficarem grossuras, ou curvaturas, que impedem o jogo dos musculos, e affeão o lugar fracturado: 3.^a as fracturas nas gentes idosas; porque levão mais tempo a curar-se, e algumas vezes não unem os extremos fracturados, ficando huma nova junta, pela qual

qual se dobra o membro, e não póde fazer os movimentos : 4.^a o estado morbofo, ou fadio da constituição ; porque nos fugeitos, que logrão boa faude, são mais remediaveis as fracturas, e suas consequências, do que nos scorbuticos, venereos, rachiticos, escrofulosos, cacheticos, &c. : 5.^a o lugar da fractura ; porque as dos centros dos ossos compridos curão-se melhor, do que as dos extremos, não só porque os succos são mais abundantes nestes, e embaraço a união, mas porque sendo proximas das juntas, excitão congestões, com as quaes se prendem os movimentos, e os enfermos ficão aleijados : 6.^a a dureza, ou mollidão dos ossos, seja natural, ou accidental ; porque nos ossos esponjiosos, ou amollecidos por alguma disposição morbosa, são as fracturas mais custosas de curar : 7.^a finalmente as complicações ; porque a fractura complicada com ferida he humas vezes acompanhada de hemorrhagias, que pedem laqueações, formações, e outros meios cu-

rativos , que impedem , ou retardão a união dos ossos , além de os exporem a carias , e exfoliações , outras vezes he seguida de inflammções , suppurações , gangrena , convulsões , paralyfias , &c. , accidentes , a que estão sujeitas todas as fracturas ; porém esta mais.

Cura.

§. CXXVII.

A cura das fracturas pede que se enchão tres indicações : 1.^a repôr os extremos fracturados no seu lugar : 2.^a conſervallos o tempo preciso para a natureza os unir : 3.^a atalhar , ou prevenir os accidentes , que ha , ou podem sobrevir.

Primeira indicação.

§. CXXVIII.

A primeira indicação enche-se 1.^o ſituando-se o enfermo , e parte fracturada como devem existir , durante o tempo precisi-

cifo para a união: 2.º preparando-se o aparelho, e pondo-se na situação, e ordem, em que se ha de applicar, o qual deve constar de gualapos, chumaços, talas, fittas, ataduras, caixas, suspensorios, ou outros encoistos, segundo a casta de fractura, que se apresentar: 3.º removendo-se tudo o que possa impedir a união do osso, ou ossos fracturados, como corpos estranhos, esquirolas, coalhos de sangue, &c., nas fracturas complicadas: 4.º fazendo-se a extensão, e contra-extensão, para o que dous, ou mais ajudantes, se forem precisos, puxaráõ branda, e gradualmente pelas extremidades do osso, até se vencer a contracção dos musculos, que fizera sobrepôr os extremos fracturados, ou que os conserva assim, sobre-postos pela violencia da offensa. As extensões, e contra-extensões nas extremidades superiores serão feitas com o braço, e ante-braço em meia flexão e extensão, para que os musculos cedão mais a favor da reducção: porém nas extremida-
des

des inferiores serão feitas com a coxa , e perna na extensão , por ser esta a situação mais favoravel , em que devem jazer durante a cura (a). Mui poucas forças são precisas para se reduzirem os ossos fractura-

ra-

(a) Já se vê que eu não admitto como melhor posição a de ficarem os membros curvados , como propõe Pott , e recommenda Bell , assentando que assim ficão os musculos mais relaxados ; porque já mostrei , que os musculos só entrão em contracção , quando são irritados , ou quando naturalmente se encarregão de fazer huma acção : e como os membros descansando em suspensorios , ou encoostos , os musculos não entrão em acção , mas antes estão passivos , devemos situar os ditos membros naquella posição , em que o corpo , e parte fracturada descansão naturalmente melhor , como o braço em flexão , e o ante-braço em meia flexão e meia extensão , a coxa , e perna na extensão , e o pé em meia flexão e meia extensão. Deste modo podem os enfermos aturar o tempo da cura sem tanta mortificação , como a que lhes resulta do estado violento , que se affastar do descanso natural. Além disto não sei que as curvaturas dos membros concorrão de modo algum para huma cura mais prompta , antes pelo contrario a devem retardar ; porque inchão mais as partes , em razão do difficiloso ascenso dos liquidos , a que as ditas curvaturas dão lugar , seguindo-se dores , e inquietação ,

rados, ainda aquelles, que são cercados de musculos robustos, como a coxa; e por tanto são desnecessarias as máquinas, e laços recommendados por alguns praticos: o que importa he que as extensões, e contra-extensões se fação vagarosamente, para que os musculos irritados se não contraião demasiadamente. Quando as ditas extensões, e contra-extensões se podem fazer, pegando-se nas extremidades dos ossos fracturados, aproveitão mais; porém não se segue damno algum, se se fizerem puxando-se por ossos articulados com o fracturado; porque nunca he preciso puxar-se tanto, que se prejudique a articulação, que fica no meio, e muitas vezes he preciso puxar pelos ossos contiguos, como quando a fractura he junto das articulações. Se o osso, a pesar de fracturado, se achar no seu lugar, e os extremos encontrados topo com topo, não

que obrigão a mover-se a parte fracturada, e a não estar no preciso descanso, que nós conhecemos ser tão util na cura das fracturas.

não são precisas extensões , e contra-extensões , e deveráo ser mui fracas nas fracturas de hum osso , cuja falta he supprida por outro , como a fractura da tibia , ficando o peroneo illeso , ou *vice versa* , e igualmente se não deveráo fazer nas fracturas obliquas , se não no ponto de se atarem as fittas , que sujeitáo as talas ; porque as que se fizerem antes deste ponto são baldadas , pela razão de se sobreporerem os extremos em quanto não são conservados pelo aperto das talas : 5.º finalmente levando-se os extremos fracturados a encontrarem-se topo com topo , se assim não existem , ou se as forças extensoras , e contra-extensoras os não repõe , como algumas vezes succede , o que o operador fará com os seus dedos , ou com as palmas das mãos , carregando nos ditos extremos em sentido opposto , até irem ao seu lugar , o que se conhece pela boa figura da parte , rectidão , e comprimento natural do membro , diminuição de dores , e algumas vezes pela crepitação , que se lente.

Se-

Segunda indicação.

§. CXXIX.

A segunda indicação enche-se com a applicação do apparelho , e com a situação. Para se applicar o apparelho , devem os ajudantes conservar os extremos repostos , e a parte no mesmo gráo de extensão , que fora precisa para lhe restituir a figura , rectidão , e comprimento natural. Então o operador applica 1.º os gualapos molhados em agua ardente , ou remedio indicado (a) , os quaes devem ser tres,

Tom. IV.

Tt

ou

(a) Não se pôde determinar em geral qual deve ser o remedio indicado ; porque os differentes symptomas , que acompanhão , ou podem sobrevir ás fracturas , pedem remedios , isto he , licores diversos ; humas vezes tonicos , ou espirituosos , outras emollientes , ou sedativos ; porém como não haja indicação particular a encher , e as fracturas sejam sempre acompanhadas de ecchymoses , usaremos da agua ardente , só , ou diluida em agua , como hum bom excitante , e fortificante , qualidades que se achão neste remedio , além do accio , promptidão , e commodidade , sem nos lembrarmos dos quimericos prejuizos daquelles ;

ou quatro de largura , e comprimento taes , que cubrão bem todo , ou a maior parte do osso , ou ossos fracturados (*a*) : 2.º alguns chumaços iguaes , ou desiguaes (se forem precisos) , para fazerem hum assento igual ás talas : 3.º as talas com os chumaços , que as forrão , as quaes devem ficar mui perto humas das outras , para se evitar a inchação das partes molles , que ordinariamente tem lugar , quando ficão mais espafiosas , e as quaes devem ser do mesmo comprimento do osso fracturado , ou pouco menos , a fim de que este não

va-

que não usão dos espiritos ardentes nestes casos , suppondo que o mesmo he haver fracturas , que existir o estado irritavel das partes , quando muitas vezes fomos obrigados a usar não só da agua ardente , mas de tonicos mais irritantes , para resolver congestões lymphaticas , ou serofas , e dar acção aos solidos.

(*a*) Posto que algumas vezes se possão applicar cada gualapo separadamente , com tudo o melhor methodo consiste em os situar huns em cima dos outros , prendellos por alguns pontos no centro , e fender-lhes os extremos até perto do meio , em dous , ou mais lugares , resultando o que se chama gualapo de dezoito pontas.

vacille , excepto as duas lateraes , que devem ser mais compridas , e por isto chamadas guias , para abrangerem os lados das articulações superior, e inferior, que pertencerem ao osso fracturado: 4.º as fittas , as quaes devem ser tres , principiando por atar a do centro ao redor das talas , e depois as dos extremos , com hum aperto tal , que não impida o ascenso dos liquidos , nem por froxas deixem vacillar o osso. He neste momento , em que se apertão as talas com as fittas , que os ajudantes devem conservar a parte na sua perfeita , e natural figura , ou que devem fazer as extensões , e contra-extensões nos casos de fracturas obliquas. Quasi sempre bastão as fittas para conter as talas ; mas se não bastarem , como acontece nas crianças , pessoas inquietas , ou delirantes , se conterão melhor com voltas de circular , além das ditas fittas.

Em quanto á situação , deve notar-se que nas fracturas das extremidades inferiores , ossos das cadeiras , e vertebrae o

enfermo estará de cama até se formar o póro, e com a parte fracturada no maior descanso possível por meio de apoios feitos com travesseiros, almofadas, ou rolos, como direi em particular. Porém nas fracturas das extremidades superiores, queixo, e costelas, estará de cama alguns dias, em quanto passam os primeiros symptomas, e depois se poderá assentar, ou andar de pé, com a parte fracturada descansando no suspensorio, ou bem sustida com ligaduras.

Não se póde determinar o tempo preciso para se formar o póro, ou união firme dos ossos; porque a idade avançada, o estado morbozo da constituição, as disposições rachitica, escrofulosa, scorbutica, o veneno venereo, a menor dureza, e maior volume dos ossos fracturados, e as complicações das fracturas, pedem muito mais tempo do que he preciso na infancia, n'humas constituições sadias, nos ossos mais duros, e nas fracturas simples, e transversas. Todavia nestas ultimas cir-

cum-

cumstancias podemos dar aos ossos das extremidades inferiores, das cadeiras, e do espinhaço de quarenta a sessenta dias; aos ossos das extremidades superiores de trinta a quarenta; ás claviculas, costelas, queixo inferior, e ossos dos dedos, carpo, e tarso, de vinte a trinta, e isto no caso de não virem symptomas, que obriquem a bullir-se no apparelho, como defmancho de cura, inchações, inflammações, dores, &c. ; porque então he preciso mais tempo.

Terceira indicação.

§. CXXX.

A terceira indicação enche-se remediando os accidentes, que acompanhão as fracturas, e prevenindo os que podem sobrevir.

Das fracturas complicadas com dor grande.

§. CXXXI.

As fracturas simples , e transverfas , e ainda as compostas , que só apresentam as indicações da reposição , e conservação , não são communmente acompanhadas , e seguidas de accidentes , ou symptomas , posto que nenhuma casta de fractura , por mais simples que seja , está livre delles , segundo o estado constitucional , e gráo da violencia , que a causára.

A dor he o symptoma mais trivial , que acompanha , ou sobrevem ás fracturas. Quando as acompanha , e he muito activa , o que depende da sensibilidade do fugeito , ou do estimulo causado pela offensa , ou pontas dos ossos , diminue ordinariamente com a reposição , e he preciso além disto sangrar segundo as forças , adietar , e empregar os antiphlogisticos topica , e internamente , com especialidade o opio. Quando porém sobrevem de-
pois

pois da reposição, he necessario averiguar o lugar, e a causa; porque póde ser 1.º na fractura, causada pelo desmancho da reposição, e he preciso tornar a concertar os ossos: 2.º em todo o membro, causada pela má posição, ou aperto do apparelho, e he mister affroxar as fittas, e ataduras, e situar melhor a parte: 3.º em algum lugar particular, causada pela compressão, ou estímulo de alguma tala, a qual se deve mudar, fazer mais curta, ou forrar de novos chumaços: 4.º na inchação, que se segue abaixo do apparelho, cuja inchação, sendo moderada, mostra o gráo de aperto conveniente; e sendo excessiva, a necessidade de se affroxarem as ligaduras: 5.º finalmente no lugar da offensa, e dependente do estado irritavel do fugeito, a qual se remedeia com as sangrias, e mais remedios acima ditos.

Da fractura complicada com inchação.

§. CXXXII.

A inchação inflammatoria he outro symptoma tambem mui trivial nas fracturas , e esta póde existir antes da reposição , e em tal auge , que impida o conhecimento da offensa do osso , e mesmo a reducção. Em taes casos cumpre sangrar constitucional , e topicamente , por meio de bichas , adietar , pôr a parte em descanso , e empregar os antiphlogisticos geraes , e locaes ; e quando a deathesis phlogistica tiver amainado , se empregarão os tonicos, e se praticará a reducção. Porém se a inchação vier depois de applicado o apparelho , he preciso além destes remedios affroxallo , e muitas vezes tirallo , para se empregarem os remedios , e prevenir a gangrena , que apparecendo , se tratará como fica dito pag. 66.

Da fractura complicada com deslocação.

§. CXXXIII.

Quando a fractura se complica com deslocação , he preciso repôr primeiro a deslocação , podendo ser , e depois concertar a fractura , ou *vice versa* , não podendo ser.

Da fractura complicada com ferida.

§. CXXXIV.

A fractura complicada com ferida requer todo o cuidado dos praticos ; porque he huma complicação , que estorva muito a cura : pelo que se a ferida não descubrir o osso , como acontece algumas vezes quando he feita pelo corpo , que o fracturára , cumpre repôr os extremos no seu lugar , e unir a ferida por primeira intenção , deixando-se hum buraco do seu tamanho nos gualapos , para por este se fazerem as curas precisas , sem se bullir

no apparelho , cujo buraco se tapa com hum chumaço , que cobre os fios , e mais remedios , para sobre este se applicar hum tala , sendo precisa , sustida com fittas distintas das que apertão as outras talas. Porém se a ferida descobre o osso , o que acontece nas grandes violencias , ou quando as pontas dos ossos furão as carnes , e pelle de dentro para fóra , he preciso examinar se ha esquirolas , coalhos de sangue , ou outros corpos estranhos , que impedão a união dos ossos , e partes molles , para se tirarem , repôr os ossos , e unir a ferida por primeira intenção (a) . Se os
of-

(a) Nada importa tanto como defender os ossos do toque do ar e remedios : por cujo motivo faremos toda a diligencia para chegar as partes molles humas ás outras ; pois que a experiencia nos mostra , que as fracturas complicadas com esquirolas , lacerações de carnes , e grandes ecchymoses , mas sem offensa nos tegumentos , se curão muitas vezes com tanta promptidão como as simples , e até sem sobrevirem symptomas , o que não acontece achando-se os tegumentos rotos , e os ossos expostos ao ar ; porque ordinariamente vem inflammções , suppurações , carias , e outros muitos symptomas.

ossos se quebrão muito obliquamente , a que chamão fractura de bico de flauta , ou se lascão em muitos bocados de maneira , que não possão permanecer em contaçto topo com topo , e não ha outros ossos illesos , que supportem a contracção dos musculos , he preciso cortar transversalmente as pontas agudas , a fim de ficar de huma parte e outra certa superficie , que possa servir de encontro , o que se fará ao través da ferida com a tenaz incisiva , ou com o ferrote pequeno , curvando-se o membro pelo lugar fracturado , e fazendo sahir as ditas pontas pela ferida.

Quando se usa do ferrote , se passa huma lamina de papelão entre o osso , e partes molles , para defender estas dos dentes da serra , ou se serra o osso de dentro para fóra , tendo-se antes voltado o córte da folha para a parte do arco. Se para estas operações for preciso ampliar a ferida , se fará para onde houver menos risco. Serradas , ou cortadas as ditas pontas , repõe-se os extremos no seu

lugar , une-se quanto for possível a ferida ; e se applica o aparelho como fica dito.

Da fractura complicada com hemorrhagia.

§. CXXXV.

A hemorrhagia he o symptoma , que exige o mais prompto soccorro , e aquelle , que mais póde impedir a cura das fracturas , por ser preciso que fiquem corpos estranhos na ferida , que devem sair com a suppuração , como escaras ; usando-se dos adstringentes , fios de formações , ou linhas de laqueações , &c.: com tudo a laqueação he de todos os meios o que devemos adoptar , buscando-se o vaso , que der sangue , até mesmo á custa de alguns golpes , se forem precisos ; porque he o que menos impede a união por primeira intenção. Suspendido o sangue , une-se a ferida , ficando as linhas no angulo mais baixo , repõe-se os ossos , e applica-se o aparelho. Quando a hemorrha-

rhagia for do vaso principal, que nutre o membro, poucas esperanças restão da conservação deste: com tudo não se deve logo recorrer á amputação, como querem muitos; porque nada se perde em se tentar primeiro a conservação da parte pela laqueação; e no caso que esta se não consiga, então se praticará a operação.

Da fractura complicada com grandes lacerações.

§. CXXXVI.

As fracturas complicadas com grandes lacerações, são quasi sempre irremediaveis sem o triste recurso das amputações, que adoptaremos, e praticaremos conforme o que fica dito (XLVII).

Da fractura complicada com convulsões.

§. CXXXVII.

As convulsões são ordinariamente hum effeito do estimulo causado por algu-

gumas esquirolas, ou pontas do osso, que irritão as partes molles. A extracção daquellas, e córte destas, assim como a prompta reducção, terminão ordinariamente as convulsões; mas se continuarem, recorreremos á sangria, dieta tenue, diluentes, opio, e mais anti-espasmodicos; e declarando-se o tetanismo, observaremos o que fica dito Tom. I. pag. 197.

Dos symptomas consecutivos.

§. CXXXVIII.

Além dos symptomas, de que tenho tratado, que se chamão primitivos, porque podem acompanhar a fractura desde que existe, ha outros, que lhe podem sobrevir, chamados consecutivos, e são dor grande, hemorrhagia, convulsões, inchação inflammatoria, ou lymphatica, dos quaes tenho tratado, suppuração, gangrena, paralyfia, magreza, anchilose, deformidade, grossura de póro, alongamento do membro, e falta de união.

Da

Da suppuração, que sobrevem ás fracturas.

§. CXXXIX.

As fracturas complicadas com ferida, são (quando esta não une por primeira intenção) seguidas de suppuração mais, ou menos abundante, segundo a extensão da ferida, ou o estado constitucional. Quando não ha outra complicação, se tratará a chaga como simples, curando-se com brandos digestivos, e depois cicatrizando-se com fios seccos, ou aguas deseccantes. Se o osso se cariar, ou despedir esquirolas, conservaremos a chaga aberta por meio dos cathetericos, até estas sahirem, e depois a cicatrizaremos como fica dito. Havendo porém algum veneno, ou disposição constitucional, que entretenha a suppuração, se tratará com os remedios apropriados, não esquecendo os tonicos, assim que apparecer debilidade constitucional.

Da fractura complicada com gangrena.

§. CXL.

Se a fractura , a pezar de todos os cuidados chirurgicos , for seguida de gangrena , observaremos o que fica dito (XXIX)..

Da fractura complicada com paralyfia.

§. CXLI.

A paralyfia , effeito da compressão dos nervos , póde acompanhar a fractura , e ceffar com a reposição dos ossos , ou sobrevir-lhe depois por muitas causas , e se remedeia com os tonicos internamente , e com os espirituosos , e irritantes topicamente , os quaes não aproveitando , se recorrerá aos banhos das aguas thermaes.

A magreza , que se segue ás fracturas , exige os mesmos remedios , além dos topicos laxantes.

Da fractura complicada com anchilose.

§. CXLII.

A anchilose , isto he , a prizão de huma junta , como se as duas peças articuladas fossem huma só , tem lugar , quando a fractura succede nas juntas , ou muito perto dellas , e póde ser verdadeira , ou falsa: verdadeira , quando os extremos articulados se colão de tal modo hum ao outro , que não póde haver movimento algum ; e falsa , quando ainda ha algum movimento , porém muito limitado : a primeira depende dos succos espessados , e vascularizados , colando huma peça á outra : a segunda do enfarto dos ligamentos , e cartilagens , e esta he a mais frequente (a).

Tom. IV.

Xx

A

(a) A anchilose não só he hum effeito das fracturas , como acabamos de mostrar , mas póde vir em consequencia de muitas molestias , que atacão as juntas , como deslocações , pizaduras , inflammações ; exostoses , inchações brancas , falta de synovia , synovia espessa , &c.

A anchilose verdadeira he incuravel depois de formada; porém póde, e mesmo deve prevenir-se com brandos movimentos, que se fazem á junta, quando as fracturas podem causar esta molestia, isto he, quando interessão as articulações.

A falsa póde curar-se dando-se flexibilidade aos ligamentos, e mais partes, que cercão as juntas, humas vezes resolvendo as congestões com os remedios topicos, e mesmo irritantes, sendo chronicas, ou com os antiphlogisticos, sendo agudas; outras vezes laxando a rijeza das mesmas partes com os emollientes em banhos, fomentações, e cataplasmas, e particularmente com as aguas thermaes.

Da fractura complicada com deformidade.

§. CXLIII.

A deformidade, que se segue algumas vezes ás fracturas, póde ser 1.º demaziada grossura do póro, por effeito do grande estrago do osso, ou ossos, como

acon-

acontece nas fracturas compostas (a), e complicadas, pela superabundancia de lymphá coagulavel, que excede á precisa, para unir as peças fracturadas, e se vasculariza, defeito este, que póde prevenir-se em parte, havendo a cautela de repôr bem as peças fracturadas, e conservallas nos seus lugares com o apparelho bem ajustado: 2.º maior comprimento do membro, o que succede quando a fractura he obliqua, e as pontas dos extremos, ajustadas topo com topo por effeito de extensões excessivas, se conservão assim durante a união, e esta deformidade he das menos más, e póde evitar-se não se alongando o membro além dos limites, em que deve ficar com o seu

Xx ii

com-

(a) Nas fracturas, que ficão perto humas das outras, sejam no mesmo osso, ou em dous vizinhos, he algumas vezes a lymphá coagulavel tão abundante, que, entornando-se ao redor dos ossos, os cobre; e fôrma hum póro continuado de humas fracturas ás outras, como observamos, quando se fracturão duas, ou mais costelas, a tibia, e o peroneo, o cubito, e radio, &c.

comprimento natural : 3.^o cürteza de membro , a qual tem lugar , quando os ossos fracturados obliquamente se não podem conservar em contacto topo com topo , por falta de superficies , ou quando por falta do Cirurgião ficão os extremos sobrepostos. No primeiro caso póde a deformidade remediar-se em parte com o apparelho bem ajustado , e puxando-se pelo membro de quando em quando a dar-lhe o comprimento natural , depois de passado o estado irritavel , ou para melhor dizer , quando a lymphá coagulavel comêça a endurecer-se , que he ordinariamente dos quinze dias por diante (a). No segundo caso he preciso que o Cirurgião

(a) A pertençaõ , que tem tido os praticos em todos os tempos , de dar aos ossos fracturados obliquamente o seu comprimento natural , fez inventar muita diversidade de apparelhos , e máquinas , que a experiencia mais bem reflexionada tem feito abandonar , e com razão ; porque nenhuma póde encher o fim desejado , e todas são muito incommodas : e portanto nada direi a respeito de taes apparelhos , e máquinas , que jámais podem impedir , que os extremos sobreponhão hum sobre o outro.

gião tenha a cautela de repôr , e conservar os extremos fracturados no seu lugar , conservando o membro na sua figura , e comprimento natural : 4.º finalmente curvaturas maiores , ou menores , as quaes são sempre effeito do descuido , e ignorancia do Cirurgião , por não repôr as peças fracturadas no seu lugar , ou não saber applicar-lhes o apparelho conveniente para conservar a rectidão do membro. Esta deformidade póde remediar-se nos primeiros tempos , isto he , antes de vinte dias , repondo-se os extremos no seu lugar , o que se póde fazer pela pouca firmeza do póro ; porém formado o póro , só se póde emendar quebrando-se , ou rompendo-se a união , meio , a que os doentes se não querem ordinariamente sujeitar , e que os praticos não devem propôr pelas consequencias de huma nova fractura.

Da fractura complicada com falta de união.

§. CXLIV.

Algumas vezes deixão os extremos de se unir depois do tempo competente, e assim ficão toda a vida, se se não podem remover as causas, que impedem a união, que podem ser 1.º algumas molestias constitucionaes, como veneno venereo, disposição scorbutica, rachitica, escrofulosa, &c., as quaes dão lugar á subegidão, ou falta da lympha coagulavel: 2.º algumas porções de carnes entaladas entre os extremos fracturados: 3.º falta de quietação, durante o tempo preciso para a união: 4.º falta de porções dos ossos, o que póde acontecer nas fracturas compostas, ou complicadas, quando estas se tirão: 5.º finalmente velhice, na qual falta naturalmente a lympha para fazer a união. Quando, passado o tempo competente, se achão as fracturas desunidas, cumpre examinar a causa, se antes deste

tem-

tempo se não tiver descoberto ; e sendo algum veneno , ou disposição constitucio-
nal, he preciso usar dos remedios conve-
nientes á sua natureza , prevenção que se
deve ter desde o momento , em que se
concerta a fractura , para se evitar a des-
união ; porém sendo por falta de quieta-
ção, ou de succos, como acontece na ve-
lhice , he preciso repôr segunda vez os
ossos , e conservallos por meio do appa-
relho bem ajustado ; e se ainda assim se
não conseguir a união , passando-se outro
tanto tempo , no qual se usa dos banhos
competentes, isto he , tonicos , havendo
subegidão de succos , e emollientes , ha-
vendo falta , então se aconselhará ao en-
fermo viver com hum tal defeito , se este
lhe não causar grande incommodo , re-
commendando-lhe que traga a parte liga-
da , e amparada com algumas talas , ou
máquina , que á imitação destas não deixe
dobrar o osso por aquelle lugar. Se a pe-
zar desta cautela o enfermo sentir gran-
des incommodos , como acontece nas ex-

tremidades superiores , e inferiores , he preciso fazer-se huma abertura nas partes molles , pela qual se descubraõ os extremos fracturados , e reduzir estes ao estado de huma fractura recente.

Differentes meios se podem empregar para este fim , como 1.º cortar alguma cousa dos ditos extremos com a tenaz incisiva , ou com o trepano , applicando-se huma coroa sobre cada extremo : 2.º fazer sahir os extremos ao través da ferida , para se ferrarem como fica dito (CXXXIV): porém todos estes meios são mui trabalhosos , exigem grandes aberturas , e , a meu ver , são escusados , não obstante terem-se praticado algumas vezes , e com successo ; porque o fim de todos elles he mudar a superficie polida , que os extremos tem adquirido , para superficies recentes , que possão , existindo a parte em quietação , unir-se como nas fracturas complicadas com ferida : e por tanto basta raspar as ditas superficies com huma lima , ou grossa. Deste modo se mudão as superficies-

ficies ao través de menores aberturas , e sem o receio de se ferirem vasos consideraveis.

§. CXLV.

Concertada a fractura , curada a ferida , se a houver , e situado o enfermo , e parte fracturada , como convier , não buliremos , sem precisão , no apparelho todo o tempo necessario para a união (*a*) , a pezar da recommendação de alguns

Tom. IV.

Yy

pra-

(*a*) A união dos ossos faz-se do mesmo modo que a das partes molles , com a differença de ser mais vagarosa em razão dos poucos poderes de restauração , que ha nestes órgãos. Desde o momento , em que se quebrão os ossos , principia a haver hum derramamento de liquidos no intervallo das partes divididas. Se estas forem só os ossos , o derramamento será pequeno , e de lymphá coagulavel com algum foro ; porém sendo tambem comprehendidas algumas partes molles , o derramamento será grande , e constará das tres partes , que compõem o sangue , isto he , de foro , lymphá coagulavel , e crassidão , seguindo-se maior , ou menor ecchimosê. Nas fracturas simples proporciona-se brevemente a exalação , ou deposição da lymphá coagulavel , com a absorvencia do sobejo , e fica aquella quantidade precisa para fazer a união , vascularizando-se , e endurecendo-se , isto he , admit-

praticos , que mandão renovar o dito aparelho de quando em quando , e isto porque os ossos fracturados precisão para se unirem da maior quietação possível. Esta regra com tudo deixa de ser obser-

va-

rindo na sua vascularização a materia terrestre , que lhe dá a dureza de osso , cuja materia vem para alli conduzida pelos vasos dos ossos , que se anastomosão com os da lympha vascularizada. Nas fracturas complicadas , como ha grandes estímulos , e por consequencia grandes derramamentos , o processo da união , ainda que do mesmo modo , he mais vagoroso , e algumas vezes mesmo interrompido pela inflammação ; e em quanto esta dura , ou a suppuração se não estabelece , não póde principiar a união , e ossificação , as quaes se fazem em taes casos mediante a granulação. Se os ossos quebrados ficão agudos , suas pontas causão estímulos , com os quaes se augmenta consideravelmente a exhalção , e daqui vem o grande volume dos póros nas fracturas complicadas. Esta lei tão geral da economia animal , pela qual constantemente se depositão liquidos entre os corpos , ou substancias estimulantes , e as partes estimuladas , faz que nas fracturas complicadas a lympha coagulavel , depositando-se ao redor das pontas dos ossos , as torne rombas , para se diminuirem os estímulos , ao contrario do que pensão aquelles , que suppõem que antes da deposição da lympha ha huma absorvencia da mate-

vãda 1.º quando sobrevem comichão , dor ,
inchação , ou inflammation ; porque estes
symptomas cêlsão ordinariamente reno-
vando-se o apparelho , affroxando-se , ou
mudando-se as talas de situação , o que
se fará segundo os preceitos apontados
(CXXIX) : 2.º quando sobrevem hemor-
rhagias , que pedem a laqueação ; porque
em taes casos desmancha-se o apparelho ,
descobre-se o vaso , laquea-se , e appli-
ca-se outro apparelho novo debaixo dos
preceitos (CXXXIV) : 3.º quando ha
abundante suppuração , que enlopa os gua-

Yy ii

la-

ria ossea nas pontas , ou bicos dos ossos , pela qual
ficão adelgaçados , e menos irritantes , opinião qui-
mérica , e desmentida pela observação diaria , a qual
nos mostra maior grossura nos extremos fracturados ,
e hum póro tanto mais grosso , quanto os estímulos
forão grandes.

Finalmente a lymphá coagulavel vascularizando-
se , e ossificando-se como fica dito , suppre as faltas
consideraveis das porções dos ossos , que nós extrahi-
mos , ou se exfolião , excepto quando alguma dispo-
sição morbosa faz a falta da materia terrestre ; porque
então fica o póro membranoso , e incapaz de supprir
a falta do osso.

lapos, e se teme que a materia excitando estímulos, chame alguma inflammação: 4.º finalmente quando a excessiva inchação, e inflammação não admittem aperto algum; porque em taes casos esperaremos que passe este estado irritavel para applicarmos o apparelho, empregando entretanto os remedios antiphlogísticos constitucionaes, e topicos, que forem convenientes.

Entrada pois a fractura em via de união, contaremos o tempo preciso para se firmar o póro, e então conservaremos a parte ligada, e amparada com algumas talas, mas permittindo-lhe aquelles movimentos, que forem precisos, para que o membro, ou parte fracturada entre pouco a pouco no exercicio das suas funções. Passados mais alguns dias, se tirarão todos os appositos; e achando-se as juntas emperradas, como he commum, ou havendo alguma inchação, se usará dos remedios proprios a combater taes indisposições em banhos, fomentações, ou cata-
plaf-

plasmas , fugindo dos emplastros chamados confortativos , que vogarão tanto na prática das fracturas , e deslocações , que só servem de excitar estímulos , e inflamações , e que tanto se oppõe aos fins de hum prompto restabelecimento.

C A P I T U L O IX.

Das fracturas em particular.

§. CXLVI.

Da fractura dos ossos do nariz.

OS ossos proprios do nariz podem fracturar-se por alguma violencia externa , como quedas , pancadas , e esta fractura ser simples , ou complicada com ferida. A vista , o tacto , algum sangue , que muitas vezes sahe pelas ventas , e a difficuldade de respirar , são os sinaes , que nos fazem conhecer estas fracturas , as quaes podem ser seguidas de chagas no interior do nariz , de polypos , e de
of-

offensa dos órgãos incluídos no cranêo, se pela lamina perpendicular do osso crivoso se propaga a moção aos ditos órgãos. Estas fracturas curão-se collocando os ossos nos seus lugares, humas vezes elevando-se, estando abatidos, como he commum, por meio de huma sonda grossa mettida na venta correspondente, outras vezes comprimindo-se para dentro, se se achão levantados, e depois de postos no seu lugar, se une a ferida externa, havendo-a, applicação-se os chumaços aos lados, e sobre o dorso, e se pratica a ligadura chamada açamo compressivo, ou fossa d'Amintas *. Se as peças fracturadas se acharem tão soltas, que se não possão unir, como ás vezes acontece, havendo ferida, as tiraremos, e aproximaremos os tegumentos o mais que for possível, para se evitarem fistulas; e como as consequencias destas fracturas podem ser fataes, cumpre prevenillas como fica dito (CXXXII). Alguns praticos mandão
usar

* Estamp. VIII. N. 3.

usar de méchas ocas mettidas nas ventas , quando as porções fracturadas se abatem : porém estas méchas estimulam o nariz , excitão os espirros , e de nada servem.

Da fractura do queixo inferior.

§. CXLVII.

Posto que o queixo inferior seja pela sua estrutura , e mobilidade por duas juntas pouco exposto a fracturas , com tudo algumas vezes se québra em consequencia de quedas , e pancadas. Quando a fractura do queixo inferior he composta , isto he , quando este osso se québra em duas , ou mais partes , podem desencontrar-se alguma cousa os extremos fracturados , ficando mais alto o que pertence ás posteriores ; porém nunca sobrepõe hum em cima do outro , ainda que a fractura seja obliqua , por não haver musculos , que corraõ ao comprimento deste osso : e por tanto a reposição he mui facil.

A falta de movimentos acompanhada
com

com dores, a desigualdade, e deformidade, que algumas vezes se percebe correndo-se os dedos sobre a fractura, a crepitação, que se sente movendo-se os extremos desencontradamente, são os sinais, que nos fazem conhecer as fracturas do queixo inferior, as quaes se remedeão igualando-se as porções fracturadas, o que he facil, comprimindo-se o extremo descalhado para cima até ficar igual com o outro, e conservando-se assim por meio do apparelho, que consta 1.º de alguns gualapos, cujos meios applicados na ponta da barba, vão as pontas de baixo cruzar com as de cima sobre os ramos do queixo, estendendo-se até ás orelhas: 2.º de huma caixa de papelão accommodada á figura do queixo, e se faz de huma tira fendida como os gualapos, cujas pontas cruzão mais ou menos, para se formar a dita caixa, que ajustada deve chegar até ás orelhas: 3.º da ligadura chamada cabresto simples, ou dobrado *. Em lugar da

* Estamp. VIII. N. 9.

da caixa de papelão se pôde usar de humma de lâta , a qual conserva melhor as peças fracturadas , e poupa a ligadura , porque se conserva ajustada com tiras prezas nos seus extremos , ou com o suspenforio do queixo. *

Algumas vezes quebra-se o queixo de modo , que a cova de algum dente he comprehendida na fractura , e o dente não só fica defarraigado ao ponto de se não poder conservar , mas impede a exacta reposição dos extremos : nestes casos cumpre tirar primeiro o dente , e depois praticar a redução. Porém se o dente , a pezar de muito abalado , se puder conservar sem impedir a união da fractura , o ligaremos com hum fio de retroz encerrado aos dentes firmes. Praticada a redução , e apparelho , se evitará o movimento do queixo o tempo preciso para a união , ficando o enfermo no uso de caldos , para não ser obrigado a mastigar.

Das fracturas das vertebrae.

§. CXLVIII.

Quando as vertebrae se fracturão pelos seus corpos em consequencia de quedas, ou grandes pancadas, e particularmente de corpos movidos pela explosão da polvora, pouco, ou nada pôde fazer a Cirurgia, porque taes offensas são sempre acompanhadas de estragos grandes na medulla espinhal, e por consequencia mortaes: porém sendo fracturadas pelas apophyses obliquas, ou espinhofas, o que se conhece pelas dores, e palpando-se, não ha tanto perigo, e ordinariamente se remedeão repondo-se as ditas apophyses com os dedos nos seus lugares, e conservando-se com chumaços, sobre os quaes assenta hum lamina de papelão, e algumas voltas de faxa do tronco * com seu escapulario.

Se o anel das vertebrae se achar
fra-

* Estamp. IX. N. 1.

fracturado, e submerso, o que nós conhecemos pelas dores, deformidade, e paralyfia das partes, que ficão para baixo do lugar, onde a medulla espinhal soffre a compressão, além dos exames com o tacto, nenhuma dúvida pôde haver em se descobrir o dito anel, ou anneis com as incisões precisas, e extrahir, ou levantar as porções abatidas, para se remover o aperto da medulla, unico meio, pelo qual podemos alguma vez valer aos infelices, que abandonando-se, terião a morte certa.

O sacro, e coccyx, quando se fracturão, remedeão-se do mesmo modo que as vertebraes; e sendo as fracturas em lugar, onde chegue o dedo introduzido no anus, com elle ajudaremos a pôr as peças fracturadas nos seus lugares, se estas se acharem submersas para a parte da bacia.

Das fracturas dos ossos das cadeiras.

§. CXLIX.

Os ossos das cadeiras podem quebrar-se em consequencia de quedas, e pancadas; porém o mais commum he em consequencia de corpos pezados, que passam por cima destes ossos, como rodas de carros, carretas, carroagens, &c.

A deformidade, a dor, que augmenta a cada movimento, a crepitação, e a desigualdade, que se percebe pelo tacto, são os sinaes, que nos fazem conhecer estas fracturas, as quaes se remedeão situando-se as peças fracturadas, quanto puder ser, nos seus lugares, e conservando-se por meio de chumaços, algumas voltas de circular, e a situação, que for menos incommoda ao paciente. Se taes fracturas são acompanhadas de vomitos, soluços, incontinencia de fezes, e urina, pulsos pequenos, e irregulares, vem a ser mortaes, a pesar de todos os cuidados

cirurgicos , por se acharem pizados os órgãos incluídos na bacia.

Da fractura das costelas.

§. CL.

As costelas são mui sujeitas a fracturas , particularmente as verdadeiras , e primeiras das falsas , em razão da pouca grossura destes ossos , e da sua figura em meios arcos apoiados pelos extremos , que não podendo resistir , ou fugir ás pancadas , quebrão facilmente , excepto as ultimas falsas , que sendo soltas pelo extremo anterior , e por tanto fluctuantes , fogem a toda a violencia externa.

A fractura das costelas conhece-se pela dor local , e pela crepitação , que se sente quando se applica a palma da mão sobre o lugar dorido , e se manda ao doente que tussa. Se os extremos fracturados se não desenhontrão muito , a cura he facil , e prompta , applicando-se alguns chumaços sobre a fractura , e por

ci-

cima destes huma lamina de papelão sustida com a fxa do tronco , e escapulario , ou com a ligadura chamada quadriga * : porém se se desencontrão muito, sahindo hum para fóra , e deprimindo-se outro para dentro, este ultimo causa difficuldade de respirar, tosse , e algumas vezes , rompendo a pleura, como succede nas fracturas obliquas , fere o bofe , seguindo-se o emphysema , e muitas vezes escarros de sangue. Neste caso faremos compressões suaves com as mãos no extremo anterior, e posterior da costela , ou costelas fracturadas , a fim de igualarmos quanto for possivel as peças quebradas, e applicaremos o apparelho, que fica ditto, tendo a cautela de sangrar, adietar, e recommendar o socco ao enfermo, para se prevenir a inflamação.

Se a pesar destes cuidados a costela continuar a ferir o bofe , ou se declarar derramamento de sangue na cavidade do peito, seja dos vasos distribuidos na sub-

stan-

* Litamp. IX. N. 11.

stancia do pulmão, seja das arterias intercostaes, cumpre abrir o peito naquelle lugar, puxar a costela para fóra, e seguir o que fica dito Tom. I. §. CXLV.

Da fractura do sterno.

§. CLI.

Posto que o osso sterno goze de movimentos, e possa ceder ás violencias externas por effeito das cartilagens, que o ligão com as costelas; com tudo algumas vezes se quebra por causa de quedas, e pancadas. Quando este osso se fractura, ficando as peças no seu lugar, remedeia-se facilmente com a applicação do mesmo apparelho, que praticamos nas costelas: porém quando além de se quebrar se deprime alguma porção, o que conhecemos pelo tacto, e má figura da parte, podem haver symptomas graves, como difficuldade de respirar, tosse, febre, dores grandes, &c., e algumas vezes seguir-se a morte: pelo que faremos toda a diligencia

gencia para levantar a porção abatida, comprimindo de hum e outro lado os extremos anteriores das costelas articuladas com a porção deprimida, para a restituir quanto for possível ao seu lugar; e então applicaremos o apparelho acima dito: mas se, a pezar destas diligencias, o osso ficar ainda muito abatido de modo, que a vida do enfermo esteja em perigo pela compressão dos vasos grossos, e coração, faremos huma incisão nos tegumentos sobre a fratura, e levantaremos a peça abatida com os levantadores, do mesmo modo que operamos nos ossos do cráneo, unindo-se depois a ferida por primeira intenção; e se não aproveitar, seguiremos a segunda.

Da fratura da omoplata.

§. CLII.

A omoplata póde fraturar-se por quedas, ou pancadas no seu corpo, ou nos seus processos, o que nós conhecemos

pe-

pela dor local, desigualdade, e crepitação. Esta fractura póde ser ao comprimento do corpo deste osso, ou transversal, e se repõe facilmente aproximando-se com os dedos as porções separadas, e chegando-se as espadoas huma á outra por meio da ligadura 8 de algarifmo *. Feito isto, se applicão alguns chumaços, e por cima huma lamina de papelão sustida com a ligadura chamada estrellado simples **: e como a omoplata tem mui pouca espessura, com difficuldade se toção as superficies fracturadas, para se unirem; porque facilmente se sobrepõe as peças huma em cima da outra, e deste modo he que o mais das vezes se fórma a união, ficando sempre maior, ou menor aleijão na espadoa: pelo que convem muito, para se evitarem estes defeitos, situar o braço, e ante-braço hum pouco levantados, e firmes no suspensorio, para se impedirem os movimentos dos musculos

Tom. IV.

Aaa

da

* Estamp. IX. N. 4.

** Estamp. IX. N. 7.

da espadoa, braço, e ante-braço, unico meio, pelo qual se póde conseguir huma cura mais perfeita.

Achando-se os processos acromio, e coracoideo fracturados, facilmente se repõem levantando-se o braço, e concertando-os com os dedos: porém o que importa mais he conservallos o tempo preciso para a união, de modo que os movimentos dos musculos, que se ligão a elles, não entrem em acção, o que se consegue applicando os gualapos, e chumaços precisos cubertos com huma telha de papelão, e tudo sustido com a ligadura chamada espiga descendente.

Da fractura das clavículas.

§. CLIII.

A clavícula pela sua pouca grossura, situação horizontal, e exposição ás injúrias, ou violencias externas, he muito sujeita a fracturas, em consequencia de quedas, pancadas, e esforços violentos,

e quasi sempre québra obliquamente , ficando hum dos extremos fracturados mais levantado , particularmente o do lado do sterno. A dor , e difficuldade dos movimentos da espadoa , e braço correspondente , juntas á desigualdade , e crepitação , que se percebe movendo-se alguma cousa a espadoa , ou braço , são os sinais , que nos fazem conhecer a fractura da clavicula , a qual poucas vezes se póde repôr , e conservar tão exactamente , que não fique hum grande póro , particularmente sendo obliqua , mas que nada impede o uso deste osso. Para se reporem os extremos fracturados , hum ajudante , pegando pelos hombros do paciente , que está assentado em assento baixo , aproxima as espadoas huma á outra , e as puxa alguma cousa para cima , em quanto o operador com os seus dedos concerta a fractura , comprimindo o extremo levantado , e applica a ligadura chamada 8 de algarismo. Feito isto , situa os gualapos , e chumaços precisos sobre toda a clavicula ,

os quaes cobre com huma lamina de papelão curvada á maneira de telha , e sustentem tudo com a ligadura chamada espiga descendente *. Como a conservação dos extremos repostos depende muito da immobibilidade da espadao , braço , e antebraço , cumpre firmar estas partes com o suspenſorio (a) de modo , que o cotovelo fique apoiado , e fixo , e em tal altura , que a espadao se conserve hum pouco elevada.

Da fractura do humero.

§. CLIV.

As fracturas do osso humero conhecem-

(a.) Os Inglezes usão de huma caixa de sola á maneira de huma telha suspenſa ao pescoço por huma correa , em lugar do lenço , ou bolsa , que se tem empregado para se suspender o ante-braço. Porém a sola he muito dura , magôa o cotovelo , e não suspende melhor do que o lenço , quando he bem applicado.

cem-se facilmente quando são obliquas, ou os extremos sobrepõe hum em cima do outro pela deformidade, curteza, dores, e falta de movimentos; e as transversas por alguns destes finaes, e a crepitação. Para se fazerem as reduções das fracturas deste osso, senta-se o enfermo em hum assento baixo, dous ajudantes fazem a extensão, e contra-extensão mui moderadamente, até os extremos se acharem no seu lugar; e conservando-os assim, o operador os ajusta com os dedos exactamente, e applica o apparelho, o qual consta 1.º do gualapo de dezoito pontas *: 2.º de talas forradas com chumagos, as quaes devem ser quasi do mesmo comprimento do osso, e ficarem mui perto humas das outras: 3.º de fittas, ou ataduras, que segurão as talas: 4.º finalmente do suspensorio, o qual se deixará froxo, particularmente nas fracturas obliquas, para que o pezo do braço, ficando alguma couza pendente, ajude a conservar os extremos repostos. Co-

* Estamp. XI. N. 20.

Como o apparelho deve cubrir toda a extensão do humero, fica claro, que as extensões, e contra-extensões se devem fazer pegando os ajudantes pela espadoa, e ante-braço, para não ser preciso mudarem as mãos, quando se applica o dito apparelho, o que faria algumas vezes desconcertar a fractura.

Mui poucas forças extensoras, e contra-extensoras são precisas para se reporem os extremos do humero fracturado, e se farão com o ante-braço em meia flexão, e o braço quasi horizontal, não para se relaxarem os musculos, como diz Bell, mas porque nesta situação se applica melhor o apparelho, conservando-se a parte immovel (*a*).

Da

(*a*) A fractura do pescoço do humero tem merecido os cuidados particulares de alguns praticos, inventando apparelhos, e ligaduras differentes das propostas em geral para este osso: porém eu acho todas menos efficazes, mais incommodas, e prefiro o apparelho acima mencionado, na certeza de que as fracturas de qualquer parte deste osso se curão perfeitamente com elle.

Da fractura dos ossos do ante-braço.

§. CLV.

Os ossos do ante-braço , isto he , o cubito , e radio , são muito sujeitos a fracturas , não só por effeito da sua dureza , e pouca grossura , mas porque o ante-braço he muito exposto ás violencias externas , e esforços grandes , para serviço do corpo ; em consequencia do que póde fracturar-se hum dos ossos em hum lugar , ou em mais , ou fracturarem-se ambos , e resultar huma fractura composta , a qual ainda póde ser parallela , isto he , quebrarem os ossos no mesmo lugar , ou descontradadamente hum mais acima , outro mais abaixo.

De qualquer modo que a fractura succeda , se conhece pelas dores , mudança de figura , falta de movimentos , e crepitação : e posto que a fractura de hum só osso custe mais a perceber ; com tudo pegando-se pela mão , e pela flexura , fa-

zendo-se a extensão , e movendo-se de encontroadamente para dentro , e para fóra em meias rotações , sente-se bem a crepitação.

Reconhecida a fractura , é sua qualidade , dous ajudantes farão a extensão , e contra-extensão , pegando hum pela parte inferior do braço , e outro pela mão com o pollegar directamente para cima , para puxarem quanto for preciso , até os extremos fracturados se igualarem , e neste estado concerta o operador a fractura , ou fracturas com os dedos , e applica o aparelho do mesmo modo que fica dito na fractura do humero , tendo a cautela de conservar o ante-braço immovel no suspensorio , para que algum movimento de supinação , ou pronação não desconcerta a fractura , particularmente sendo o radio o fracturado.

Algumas vezes se fractura a apophyse olecrane por causa de quedas , e pancadas no cotovelo , e a fractura desta parte do cubito exige differente aparelho ,

e situação para se unir, e vem a ser 1.º situar o ante-braço na extensão: 2.º applicar alguns gualapos, e sobre estes duas tiras compridas aos lados da olecrane: 3.º fazer algumas voltas de circular por cima, e por baixo do cotovelo, as quaes se aproximarão com as duas tiras, cujos extremos superiores se atão com os inferiores: 4.º finalmente situar huma tala segura com fittas, ou voltas de circular na flexura, para impedir a flexão do ante-braço; e como este apparelho póde causar a anchilose desta junta, se se conservar todo o tempo da cura, he preciso desmanchallo de quando em quando, para se fazerem alguns movimentos de flexão, e extensão, nos quaes pegaremos com os dedos na olecrane, para a obrigar a seguir o cubito nos ditos movimentos.

Das fracturas dos ossos das mãos.

§. CLVI.

Os ossos do carpo podem ser fracturados em consequencia de feridas de armas de fogo , ou corpos pezados , que caíão em cima do punho , e esmaguem os ditos ossos ; porque d'outra maneira fogem pela sua pequenez , e figura quasi redonda a toda a casta de compressões , ou violencias. Quando as fracturas destes ossos são complicadas com ferida , cumpre tirar todos os corpos estranhos , e esquirolas , havendo-as , ou alguns dos mesmos ossos , estando desligados , e aproximar as partes molles com pontos falsos quanto for possivel , para mais prompta cura , sobre cujos pontos se applicão os gualapos , chumaços , e algumas talas , que impidão os movimentos da junta do punho , e tudo sustido com voltas de circular , ou a espiga de punho * . Porém
não

* Estamp. XI. N. 17.

não havendo ferida , reporemos os ossos no seu lugar , e os conservaremos com o mesmo apparelho , tendo a cautela de o desmanchar de quando em quando , para se moverem brandamente as juntas , unico meio de evitar parte das prizões , que ordinariamente se seguem a taes fracturas , particularmente sendo complicadas.

Os ossos do metacarpo , quando se fracturão , exigem a reposição puxando-se pelas pontas dos dedos ; e hum apparelho , que deve constar de gualapos , chumaços , e duas talas , huma por dentro , outra por fóra da mão , as quaes se devem estender desde o meio do ante-brço até á extremidade do dedo correspondente , fustidas com fittas , e voltas de circular.

As fracturas dos ossos dos dedos pedem depois da reposição o mesmo apparelho , só com a differença de duas talas mais curtas , situadas pela parte anterior , e posterior do osso fracturado. Em todas as fracturas das extremidades superiores

podem os doentes andar de pé com o braço ao peito todo o tempo da cura, se algumas complicações não pedirem a quietação do corpo, e da parte.

Das fracturas do femur.

§. CLVII.

O femur pôde fracturar-se em diferentes partes; porém o terço médio deste osso he o lugar, onde observamos maior numero de fracturas, e depois deste no seu pescoço. A mudança de figura, a falta de movimentos, as dores, e crepitação, são os sinaes das fracturas do femur, accrescendo nas obliquas haver maiores dores, e a coxa ficar mais curta, comparando-se com a outra.

Para se concertarem as fracturas do femur, deita-se o enfermo na cama, que deve ser igual, e que não faça cova, e situa-se o apparelho debaixo da coxa na ordem, em que se ha de applicar. Feito isto, dous, ou mais ajudantes fazem a

ex-

extensão , e contra-extensão , fegurando huns o corpo, e pegando outros na perna acima dos tornozelos (*a*), para puxarem até os extremos fracturados se collocarem topo com topo, o que o operador ajudará com os dedos, sendo preciso, e applicará o apparelho , o qual deve constar do gualapo de dezoito pontas, das talas, e chumaços, que as forrão, das fittas, ou circular, que as fegurão, e finalmente dos rolos feitos com o lençol e palha, os quaes devem ter o comprimento da coxa e perna, para que situados aos lados destas partes, e atados a ellas com fittas, as conservem immoveis : e como importa
mui-

(*a*) Este modo de fazer a extensão, e contra-extensão, puxando-se em linha recta, he muito melhor do que com o joelho dobrado, como querem alguns, não só porque, feita a reposição dos extremos, fica a parte immovel até a total applicação do apparelho, mas porque os musculos, que devem ceder, ficam livres de compressões. Igualmente são escusadas as ligaduras, ou máquinas, que muitos praticos aconselham; porque por mais robustos, que sejam os musculos, cedem facilmente ás forças extensoras, e contra-extensoras, que tenho proposto.

muito que o pé se conserve em meia flexão, e sem se mover para dentro, ou para fóra, o seguraremos com hum estribo, ficando o calcanhar em falso por meio de chumaços, para se evitarem dores, e excoriações, a que esta parte he sujeita em razão das compressões, que soffre.

Nas fracturas obliquas se praticará o mesmo ápparelho, só com a differença de se apertar hum pouco mais, porém não tanto, que impida o ascenso dos líquidos, e resultem inchações, que nos obriguem a desmanchallo. E posto que nas fracturas obliquas fique sempre a extremidade inferior mais curta, e alguma claudicação; com tudo estes defeitos são mais toleraveis do que os damnos, que se seguem da applicação de certas máquinas, e ligaduras, com que se tem pertendido conservar a coxa estendida.

Das fracturas do pescoço do femur.

§. CLVIII.

As fracturas do pescoço do femur conhecem-se pelas dores locais, falta de movimentos, impossibilidade de andar, a coxa, e perna mais curtas, o pé, e joelho voltados para fóra, e hum tumor formado pelo grande trochanter na região glutea acima da fossa cotyloidea: e distinguem-se das deslocações, 1.º porque nas deslocações o tumor formado pelo grande trochanter he maior, em razão da cabeça do osso ter sahido da sua fossa: 2.º porque na fractura move-se facilmente a coxa em adducção e abducção sem grandes dores: 3.º porque nas fracturas se consegue a reducção facilmente, isto he, puxando-se pela perna, fica o trochanter no seu lugar, e a coxa do seu comprimento ordinario; porém largando-se, torna pouco a pouco a encolher-se, e o dito trochanter a subir á fossa glutea, o que
não

não acontece na deslocação , quando se chega a reduzir : 4.º finalmente porque a fractura do pescoço acontece por pequenas causas , e em idades avançadas. Reconhecida por estes sinaes a fractura do pescoço do femur , na qual falta ordinariamente a crepitação , porque os topos fracturados não roçam hum pelo outro , empregaremos o mesmo apparelho que fica dito , só com a differença de estenderem as talas externas , e posteriores até á borda superior do osso ilion , as quaes seguraremos com a ligadura chamada espi-ga simples * , recommendando ao enfermo toda a quietação possível , e conservando-o ligado muito mais tempo para maior firmeza da união , a qual rarissimas vezes se faz topo com topo , e por isto ficam os enfermos com a coxa mais curta , e com alguma claudicação , sem que por este effeito se possa accusar falta no Cirurgião ; porque até ao presente se não tem descoberto meio algum para o evitar.

* Eltamp. X. N. 3.

tar (a). Se a pesar destas cautelas a coxa se encurtar , a alongaremos o que for preciso , puxando pelo pé de quando em

Tom. IV.

Ccc

quan-

(a) Como nas fracturas do pescoço do femur , e nas muito obliquas do seu corpo , fica sempre a extremidade inferior mais curta , tem os praticos recorrido a differentes ligaduras , e máquinas para evitar este defeito , como passar ligaduras pelas virilhas atadas á cabeceira da cama , para segurarem as cadeiras ; em quanto outras enlaçadas por cima dos tornozelos , e atadas a coufas firmes nos pés da cama , conservão a perna puxada tanto quanto he preciso para a conter no seu comprimento natural : porém as inchações , dores , e excoriações , que se seguem a taes ligaduras , as fizerão abandonar como muito perigosas , assim como outras , que , não sendo capazes de fazer tanto damno , ficão sendo inuteis. A insufficiencia das ligaduras deo lugar a inventarem-se máquinas , que estendessem a coxa , e a conservassem estendida com menos incommodo. Bellocq inventou huma maquina * , a qual lhe pareceo encher bem os ditos fins : porém enganou-se , assim como Gooch inventando outra , que Aitken corrigio ; porque a applicação destas máquinas produz exactamente os mesmos inconvenientes , que produzem as ligaduras acima ditas.

* Memor. da Academ. de Cirurg. Tom. III. pag. 238.

quando sem desmancharmos o apparelho, excepto achando-se largo, para o apertarmos. Convem muito, quando alongamos a extremidade inferior, movella branda, e limitadamente em flexão, extensão, adducção, e abducção, para que se não prenda de modo, que resulte a anchilose; porque este defeito he hum impedimento para andar, e maior do que a claudicação, que póde resultar de huma nova articulação, que muitas vezes se fórma no lugar, onde se apoia o grande trochanter, claudicação, que se corrige alguma cousa com hum salto mais alto no sapato.

Da fractura da rodéla.

§. CLIX.

A rodéla póde fracturar-se em consequencia de pancadas, e quédas, e muitas vezes só por geitos, que se dão á extremidade inferior (a). As fracturas da

ro-

(a) Eu tenho affistido a muitos enfermos, que ao mover a extremidade inferior de hum certo mo-

rodéla podem ser longitudinaes, obliquas, ou transversaes, e mesmo quebrar-se em muitas peças. Qualquer que seja a casta de fractura, que se conhece pela má figura da parte, dores, e separação das porções fracturadas, deixando entre si hum espaço maior, ou menor, que se percebe pelo tacto, se remedeia 1.º situando a coxa em meia flexão, e a perna em extensão por meio de encoftos: 2.º aproximando com os dedos as porções separadas, quanto for possível: 3.º conservando-as assim seis, ou oito semanas com o apparelho, e ligadura, que lhe convier, segundo a sua direcção, como nas longitudinaes a ligadura unitiva *, nas transversaes, e obliquas a ligadura chamada cabresto do joelho **. E posto que as

Ccc ii

pe-

do, se lhe tem quebrado a rodéla, sem mais violencia do que a grande compressão, que faz o tendão dos musculos extensores da perna sobre este osso contra algum dos condylos do femur.

* Estamp. XII. N. 9.

** Estamp. XII. N. 13.

peças da rodéla fracturada transversalmente poucas vezes unão por meio de póro, como os outros ossos, em razão da difficuldade, que ha de aproximar a porção superior retirada pela acção do tendão dos extensores da perna; com tudo devemos fazer toda a diligencia para as aproximar, e mesmo para as conservar em contacto, se for possível, com as ditas ligaduras, sem o receio de que se possa seguir anchilose, a qual se evita movendo-se a rodéla de quando em quando sobre os condylos do femur, pegando-se com os dedos nas suas porções, aproximadas como se fosse huma só peça. Deste modo conseguimos não só o não ficar anchilose, mas unirem-se as peças mais cedo, e ficar menos espaço entre ellas, e por consequencia menos defeito no movimento da perna, defeito, que será tanto maior, quanto o espaço for grande, sem que o tempo, e a connexão membranosa das peças fracturadas o possão evitar por toda a vida. Todas as vezes que
for

for preciso renovar a ligadura, conservaremos a extremidade inferior estendida como fica dito, para evitar que o tendão dos extensores da perna, comprimindo, ou puxando pelas peças fracturadas, as aparte huma da outra, o que precisamente deve acontecer, se seguirmos o parecer de alguns, que mandão dobrar o joelho de quando em quando, passados os primeiros quinze dias.

Da fractura da perna.

§. CLX.

Os ossos, que compõem a perna, que são tibia, e peroneo, podem fracturar-se por violencias externas, cada hum separadamente, ou ambos, e resultar huma fractura composta, humas vezes parallelas, outras desenhada, como quando o peroneo se quebra mais acima, e a tibia mais abaixo. Estes ossos se quebrão mais facilmente no terço inferior; mas não he raro quebrarem pelo mediano, ou pelo superior.

A fractura de ambos os ossos he facil de conhecer pela má figura da parte, dores, impossibilidade de movimentos, e particularmente de estar em pé, e pela crepitação : porém a fractura de hum só, e principalmente do peroneo, he mais difficullosa de conhecer, e exige algumas vezes, para se descobrir, movimentos de meia rotação, nos quaes se faz sensível a crepitação.

Como as peças fracturadas não sobrepõem ordinariamente humas em cima das outras, excepto sendo as fracturas muito obliquas, e achando-se ambos os ossos quebrados, poucas forças extensoras, e contra-extensoras são precisas para a perfeita reposição, a qual se fará estando o enfermo deitado de costas na cama, em que ha de ficar, segurando-se a coxa, e puxando-se pelo peito do pé, e calcanhar em linha recta, até os ossos estarem no seu lugar, o que se conhece pela igualdade, e diminuição de dores. Então o operador applica o apparelho, que tem

fi-

situado debaixo da perna , e deve constar dos rolos , fittas , talas forradas de chumaços , e o gualapo de dezoito cabeças , acompanhado de alguns chumaços , que enchão as desigualdades da perna. Applicado o apparelho , situa-se a perna entre os rolos do lençol e palha , os quaes devem abranger parte da coxa , e fahir alguma cousa fóra da planta do pé , á qual se ajustará huma taboa forrada de hum chumaço , e preza com fittas aos rolos , para servir de estribo , evitando-se com este apparelho as máquinas , e caxas , que , além de dispendiosas , são muito incommodas : e para que a roupa da cama não toque na perna , se conservará affastada com arcos , ou suspenza com hum cordão ao tecto , ou cousa semelhante. Igualmente haverá outro cordão forte , prezo ao tecto , para o enfermo se pegar , e ajudar a mover , quando he preciso obrar , ou mudar-se-lhe a roupa da cama. Se sobrevierem dores ao calcanhar , como he commun , pela compressão , o poremos em falso por meio de chumaços.

Das

Das fracturas dos ossos do pé.

§. CLXI.

Os ossos, que compõem o pé, a saber os do tarso, metatarso, e dedos, são mui sujeitos a fracturas em consequencia de corpos duros, que cahem sobre os pés. A dor, a mudança da figura da parte, o tacto, se ha ferida, e a crepitação, são os sinaes, que nos fazem conhecer estas fracturas, as quaes se concertão collocando-se as peças fracturadas nos seus lugares, extrahindo-se algumas esquirolas, se as houver, aproximando-se as partes molles com a costura secca, e applicando-se os guálapos, e talas precisas, sustidas com voltas de circular, seguindo-se a situação, que será aquella, em que o pé descance com menos incommodo apoiado sobre hum lençol dobrado, ou almofadas.

FIM DO TOMO IV.

IN-

INDICE

Das materias contidas neste quarto Tomo.

D <i>A inflammação.</i>	- - - -	Pag. 3.
<i>Das causas.</i>	- - - - -	4.
<i>Da causa proxima.</i>	- - - - -	6.
<i>Da resolução da inflammação.</i>	- - -	24.
<i>Da suppuração.</i>	- - - - -	36.
<i>Da formação da materia, ou pús.</i>	-	41.
<i>Do que convem fazer na inflammação suppu- rada, ou abscesso.</i>	- - - - -	50.
<i>Da abertura dos abscessos.</i>	- - - -	52.
<i>Da gangrena.</i>	- - - - -	66.
<i>Da gangrena humida.</i>	- - - - -	66.
<i>Da gangrena secca.</i>	- - - - -	81.
<i>Das amputações.</i>	- - - - -	85.
<i>Da amputação da coxa.</i>	- - - -	105.
<i>Da amputação da perna.</i>	- - - -	116.
<i>Da amputação do braço.</i>	- - - -	119.
<i>Da amputação do ante-braço.</i>	- - -	120.
<i>Da amputação a retalho.</i>	- - - -	121.
<i>Da amputação a retalho pela junta da espa- doa.</i>	- - - - -	126.
<i>Da amputação pela junta do cotovelo.</i>	-	131.
<i>Da amputação pela junta do punho.</i>	-	132.

I N D I C E.

<i>Das amputações dos dedos pelas suas articulações com os ossos do metacarpo , ou das suas phalanges humas com as outras.</i>	133.
<i>Da amputação da côxa a retalho pela junta das cadeiras. - - - - -</i>	135.
<i>Da extracção das extremidades articulares dos ossos. - - - - -</i>	138.
<i>Da sangria em geral. - - - - -</i>	142.
<i>Da sangria em particular. - - -</i>	166.
<i>Da sangria do braço. - - - - -</i>	166.
<i>Da sangria da costa da mão. - - -</i>	170.
<i>Da sangria do pé. - - - - -</i>	171.
<i>Da sangria do genital. - - - - -</i>	174.
<i>Da sangria das jugulares. - - -</i>	175.
<i>Da sangria das veas raninas. - -</i>	177.
<i>Da sangria pelo nariz. - - - - -</i>	178.
<i>Da sangria da testa. - - - - -</i>	179.
<i>Das ventosas seccas , e sarjadas. - -</i>	179.
<i>Da sangria topica por meio de bichas.</i>	182.
<i>Das fontes , e sedenbos. - - - - -</i>	185.
<i>Da inoculação das bexigas. - - -</i>	191.
<i>Da Estampa V. - - - - -</i>	194.
<i>Da Estampa VI. - - - - -</i>	197.
<i>Da Estampa VII. - - - - -</i>	199.
<i>Da</i>	

I N D I C E.

<i>Da Estampa VIII.</i>	- - -	Pag. 206.
<i>Da Estampa IX.</i>	- - - - -	215.
<i>Da Estampa X.</i>	- - - - -	224.
<i>Da Estampa XI.</i>	- - - - -	232.
<i>Da Estampa XII.</i>	- - - - -	243.
<i>Da Estampa XIII.</i>	- - - - -	254.
<i>Das deslocações em geral.</i>	- - -	258.
<i>Das causas.</i>	- - - - -	260.
<i>Dos sinaes.</i>	- - - - -	261.
<i>Do prognostico.</i>	- - - - -	263.
<i>Da cura.</i>	- - - - -	264.
<i>Da primeira indicação.</i>	- - - - -	265.
<i>Da segunda indicação.</i>	- - - - -	269.
<i>Da terceira indicação.</i>	- - - - -	272.
<i>Das deslocações em particular.</i>	- - -	273.
<i>Da deslocação do queixo inferior.</i>	- - -	273.
<i>Das deslocações da cabeça, e espinhaço.</i>	- - -	275.
<i>Das deslocações das costélas.</i>	- - -	284.
<i>Da deslocação das claviculas.</i>	- - -	286.
<i>Da deslocação do humero.</i>	- - -	288.
<i>Do primeiro methodo.</i>	- - - - -	292.
<i>Do segundo methodo.</i>	- - - - -	294.
<i>Da deslocação do ante-braço.</i>	- - -	298.
<i>Da deslocação do punho.</i>	- - - - -	301.


I N D I C E.


<i>Das deslocações dos ossos do metacarpo, e dedos. - - - - -</i>	Pag. 303.
<i>Da deslocação do femur com os ossos das cadeiras. - - - - -</i>	304.
<i>Da deslocação da rodela. - - - - -</i>	311.
<i>Da deslocação da tibia. - - - - -</i>	312.
<i>Da deslocação do pé. - - - - -</i>	314.
<i>Das deslocações dos outros ossos do pé.</i>	316.
<i>Das fraçturas em geral. - - - - -</i>	317.
<i>Das causas. - - - - -</i>	319.
<i>Dos sinaes. - - - - -</i>	320.
<i>Do prognostico. - - - - -</i>	321.
<i>Da cura. - - - - -</i>	324.
<i>Da primeira indicação. - - - - -</i>	324.
<i>Da segunda indicação. - - - - -</i>	329.
<i>Da terceira indicação. - - - - -</i>	333.
<i>Das fraçturas complicadas com dor grande.</i>	334.
<i>Da fraçtura complicada com inchação.</i>	336.
<i>Da fraçtura complicada com deslocação.</i>	337.
<i>Da fraçtura complicada com ferida. -</i>	337.
<i>Da fraçtura complicada com hemorragia.</i>	340.
<i>Da fraçtura complicada com grandes lacerações. - - - - -</i>	341.
<i>Da fraçtura complicada com convulsões.</i>	341.
<i>Dos</i>	

I N D I C E.


<i>Dos symptomas consecutivos.</i>	-	Pag.	342.
<i>Da suppuração, que sobrevem ás fraçturas.</i>			343.
<i>Da fraçtura complicada com gangrena.</i>			344.
<i>Da fraçtura complicada com paralyfia.</i>			344.
<i>Da fraçtura complicada com anchilose.</i>			345.
<i>Da fraçtura complicada com deformidade.</i>			346.
<i>Da fraçtura complicada com falta de união.</i>			350.
<i>Da fraçtura dos ossos do nariz.</i>	-	-	357.
<i>Da fraçtura do queixo inferior.</i>	-	-	359.
<i>Das fraçturas das vertebbras.</i>	-	-	362.
<i>Das fraçturas dos ossos das cadeiras.</i>			364.
<i>Da fraçtura das costelas.</i>	-	-	365.
<i>Da fraçtura do sternó.</i>	-	-	367.
<i>Da fraçtura da omoplata.</i>	-	-	368.
<i>Da fraçtura das claviculas.</i>	-	-	370.
<i>Da fraçtura do humero.</i>	-	-	372.
<i>Da fraçtura dos ossos do ante-brço.</i>	-		375.
<i>Das fraçturas dos ossos das mãos.</i>	-		378.
<i>Das fraçturas do femur.</i>	-	-	380.
<i>Das fraçturas do pesçoço do femur.</i>	-		383.
<i>Da fraçtura da rodéla.</i>	-	-	386.
<i>Da fraçtura da perna.</i>	-	-	389.
<i>Das fraçturas dos ossos do pé.</i>	-	-	392.

























































Fig. 1.



fig. 7.



Est. 7.

fig. 2.



Fig. 4.



fig. 9.



fig. 8.




Fig. 3.




fig. 5.




fig. 6.

